

Marcin Kurczab  
Elżbieta Kurczab  
Elżbieta Świda

# MATEMATYKA

**Zbiór zadań do liceów i techników**

ZAKRES PODSTAWOWY

# 2



OFICyna  
EDUKACYJNA

KRZYSZTOF PAZDRO

Projekt okładki i strony tytułowej  
Bożena Sawicka

Rysunki, skład i łamanie  
Artepagina.com – Wojciech Prusakiewicz  
Anna Ugniewska

Redakcja  
Tomasz Szwed

Fotografia na okładce: *Pęk prostych*  
Autor: Aleksandra Maciejewska  
Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Matematyka w obiektywie”  
[www.mwo.usz.edu.pl](http://www.mwo.usz.edu.pl)

Druk i oprawa  
Druk-Serwis Sp. z o.o.  
ul. Tysiąclecia 8b, 06-400 Ciechanów

Wydrukowano na papierze *UPM Ultra matt 65 g*  
[www.antal.pl](http://www.antal.pl)

© Copyright by Oficyna Edukacyjna \* Krzysztof Pazdro Sp. z o.o.  
Warszawa 2021 r.

Wydanie IV, Warszawa 2022 r.

Oficyna Edukacyjna \* Krzysztof Pazdro Sp. z o.o.  
ul. Kościańska 4, 01-695 Warszawa  
[pazdro@pazdro.com.pl](mailto:pazdro@pazdro.com.pl)  
[www.pazdro.com.pl](http://www.pazdro.com.pl)

ISBN 978-83-7594-196-8

## Spis treści

<b>1. Przekształcenia wykresów funkcji</b>	
Wektor w układzie współrzędnych – podstawowe informacje	7
Przesunięcie równoległe. Przesunięcie równoległe wzdłuż osi $OX$	10
Przesunięcie równoległe wzdłuż osi $OY$	13
Symetria osiowa. Symetria osiowa względem osi $OX$ i $OY$	20
Symetria środkowa. Symetria środkowa względem punktu $(0, 0)$	25
Zastosowanie wykresów funkcji do rozwiązywania równań i nierówności	27
Test sprawdzający do rozdziału 1.	28
Zadania powtórzeniowe do rozdziału 1.	31
<b>2. Równania i nierówności z wartością bezwzględną</b>	
Wartość bezwzględna liczby rzeczywistej	34
Odległość między liczbami na osi liczbowej.	
Geometryczna interpretacja wartości bezwzględnej na osi liczbowej	36
Proste równania z wartością bezwzględną	38
Proste nierówności z wartością bezwzględną	40
Test sprawdzający do rozdziału 2.	42
Zadania powtórzeniowe do rozdziału 2.	43
<b>3. Funkcja kwadratowa</b>	
Przypomnienie wiadomości o funkcji kwadratowej z klasy 1.	45
Związek między wzorem funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, a wzorem funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej	47
Miejsce zerowe funkcji kwadratowej.	
Wzór funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej	49
Szkicowanie wykresów funkcji kwadratowych. Odczytywanie własności funkcji kwadratowej na podstawie wykresu	53
Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej na podstawie jej własności	56
Najmniejsza oraz największa wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym	58
Badanie funkcji kwadratowej – zadania optymalizacyjne	60
Równania kwadratowe	63
Równania prowadzące do równań kwadratowych	65
Nierówności kwadratowe	66
Zadania prowadzące do równań i nierówności kwadratowych	69
Test sprawdzający do rozdziału 3.	72
Zadania powtórzeniowe do rozdziału 3.	73
<b>4. Geometria płaska – okręgi i koła</b>	
Powtórzenie wiadomości z geometrii z klasy 1.	76
Okrąg. Położenie prostej i okręgu	82
Wzajemne położenie dwóch okręgów	84
Koła i kąty	85

Twierdzenie o stycznej i siecznej	88	Podzielność wielomianów	159
Symetralne boków trójkąta. Okrąg opisany na trójkącie	90	Dzielenie wielomianu przez dwumian liniowy. Schemat Hornera	161
Dwusieczne kątów trójkąta. Okrąg wpisany w trójkąt	92	Pierwiastek wielomianu. Twierdzenie Bézouta	163
Test sprawdzający do rozdziału 4.	96	Pierwiastki wymierne wielomianu	166
Zadania powtórzeniowe do rozdziału 4.	98	Rozkładanie wielomianów na czynniki	167
<b>5. Trygonometria</b>		Równania wielomianowe	169
Trygonometria kąta ostrego – powtórzenie wiadomości z klasy 1.	101	Zadania prowadzące do równań wielomianowych	171
Sinus, cosinus, tangens i cotangens dowolnego kąta płaskiego	103	Test sprawdzający do rozdziału 8.	173
Podstawowe tożsamości trygonometryczne	105	Zadania powtórzeniowe do rozdziału 8.	174
Wybrane wzory redukcyjne	108	<b>Odpowiedzi do zadań</b>	177
Test sprawdzający do rozdziału 5.	109	<b>Wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych</b>	232
Zadania powtórzeniowe do rozdziału 5.	111		
<b>6. Geometria analityczna</b>			
Odcinek w układzie współrzędnych	113		
Równanie kierunkowe prostej	114		
Równanie ogólne prostej	117		
Równanie okręgu	119		
Wyznaczanie w układzie współrzędnych punktów wspólnych prostych, okręgów i parabol	121		
Zastosowanie układów równań do rozwiązywania zadań z geometrii analitycznej	123		
Test sprawdzający do rozdziału 6.	124		
Zadania powtórzeniowe do rozdziału 6.	126		
<b>7. Geometria płaska – rozwiązywanie trójkątów, pole trójkąta, pole koła</b>			
Twierdzenie sinusów	128		
Twierdzenie cosinusów	129		
Zastosowanie twierdzenia sinusów i twierdzenia cosinusów do rozwiązywania zadań	131		
Pole figury płaskiej	132		
Pole trójkąta, cz. 1	134		
Pole trójkąta, cz. 2	137		
Pola trójkątów podobnych	140		
Pole koła, pole wycinka koła	143		
Zastosowanie pojęcia pola w dowodzeniu twierdzeń	145		
Test sprawdzający do rozdziału 7.	146		
Zadania powtórzeniowe do rozdziału 7.	148		
<b>8. Wielomiany</b>			
Wielomiany jednej zmiennej rzeczywistej	151		
Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów	153		
Równość wielomianów	155		
Wzory skróconego mnożenia stopnia 3. Wzór na $a^n - b^n$	156		
Zastosowanie wzorów skróconego mnożenia w dowodzeniu	158		

Symbolem **D** zostały oznaczone zadania na dowodzenie.


# 1. Przekształcenia wykresów funkcji

## Wektor w układzie współrzędnych – podstawowe informacje

1.1. W prostokątnym układzie współrzędnych narysuj podane wektory. Początek każdego wektora obierz dowolnie.

- a)  $\vec{a} = [5, 0]$       b)  $\vec{b} = [-3, 0]$       c)  $\vec{c} = [0, 1]$       d)  $\vec{d} = [0, -4]$   
 e)  $\vec{e} = [-1, 3]$       f)  $\vec{f} = [2, -5]$       g)  $\vec{g} = [-3, -1]$       h)  $\vec{h} = [2, 4]$

1.2. Odczytaj z rysunku współrzędne wektorów:



1.3. Oblicz współrzędne wektora  $\vec{AB}$ , jeśli:

- a)  $A(-2, 3), B(4, 0)$       b)  $A(0, -\sqrt{3}), B(2, 2\sqrt{3})$   
 c)  $A\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right), B(1, 3)$       d)  $A(-4, 8), B\left(5\frac{1}{2}, -6\right)$

1.4. Oblicz współrzędne wektorów  $\vec{AB}, \vec{CA}, \vec{BC}, \vec{BA}, \vec{AC}, \vec{CB}$ , jeśli:  $A(-2, -3)$   
 $B(1, -4), C(-4, 5)$ .

1.5. Oblicz długość wektorów:

a)  $\vec{u} = [-5, 12]$       b)  $\vec{v} = \left[4\frac{1}{2}, 6\right]$       c)  $\vec{p} = [-11, -60]$       d)  $\vec{s} = [2, -\sqrt{5}]$

1.6. Oblicz długość wektora  $\vec{AB}$ , jeśli:

a)  $A(2, 3), B(-1, 5)$       b)  $A(4, 0), B(6, -1)$   
 c)  $A(-4, -2), B(20, 5)$       d)  $A\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right), B(1, -2)$

1.7. Wyznacz współrzędne punktu  $B$ , jeśli:

a)  $A(0, 4), \vec{AB} = [-3, 5]$       b)  $A(-2, 5), \vec{AB} = [1, 8]$   
 c)  $A(4, -3), \vec{AB} = [0, -6]$       d)  $A(\sqrt{2}, 2\sqrt{2}), \vec{AB} = [3\sqrt{2}, -\sqrt{2}]$

1.8. Wyznacz współrzędne punktu  $A$ , jeśli:

a)  $B(-1, 6), \vec{AB} = [4, -1]$       b)  $B(2, -9), \vec{AB} = [-3, 2]$   
 c)  $B\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{6}\right), \vec{AB} = \left[\frac{1}{2}, -4\right]$       d)  $B(\sqrt{3}, -5), \vec{AB} = [2\sqrt{3}, 0]$

1.9. Dane są punkty  $A(-1, -3), B(-4, 3), C(2, 0), D(2, -9), E(-1, 6)$ . Sprawdź, które z wektorów  $\vec{AB}, \vec{BC}, \vec{CD}, \vec{AD}, \vec{AE}, \vec{CE}$  są równe, a które przeciwne.

1.10. Na odcinku  $AB$  wyznacz punkt  $P$  tak, aby wektory  $\vec{AP}$  i  $\vec{PB}$  były równe.

a)  $A(-3, 2), B(5, 6)$       b)  $A(-4, 5), B(1, 0)$

1.11. Dane są punkty  $A$  i  $B$ . Wyznacz współrzędne środka  $S$  odcinka  $AB$  trzema sposobami: 1) ze wzorów; 2) z równości wektorów  $\vec{AS}$  i  $\vec{SB}$ ; 3) z informacji, że wektory  $\vec{SA}$  i  $\vec{SB}$  są przeciwne.

a)  $A(-10, 4), B(6, -2)$       b)  $A(-2, 5), B(4, -3)$   
 c)  $A(-2, 4), B(0, 12)$       d)  $A(-4, -2), B(-3, -5)$

1.12. Punkt  $S$  jest środkiem odcinka  $AB$ . Wyznacz punkt  $B$ , jeśli:

a)  $A(-4, 3), S(0, 1)$       b)  $A(-6, 2), S(3, -1)$   
 c)  $A(-2, 4), \vec{AS} = [1, -3]$       d)  $A(4, 1), \vec{SA} = [6, 2]$


1.13. Punkt  $S$  jest punktem wspólnym odcinka  $AB$  i jego symetralnej. Wyznacz współrzędne punktu  $A$ , jeśli:

a)  $S(-2, 1), \vec{SB} = [5, -4]$       b)  $S(1, -1), \vec{BS} = [3, 7]$

1.14. Dane są cztery różne punkty  $A, B, C, D$ . Jeśli wektory  $\vec{AB}$  i  $\vec{CD}$  są równe, to co można powiedzieć o wektorach  $\vec{CA}$  i  $\vec{DB}$ ?

1.15. Punkt  $S$  jest punktem przecięcia przekątnych  $AD, EB$  i  $FC$  sześciokąta foremnego  $ABCDEF$ . Z danych na rysunku odcinków utwórz wektory, które są równe wektorowi:

a)  $\vec{AB}$       b)  $\vec{BC}$   
 c)  $\vec{ES}$



1.16. Wierzchołki trójkąta  $ABC$  mają współrzędne:  $A(-4, -2), B(5, -1), C(1, 3)$ . Oblicz długości boków trójkąta  $ABC$ . Sprawdź, czy trójkąt  $ABC$  jest prostokątny.

1.17. Dany jest trójkąt o wierzchołkach  $A(-2, -3), B(1, 4), C(-1, 3)$ .

- Oblicz obwód trójkąta  $ABC$ .
- Oblicz długość środkowej  $BD$ .

1.18. Dane są punkty  $A, B, C, D$ . Sprawdź, czy czworokąt  $ABCD$  jest równoległobokiem. Następnie oblicz jego obwód.

a)  $A(-2, 1), B(-1, -1), C(2, 5), D(1, 7)$   
 b)  $A(2, -5), B(7, 0), C(2, 5), D(0, 3)$

1.19. Punkty  $A(-3, -1), B(1, 2), C(2, 5)$  są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku  $ABCD$ .

- Oblicz współrzędne wierzchołka  $D$ .
- Oblicz współrzędne punktu  $S$  przecięcia się przekątnych.
- Oblicz długości przekątnych równoległoboku.

1.20. Oblicz współrzędne wierzchołków  $C$  i  $D$  równoległoboku  $ABCD$ , wiedząc, że  $A(-4, 4)$ ,  $B(-2, -1)$ , a przekątne  $AC$  i  $BD$  przecinają się w punkcie  $S(-1, 3)$ . Oblicz długości boków tego równoległoboku.

1.21. W trójkącie  $ABC$  dane są:  $A(-5, 2)$ ,  $C(1, 5)$ . Wiedząc, że  $\vec{CD} = [-2, -6]$ , gdzie  $D$  to środek boku  $AB$ , oblicz współrzędne wierzchołka  $B$  oraz długość boku  $AB$ .

## Przesunięcie równoległe. Przesunięcie równoległe wzdłuż osi $OX$

1.22. Wyznacz współrzędne punktu  $A_1$ , będącego obrazem punktu  $A$  w przesunięciu równoległym o wektor  $\vec{u}$ , jeśli:

a)  $A(9, -1)$ ,  $\vec{u} = [-8, 3]$    b)  $A(-3, 5)$ ,  $\vec{u} = [6, 0]$    c)  $A(4, 7)$ ,  $\vec{u} = [1, 3]$

1.23. Obrazem punktu  $B$  w przesunięciu równoległym o wektor  $\vec{u}$  jest punkt  $B_1$ . Wyznacz współrzędne punktu  $B$ , jeśli:

a)  $B_1(1, 2)$ ,  $\vec{u} = [-5, 0]$    b)  $B_1(3, -2)$ ,  $\vec{u} = [-7, 1]$    c)  $B_1(5, 1)$ ,  $\vec{u} = [4, 6]$

1.24. Funkcja  $f$  jest opisana za pomocą tabeli:

$x$	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	0	1	2	0	1	2

Wykonaj tabelę, opisującą funkcję  $h$ , której wykres powstanie w wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji  $f$ :

a) o 3 jednostki w prawo                      b) o 2 jednostki w lewo.

Przeanalizuj dziedziny i zbiory wartości funkcji  $f$  i  $h$ .

1.25. Funkcja  $f$  jest opisana za pomocą tabeli:

$x$	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	-10	-5	0	5	10

Przedstaw za pomocą tabelki funkcję  $g$ , opisaną wzorem:

a)  $g(x) = f(x - 9)$


b)  $g(x) = f(x + 53)$ .

1.26. Podaj, o ile jednostek, i w którą stronę należy przesunąć wykres funkcji  $f$  wzdłuż osi  $OX$ , aby otrzymać wykres funkcji:


a)  $y = f(x - 4)$    b)  $y = f(x + 6)$    c)  $y = f(x + 5)$    d)  $y = f(x - 10)$ .

W każdym przypadku podaj współrzędne wektora przesunięcia.

1.27. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji  $f$ . Naszkicuj wykresy funkcji  $g(x) = f(x - 4)$  oraz  $h(x) = f(x + 1)$ . Odczytaj z wykresu dziedzinę funkcji  $f$ ,  $g$  oraz  $h$ .




1.28. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji  $f$ . Naszkicuj wykresy funkcji  $g(x) = f(x + 3)$  oraz  $h(x) = f(x - 2)$ . Odczytaj z wykresu miejsca zerowe funkcji  $f$ ,  $g$  oraz  $h$ .



1.29. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji  $f$ . Naszkicuj wykresy funkcji  $g(x) = f(x + 2)$  oraz  $h(x) = f(x - 5)$ . Odczytaj z wykresu wartości funkcji  $f$  dla argumentów: -2, 0 oraz 4. Podaj wartość wyrażenia:

a)  $g(-4) \cdot g(-2) + g(2)$

b)  $h(3) \cdot [h(5) - h(9)]$ .



1.30. Podaj wzór funkcji  $g$ , której wykres otrzymamy po przesunięciu równoległym wykresu funkcji  $f$  wzdłuż osi  $OX$ :

a) o 3 jednostki w lewo, jeśli  $f(x) = \sqrt{x}$

b) o 2 jednostki w prawo, jeśli  $f(x) = x^2$

c) o 5 jednostek w prawo, jeśli  $f(x) = -\frac{1}{2}x$

d) o 1 jednostkę w lewo, jeśli  $f(x) = |x|$

e) o 1 jednostkę w lewo, jeśli  $f(x) = x^3$

f) o 3 jednostki w prawo, jeśli  $f(x) = \frac{1}{x}$ .

W każdym przypadku naszkicuj wykres funkcji  $g$  oraz podaj współrzędne wektora przesunięcia.

1.31. Podaj współrzędne wektora  $\vec{u}$ , wiedząc, że w wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji  $f$  o wektor  $\vec{u}$  otrzymano wykres funkcji  $g$ , jeśli:

a)  $f(x) = 2x^2$  i  $g(x) = 2(x-5)^2$

b)  $f(x) = \sqrt{x}$  i  $g(x) = \sqrt{x+10}$

c)  $f(x) = \frac{2}{x}$  i  $g(x) = \frac{2}{x-3}$

d)  $f(x) = 0,5x^3$  i  $g(x) = 0,5(x+8)^3$

e)  $f(x) = -x^3$  i  $g(x) = -(x-1)^3$

f)  $f(x) = |x|$  i  $g(x) = |x-4|$

1.32. Naskicuj wykres funkcji  $g(x) = (x-3)^2$ , określonej w zbiorze  $\mathbf{R}$ . Odczytaj z wykresu:

- a) wartość funkcji  $g$  dla argumentu 1,  
b) maksymalne przedziały monotoniczności funkcji  $g$ .

1.33. Naskicuj wykres funkcji  $g(x) = \sqrt{x+2}$ .

- a) Podaj dziedzinę funkcji  $g$ .  
b) Podaj miejsce zerowe funkcji  $g$ .

1.34. Naskicuj wykres funkcji  $g$ , opisanej wzorem  $g(x) = \frac{1}{x-1}$ .


- a) Określ dziedzinę funkcji  $g$ .  
b) Oblicz współrzędne punktu, w którym wykres funkcji  $g$  przecina oś  $OY$ .  
c) Podaj maksymalne przedziały, w których funkcja  $g$  jest malejąca.

1.35. Funkcję  $f$  określa wzór  $f(x) = x^3$ , gdzie  $x \in (-2, 2)$ . Wykres funkcji  $g$  powstaje w wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji  $f$  o wektor  $\vec{u} = [-2, 0]$ .

- a) Podaj wzór funkcji  $g$ .  
b) Naskicuj wykresy funkcji  $f$  i  $g$  w jednym układzie współrzędnych.  
c) Porównaj miejsca zerowe funkcji  $g$  z miejscem zerowym funkcji  $f$ .

1.36. Na rysunku obok znajduje się wykres funkcji  $f(x) = |x|$ , gdzie  $x \in (-5, 3)$ . Funkcję  $g$  określa wzór  $g(x) = f(x-4)$ .

- a) Wyznacz dziedzinę funkcji  $g$ .  
b) Podaj maksymalne przedziały monotoniczności funkcji  $g$ .



1.37. Dziedziną funkcji  $f$  jest zbiór  $D_f = \langle -8, 7 \rangle$ . Podaj dziedzinę funkcji  $g$ , jeśli:

a)  $g(x) = f(x+2)$

b)  $g(x) = f(x-10)$

c)  $g(x) = f(x-137)$

d)  $g(x) = f(x+2009)$

1.38. Miejscami zerowymi funkcji  $f$  są liczby  $-4, 0$  oraz  $6$ , a jej zbiorem wartości przedział liczbowy  $\langle -3, 5 \rangle$ . Podaj miejsca zerowe oraz zbiór wartości funkcji  $g$ , jeśli  $g(x) = f(x+8)$ .

1.39. Punkty  $(-2, 5)$ ,  $(3, 1)$ ,  $(4, -6)$  należą do wykresu funkcji  $f$ . Podaj trzy punkty, które należą do wykresu funkcji, określonej wzorem:

a)  $g(x) = f(x-15)$

b)  $h(x) = f(x+21)$

c)  $k(x) = f(x-7) + x$

1.40. Dany jest wzór funkcji  $f$  i współrzędne wektora  $\vec{u}$ . Wyznacz wzór funkcji  $g$ , której wykres otrzymamy po przesunięciu równoległym wykresu funkcji  $f$  o wektor  $\vec{u}$ .

a)  $f(x) = x^2 + 1$ ,  $\vec{u} = [5, 0]$



b)  $f(x) = 2x - 1$ ,  $\vec{u} = [-3, 0]$


c)  $f(x) = x^2 - 3x$ ,  $\vec{u} = [-1, 0]$

d)  $f(x) = (x+1)(x-5)$ ,  $\vec{u} = [4, 0]$

## Przesunięcie równoległe wzdłuż osi $OY$

1.41. Znajdź obrazy następujących figur w przesunięciu równoległym o podany wektor.





1.42. Funkcja  $f$  jest opisana za pomocą tabeli:

$x$	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	4	3	2	0	1	2

Wykonaj tabelę, opisującą funkcję  $h$ , której wykres powstanie w wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji  $f$ :

- a) o 2 jednostki do góry                      b) o 7 jednostek do dołu.

Porównaj dziedziny i zbiory wartości funkcji  $f$  i  $h$ .



1.43. Funkcja  $f$  jest opisana za pomocą tabeli:

$x$	-3	-2	0	1	6	28
$f(x)$	-4	-1	2	9	11	81

Opisz za pomocą tabelki funkcję określoną wzorem:

- a)  $g(x) = f(x) + 6$                       b)  $g(x) = f(x) - 21$

1.44. O jaki wektor należy przesunąć wykres funkcji  $f$ , aby otrzymać wykres funkcji  $g$ ?




1.45. Podaj, o ile jednostek i w którą stronę należy przesunąć równoległe wykres funkcji  $f$  wzdłuż osi  $OY$ , aby otrzymać wykres funkcji  $g$ , jeśli:


- a)  $g(x) = f(x) - 4$   
 b)  $g(x) = f(x) + 2$   
 c)  $g(x) = f(x) + 8$   
 d)  $g(x) = f(x) - 3$

W każdym przypadku podaj współrzędne wektora przesunięcia.


1.46. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji  $f$ . Naskicuj wykresy funkcji  $g(x) = f(x) - 1$  oraz  $h(x) = f(x) + 4$ . Odczytaj z wykresu wartość funkcji  $f$  dla argumentu  $(-2)$ . Oblicz wartość wyrażenia  $3 \cdot g(-2) - 8 \cdot h(-2)$ .



1.47. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji  $f$ . Naskicuj wykresy funkcji  $g(x) = f(x) + 5$  oraz  $h(x) = f(x) - 2$ . Odczytaj z rysunku współrzędne punktu, w którym wykres funkcji  $f$  przecina oś  $OY$ . Oblicz wartość wyrażenia  $g(0) \cdot h(0)$ .



1.48. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji  $f$ . Naszkicuj wykresy funkcji  $g(x) = f(x) + 2$  oraz  $h(x) = f(x) - 5$ . Odczytaj współrzędne punktów, w których wykresy funkcji  $f$ ,  $g$  oraz  $h$  przecinają oś  $OY$ . Podaj miejsca zerowe funkcji  $f$ ,  $g$  oraz  $h$  (o ile takie istnieją).



1.49. Podaj wzór funkcji  $g$ , której wykres otrzymamy po przesunięciu równoległym wykresu funkcji  $f$  względem osi  $OY$ :

- o 5 jednostek do góry, jeśli  $f(x) = -2x + 1$
- o 3 jednostki do dołu, jeśli  $f(x) = \sqrt{x}$
- o 7 jednostek do dołu, jeśli  $f(x) = 3x^2$
- o 4 jednostki do góry, jeśli  $f(x) = |x|$
- o 2 jednostki w dół, jeśli  $f(x) = \frac{4}{x}$
- o 3 jednostki do góry, jeśli  $f(x) = \frac{1}{5}x^3$ .

W każdym przypadku podaj współrzędne wektora przesunięcia.

1.50. Dany jest wzór funkcji  $f$  i wektor  $\vec{u}$ . Podaj wzór funkcji  $g$ , której wykres otrzymamy po przesunięciu równoległym wykresu funkcji  $f$  o wektor  $\vec{u}$ , jeśli:

- $f(x) = -4\sqrt{x}$ ,  $\vec{u} = [0, 4]$
- $f(x) = 3x^2$ ,  $\vec{u} = [0, -1]$
- $f(x) = \frac{5}{x}$ ,  $\vec{u} = [0, 2]$
- $f(x) = -\frac{1}{2}|x|$ ,  $\vec{u} = [0, -8]$ .

1.51. W prostokątnym układzie współrzędnych naszkicuj wykres funkcji  $g$ , opisanej wzorem  $g(x) = \frac{1}{x} + 2$ . Następnie podaj:

- miejsce zerowe funkcji  $g$ ,
- zbiór wartości funkcji  $g$ ,
- przedziały monotoniczności funkcji  $g$ .

1.52. W prostokątnym układzie współrzędnych naszkicuj wykres funkcji  $g$ , opisanej wzorem  $g(x) = x^2 - 1$ . Odczytaj z wykresu:

- miejsca zerowe funkcji  $g$ ,
- zbiór wartości funkcji  $g$ ,
- maksymalny przedział, w którym funkcja  $g$  jest malejąca.

1.53. W prostokątnym układzie współrzędnych naszkicuj wykres funkcji  $g$ , opisanej wzorem  $g(x) = \sqrt{x} + 3$ . Odczytaj z wykresu:


- argument, dla którego wartość funkcji  $g$  wynosi 5,
- wartość funkcji  $g$  dla argumentu 9,
- zbiór wszystkich wartości, jakie funkcja  $g$  przyjmuje dla argumentów z przedziału  $(0, 4)$ .

1.54. Funkcję  $f$  określa wzór  $f(x) = |x|$ , gdzie  $x \in (-5, 4)$ . Wykres funkcji  $g$  powstaje w wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji  $f$  o wektor  $\vec{u} = [0, -4]$ .

- Podaj wzór funkcji  $g$ .
- Naszkicuj wykresy funkcji  $f$  i  $g$  w jednym układzie współrzędnych.
- Podaj najmniejszą wartość funkcji  $f$  oraz najmniejszą wartość funkcji  $g$ .

1.55. Na rysunku obok znajduje się wykres funkcji  $f(x) = x^3$ , gdzie  $x \in (-1, 2)$ . Funkcję  $g$  określa wzór  $g(x) = f(x) - 1$ .

- Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji  $g$ .
- Wyznacz współrzędne punktu przecięcia wykresu funkcji  $g$  z osią  $OY$ .



1.56. Zbiorem wartości funkcji  $f$  jest przedział liczbowy  $(-4, 6)$ . Wyznacz zbiór wartości funkcji  $g$ , określonej wzorem:

- $g(x) = f(x) - 12$
- $g(x) = f(x) + 30$
- $g(x) = f(x) - 212$
- $g(x) = f(x) + 2345$

1.57. Punkty  $(-3, 1)$ ,  $(2, -4)$  należą do wykresu funkcji  $f$ . Podaj dwa punkty, które należą do wykresu funkcji, określonej wzorem:

- $g(x) = f(x) - 6$
- $h(x) = f(x) + 21$
- $k(x) = f(x) - 7 + x$

**1.58.** Dany jest wzór funkcji  $f$  i współrzędne wektora  $\vec{u}$ . Wyznacz wzór funkcji  $g$ , której wykres otrzymamy w wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji  $f$  o wektor  $\vec{u}$ .

a)  $f(x) = x^2 + 1, \vec{u} = [0, -5]$

b)  $f(x) = 2x - 1, \vec{u} = [0, 1]$

c)  $f(x) = (x + 1)^2, \vec{u} = [0, 2]$

**1.59.** Wykres funkcji liniowej  $f(x) = 2x$  przesunięto równoległe wzdłuż osi  $OX$  o wektor  $\vec{u} = [-3, 0]$  i otrzymano wykres funkcji  $g$ .

a) O jaki wektor  $\vec{v}$  można przesunąć równoległe wykres funkcji  $f$  wzdłuż osi  $OY$ , aby otrzymać wykres funkcji  $g$ ? Przeprowadź odpowiednie obliczenia. Następnie naszkicuj wykresy funkcji  $f$  i  $g$  w jednym układzie współrzędnych i zaznacz wektory przesunięcia.

b) Czy przesuując równoległe wykres funkcji  $f(x) = x^2$  raz o wektor  $\vec{u} = [-3, 0]$  i drugi raz o wektor  $\vec{v}$  otrzymamy wykres tej samej funkcji?

**1.60.** Wykres funkcji liniowej  $f(x) = \frac{-x}{2}$  przesunięto równoległe wzdłuż osi  $OY$  o wektor  $\vec{u} = [0, -2]$  i otrzymano wykres funkcji  $g$ . O jaki wektor  $\vec{v}$  można przesunąć równoległe wykres funkcji  $f$  wzdłuż osi  $OX$ , aby otrzymać wykres funkcji  $g$ ? Przeprowadź odpowiednie obliczenia. Następnie naszkicuj wykresy funkcji  $f$  i  $g$  w jednym układzie współrzędnych i zaznacz wektory  $\vec{u}$  i  $\vec{v}$ , zaczepione w punkcie  $O(0, 0)$ .

**1.61.** Funkcja  $f$  jest opisana za pomocą tabelki:

$x$	-4	-3	0	5	12	40	100
$f(x)$	-10	-8	-5	1	2	25	400

Opisz za pomocą tabelki funkcję  $g$  określoną wzorem:

a)  $g(x) = f(x - 1) + 5$

b)  $g(x) = f(x + 3) + 12$

c)  $g(x) = f(x - 15) - 100$

d)  $g(x) = f(x + 100) - 256$

**1.62.** Podaj współrzędne wektora  $\vec{u}$ , o jaki należy przesunąć wykres funkcji  $f$ , aby otrzymać wykres funkcji  $g$ , jeśli:

a)  $g(x) = f(x - 2) + 4$     b)  $g(x) = f(x + 1) + 5$     c)  $g(x) = f(x + 5) - 3$

d)  $g(x) = f(x - 7) - 2$     e)  $g(x) = f(x - \sqrt{3}) + 10$     f)  $g(x) = f(x + 4) - \sqrt{2}$ .

**1.63** Wykres funkcji  $f$  przesunąć równoległe o wektor  $\vec{u}$ . Napisz wzór funkcji  $g$ , której wykres otrzymałeś, jeśli:

a)  $f(x) = \sqrt{x}, \vec{u} = [1, 2]$

b)  $f(x) = x^2, \vec{u} = [-2, 3]$

c)  $f(x) = |x|, \vec{u} = [4, -5]$

d)  $f(x) = \frac{1}{x}, \vec{u} = [1, -3]$ .

**1.64.** Podaj współrzędne wektora  $\vec{u}$ , o jaki należy przesunąć wykres funkcji  $f$ , aby otrzymać wykres funkcji  $g$ , jeśli:

a)  $f(x) = |x|, g(x) = |x - 1| + 8$

b)  $f(x) = x^3, g(x) = (x + 20)^3 - 4$

c)  $f(x) = x^4, g(x) = (x + 3)^4 - 1$

d)  $f(x) = \frac{1}{2}x^2, g(x) = \frac{1}{2}(x - 1)^2 + 4$

e)  $f(x) = 3\sqrt{x}, g(x) = 3\sqrt{x + 2} + 6$

f)  $f(x) = \frac{4}{x}, g(x) = \frac{4}{x - 5} - 7$ .

**1.65.** Naszkicuj wykres funkcji:

a)  $y = (x + 2)^2 - 4$

b)  $y = |x + 3| + 1$

c)  $y = \sqrt{x - 1} - 2$

d)  $y = \frac{1}{x - 2} + 1$

e)  $y = (x + 1)^3 - 1$


f)  $y = \frac{x + 4}{2} + 3$ .

**1.66.** Na rysunku obok dany jest wykres funkcji  $f$ . Funkcją  $g$  określa wzór:  $g(x) = f(x + 2) + 5$ . Wyznacz:

a) przedziały monotoniczności funkcji  $g$

b) wartość największą i wartość najmniejszą funkcji  $g$  oraz dla jakich argumentów są one przyjmowane

c) wartość wyrażenia:  $g(-6) \cdot g(-2) + g(0) \cdot g(3)$ .



1.67. Dana jest dziedzina i zbiór wartości funkcji  $f$ . Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji  $g$ , jeśli:


- a)  $D_f = (-\infty, 3)$ ,  $ZW_f = (-4, 1)$ ,  $g(x) = f(x+5) + 2$   
 b)  $D_f = (-2, 8)$ ,  $ZW_f = (1, 9)$ ,  $g(x) = f(x-7) - 10$   
 c)  $D_f = \mathbb{R} - \{5\}$ ,  $ZW_f = (-2, +\infty)$ ,  $g(x) = f(x+6) - 5$   
 d)  $D_f = (-8, 1)$ ,  $ZW_f = (-\infty, 6)$ ,  $g(x) = f(x-3) + 4$ .

1.68. Podaj wzór funkcji  $g$ , której wykres otrzymamy, przesuując równolegle wykres funkcji  $f$  o wektor  $\vec{u}$ , jeśli:

- a)  $f(x) = x^2 - x + 3$ ,  $\vec{u} = [-4, -5]$       b)  $f(x) = \frac{x}{x+2}$ ,  $\vec{u} = [3, 1]$   
 c)  $f(x) = -3x^2 + 5$ ,  $\vec{u} = [-1, 2]$       d)  $f(x) = 2(x+1)(x-1)$ ,  $\vec{u} = [-2, 7]$ .

## Symetria osiowa. Symetria osiowa względem osi $OX$ i $OY$

1.69. Znajdź obrazy danych figur w symetrii osiowej względem prostej  $k$ .




1.70. Zapoznaj się z poniższą definicją, a następnie wykonaj ćwiczenia.

„Prostą  $k$  nazywamy **osią symetrii** figury  $F$  wtedy, gdy obrazem figury  $F$  w symetrii względem prostej  $k$  jest ta sama figura  $F$ , czyli  $S_k(F) = F$ .

Figury, które mają oś symetrii nazywamy figurami **osiowosymetrycznymi**”.

1) Poniżej przedstawione są figury osiowosymetryczne. Ile osi symetrii ma każda z nich?



- 2) Podaj przykład figury, która ma sześć osi symetrii.  
 3) Podaj przykład figury, która nie jest osiowosymetryczna.  
 4) Ile osi symetrii ma trójkąt:  
 – różnoboczny  
 – równoramienny, który nie jest równoboczny  
 – równoboczny?

1.71. Funkcja  $f$  jest opisana za pomocą tabelki:

a)


$x$	-42	-30	6	15	17	2012
$f(x)$	-14	-12	15	6	90	143

b)


$x$	-23	-15	15	64	198	200
$f(x)$	112	-10	6	-15	90	143

Przedstaw za pomocą tabelki funkcję  $g$ , jeśli  $g(x) = -f(x)$ .


1.72. Na rysunkach jest przedstawiony wykres funkcji  $f$ . Naskicuj wykres funkcji  $g$ , określonej wzorem  $g(x) = -f(x)$ . Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji  $g$ .



c)



d)



**1.73.** Napisz wzór funkcji  $g$ , której wykres otrzymamy po przekształceniu wykresu funkcji  $f$  przez symetrię osiową względem osi  $OX$ .

a)  $f(x) = 3x - 2$

b)  $f(x) = -5x + 8$

c)  $f(x) = x^3 + 8$

d)  $f(x) = 1 - x^2$

e)  $f(x) = |x| - 15$

f)  $f(x) = \sqrt{x} + 7$

**1.74.** Dana jest funkcja  $f$ . Napisz wzór funkcji, której wykres jest symetryczny do wykresu funkcji  $f$  względem osi  $OX$ . Naszkicuj wykresy obu funkcji w jednym układzie współrzędnych.

a)  $f(x) = -4$

b)  $f(x) = x - 3$

c)  $f(x) = x^2$

d)  $f(x) = x^3$

e)  $f(x) = \sqrt{x+2}$

f)  $f(x) = x^2 - 1$

**1.75.** Dana jest dziedzina i zbiór wartości funkcji  $f$ . Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji  $g$ , określonej wzorem  $g(x) = -f(x)$ .

a)  $D_f = \langle -4, 3 \rangle$ ,  $ZW_f = (-1, 5)$

b)  $D_f = \mathbf{R} - \{3\}$ ,  $ZW_f = \langle -4, +\infty \rangle$

**1.76.** Funkcja  $f$  jest opisana za pomocą tabelki:


$x$	-10	-6	-4	-3	1	2	7
$f(x)$	-5	-4	-1	0	2	5	13

$x$	-46	-26	0	1	17	28	67
$f(x)$	-5	46	-7	-23	-22	11	13


Przedstaw za pomocą tabelki funkcję określoną wzorem  $g(x) = f(-x)$ .

**1.77.** Na podstawie wykresu funkcji  $f$  naszkicuj wykres funkcji  $g$ , określonej wzorem  $g(x) = f(-x)$ . Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji  $g$ .


a)




b)



c)



d)



**1.78.** Dany jest wzór funkcji  $f$ . Napisz wzór funkcji  $h$ , której wykres jest symetryczny względem osi  $OY$  do wykresu funkcji  $f$ . Podaj dziedzinę funkcji  $h$ . Naszkicuj wykresy obu funkcji w jednym układzie współrzędnych, jeśli:

a)  $f(x) = x + 2$ , gdzie  $x \in \langle -4, 2 \rangle$

b)  $f(x) = \frac{1}{x}$ , gdzie  $x \in (-\infty, 0)$

c)  $f(x) = -2$ , gdzie  $x \in \langle -5, 1 \rangle$

d)  $f(x) = x^3 - 2$ , gdzie  $x \in \langle -1, 2 \rangle$

e)  $f(x) = \sqrt{x}$ , gdzie  $x \in (0, 4)$

f)  $f(x) = (x+1)^2$ , gdzie  $x \in \langle -3, 1 \rangle$ .

**1.79.** Wykres funkcji  $g$  powstał w wyniku przekształcenia wykresu funkcji  $f$  przez symetrię osiową względem osi  $OY$ . Napisz wzór funkcji  $g$  i podaj jej dziedzinę, jeśli:

a)  $f(x) = 5x - 4$

b)  $f(x) = \sqrt{x} + 2$

c)  $f(x) = |x + 3|$

d)  $f(x) = \frac{1}{x+6}$

e)  $f(x) = \sqrt{x-4}$

f)  $f(x) = \frac{2x}{1-x}$

1.80. Dana jest dziedzina i zbiór wartości funkcji  $f$ . Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji  $g$ , określonej wzorem  $g(x) = f(-x)$ .


a)  $D_f = \langle -4, 3 \rangle$ ,  $ZW_f = \langle -1, 5 \rangle$       b)  $D_f = \mathbf{R} - \{3\}$ ,  $ZW_f = \langle -4, +\infty \rangle$

1.81. Naskizuj wykres funkcji:

a)  $f(x) = -|x| - 2$       b)  $f(x) = (-x)^3 + 1$       c)  $f(x) = -(x^3 + 1)$   
 d)  $f(x) = -\sqrt{x+4}$       e)  $f(x) = \sqrt{-x+4}$       f)  $f(x) = (-x+2)^2$

1.82. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji  $f$ . Dla każdej z funkcji  $g(x) = f(-x)$  oraz  $h(x) = -f(x)$ , podaj:

- a) zbiór argumentów, dla których ta funkcja przyjmuje wartości ujemne  
 b) maksymalne przedziały, w których ta funkcja jest rosnąca  
 c) największą wartość tej funkcji  
 d) współrzędne punktu przecięcia wykresu tej funkcji z osią  $OY$ .



1.83. Funkcja  $f$  ma trzy miejsca zerowe:  $-5, 1, 6$  oraz wiadomo, że  $f(0) = 4$  i  $f(3) = -2$ . Podaj miejsca zerowe funkcji  $g$  i współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji  $g$  z osią  $OY$ , jeśli:

a)  $g(x) = f(-x)$       b)  $g(x) = -f(x)$       c)  $g(x) = -f(x+3)$

1.84. Napisz wzór funkcji, której wykres otrzymamy w wyniku przekształcenia wykresu funkcji  $f(x) = (x-1)^3$  przez symetrię względem:

- a) osi  $OX$       b) osi  $OY$ .


1.85. Napisz wzór funkcji, której wykres otrzymamy w wyniku przekształcenia wykresu funkcji  $f(x) = \frac{3-x}{2x}$  przez symetrię względem:

- a) osi  $OX$       b) osi  $OY$ .

## Symetria środkowa.

### Symetria środkowa względem punktu $(0, 0)$


1.86. Znajdź obraz danej figury w symetrii środkowej względem punktu  $O$ , jeśli:



1.87. Zapoznaj się z poniższą definicją, a następnie wykonaj ćwiczenia.

„Punkt  $O$  nazywamy **środkiem symetrii** figury  $F$  wtedy, gdy obrazem figury  $F$  w symetrii środkowej względem punktu  $O$  jest ta sama figura, czyli  $S_O(F) = F$ . Figury, które mają środek symetrii nazywamy **figurami środkowosymetrycznymi**.”

1) Wśród poniższych figur znajdują się figury środkowosymetryczne. Wskaż je.



- 2) Podaj przykład figury geometrycznej, która ma jeden środek symetrii, i figury geometrycznej, która ma nieskończenie wiele środków symetrii.  
 3) Narysuj dwie figury, które mają jednocześnie oś symetrii i środek symetrii.





1.88. Funkcja  $f$  jest opisana za pomocą tabelki:

$x$	-4	-3	0	8	11	30	45
$f(x)$	-20	-8	-6	2	5	31	80

$x$	-17	-12	10	26	103	115	170
$f(x)$	-2	-11	-90	27	24	1	-80

Opisz funkcję  $g$  za pomocą tabelki, jeśli  $g(x) = -f(-x)$ .

1.89. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji  $f$ . Naszkicuj wykres funkcji  $g$ , określonej wzorem  $g(x) = -f(-x)$ . Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji  $g$ .




1.90. Wykres funkcji  $g$  jest symetryczny do wykresu funkcji  $f$  względem punktu  $(0,0)$ . Naszkicuj wykresy funkcji  $f$  oraz  $g$  we wspólnym układzie współrzędnych. Napisz wzór funkcji  $g$  i podaj jej dziedzinę, jeśli:

- a)  $f(x) = x + 4$ , gdzie  $x \in (-3, 0)$   
 b)  $f(x) = \sqrt{x}$ , gdzie  $x \in (0, 4)$   
 c)  $f(x) = x^2$ , gdzie  $x \in (-1, 3)$   
 d)  $f(x) = \frac{1}{x}$ , gdzie  $x \in (1, 4)$   
 e)  $f(x) = -1$ , gdzie  $x \in (-5, 6)$   
 f)  $f(x) = |x|$ , gdzie  $x \in (-4, 2)$ .

1.91. Na rysunku obok jest przedstawiony wykres funkcji  $f$ . Funkcję  $g$  określa wzór:  $g(x) = -f(-x)$ . Podaj:

- a) zbiór wartości funkcji  $g$   
 b) miejsce zerowe funkcji  $g$   
 c) wartość wyrażenia  $g(-3) \cdot g(3) - g(4)$   
 d) maksymalne przedziały, w których funkcja  $g$  jest malejąca.



1.92. Dana jest dziedzina i zbiór wartości funkcji  $f$ . Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji  $g$ , określonej wzorem  $g(x) = -f(-x)$ .

- a)  $D_f = (-3, 7)$ ,  $ZW_f = (0, 4)$   
 b)  $D_f = (-1, 5)$ ,  $ZW_f = (-6, 2)$   
 c)  $D_f = (-\infty, 9)$ ,  $ZW_f = \mathbb{R} - \{-8\}$   
 d)  $D_f = (-4, \sqrt{2})$ ,  $ZW_f = (-1, +\infty)$

1.93. Dany jest wzór funkcji  $f$ . Napisz wzór funkcji  $g$ , której wykres otrzymamy przekształcając wykres funkcji  $f$  przez symetrię środkową względem punktu  $O(0, 0)$ . Oblicz miejsca zerowe i współrzędne punktu przecięcia wykresu funkcji  $g$  z osią  $OY$  (o ile istnieją).

- a)  $f(x) = -4x + 7$   
 b)  $f(x) = 3$   
 c)  $f(x) = x^2 - 1$   
 d)  $f(x) = x^3 + 8$   
 e)  $f(x) = \sqrt{x} - 1$   
 f)  $f(x) = 3(x - 2)(x + 1)$

## Zastosowanie wykresów funkcji do rozwiązywania równań i nierówności

1.94. Odczytaj z wykresu funkcji  $f(x) = (x + 2)^2$  argumenty, dla których funkcja  $f$  przyjmuje wartość 1. Następnie rozwiąż algebraicznie równanie  $(x + 2)^2 = 1$ .

1.95. Odczytaj z wykresu funkcji  $f(x) = \sqrt{-x}$  argument, dla którego funkcja  $f$  przyjmuje wartość 2. Następnie rozwiąż algebraicznie równanie  $\sqrt{-x} = 2$ .

1.96. Naszkicuj wykres funkcji  $f(x) = |x - 2| - 3$ . Następnie podaj zbiór rozwiązań równania  $f(x) = -2$ .

1.97. Korzystając z wykresu odpowiedniej funkcji rozwiąż równanie:

- a)  $|x| = x$   
 b)  $\frac{1}{x-5} = -1$   
 c)  $(x + 2)^3 = -8$

1.98. Korzystając z wykresów odpowiednich funkcji rozwiąż równanie:

a)  $x^2 - 2 = -x$

b)  $(x-3)^2 = x-1$

c)  $-\frac{1}{x} + 1 = |x-1|$

1.99. Korzystając z wykresów odpowiednich funkcji rozwiąż równanie:

a)  $x^3 = |x-2|$

b)  $2-x^2 = |x|$

c)  $\sqrt{x+2} = \sqrt{x-6} + 2$

1.100. Naszkicuj wykres funkcji  $f(x) = \frac{1}{x+3}$ . Odczytaj z wykresu zbiór rozwiązań nierówności  $f(x) < 1$ .

1.101. Naszkicuj wykres funkcji  $f(x) = \sqrt{-x}$ . Odczytaj z wykresu zbiór rozwiązań nierówności  $f(x) < 2$ .

1.102. Naszkicuj wykres funkcji  $f(x) = (x-2)^2 - 3$ . Odczytaj z wykresu zbiór rozwiązań nierówności  $f(x) \geq 1$ .

1.103. Naszkicuj w jednym układzie współrzędnych wykresy funkcji  $f(x) = -\sqrt{-x}$  oraz  $g(x) = |x| - 2$ .

- a) Podaj argument, dla którego funkcje  $f$  i  $g$  przyjmują tę samą wartość.  
b) Rozwiąż nierówność  $f(x) > g(x)$ .

1.104. Korzystając z wykresów odpowiednich funkcji rozwiąż nierówność:

a)  $x^3 > x$

b)  $\sqrt{x-2} \leq 5 - \frac{1}{2}x$

c)  $\sqrt{-x} \geq x+2$

1.105. Korzystając z wykresów odpowiednich funkcji rozwiąż nierówność:

a)  $-|x| < \frac{1}{2}x - 3$

b)  $\frac{-1}{x+1} \geq (x+1)^2$

c)  $\frac{1}{x-4} - 1 > -|x-5|$

## Test sprawdzający do rozdziału 1.

1. Środek odcinka  $AB$  ma współrzędne  $(13, -2)$ . Jeśli  $A(-7, 4)$ , to:

A.  $B(3, 1)$

B.  $B(10, -6)$

C.  $B(23, 8)$

D.  $B(33, -8)$

2. Wektorem przeciwnym do wektora  $\vec{a} = [4, -5]$  jest wektor o współrzędnych:

A.  $[\frac{1}{4}, -\frac{1}{5}]$

B.  $[-\frac{1}{4}, \frac{1}{5}]$

C.  $[5, -4]$

D.  $[-4, 5]$

3. Długość wektora  $\vec{b} = [-3, 4]$  jest równa:

A. 7

B. 5

C. 4

D. 3

4. Jeśli  $A(9, -2)$  i  $\vec{AB} = [-6, 7]$ , to punkt  $B$  ma współrzędne:

A.  $(-3, -5)$

B.  $(3, 5)$

C.  $(5, 3)$

D.  $(3, -5)$

5. Dany jest wektor  $\vec{u} = [3, -2]$ . Wskaż wektor, który nie jest równoległy do wektora  $\vec{u}$ .

A.  $\vec{a} = [\frac{3}{4}, -\frac{1}{2}]$

B.  $\vec{b} = [-3, 2]$

C.  $\vec{c} = [57, -38]$

D.  $\vec{d} = [-2, 3]$

6. W wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji  $f(x) = \sqrt{x}$  o 4 jednostki do góry otrzymamy wykres funkcji:

A.  $g(x) = \sqrt{x} + 4$

B.  $g(x) = \sqrt{x} - 4$

C.  $g(x) = \sqrt{x+4}$

D.  $g(x) = \sqrt{x-4}$

7. Wykres funkcji  $f(x) = |x+5| + 1$  powstaje w wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji  $y = |x|$  o wektor:


A.  $\vec{u} = [5, 1]$

B.  $\vec{u} = [5, -1]$



C.  $\vec{u} = [-5, 1]$



D.  $\vec{u} = [-5, -1]$

8. Na rysunku obok przedstawiony jest wykres funkcji  $y = f(x)$ .



Wykres funkcji  $g(x) = f(x-3)$  przedstawiony jest na rysunku:










9. W wyniku przekształcenia wykresu funkcji  $f(x) = -x^2 + 3x + 2$  przez symetrię względem osi  $OX$  otrzymujemy wykres funkcji, określonej wzorem:

- A.  $y = x^2 + 3x + 2$    B.  $y = x^2 - 3x - 2$    C.  $y = -x^2 - 3x + 2$    D.  $y = x^2 - 3x + 2$

10. Na rysunku obok przedstawiony jest wykres funkcji  $y = f(x)$ .



Wykres funkcji określonej wzorem  $g(x) = -f(-x)$  znajduje się na rysunku:



11. Dziedzina funkcji  $f$  jest przedział  $\langle -3, 2 \rangle$ . Wykres funkcji  $f$  przekształcono przez symetrię osiową względem osi  $OY$  i otrzymano wykres funkcji  $g$ . Dziedzina funkcji  $g$  jest przedział:

- A.  $\langle -2, 3 \rangle$    B.  $\langle -2, 3 \rangle$    C.  $\langle -3, 2 \rangle$    D.  $\langle -3, 2 \rangle$

12. Zbiorem wartości funkcji  $f$  jest przedział  $\langle -5, 1 \rangle$ . Wykres funkcji  $f$  przekształcono przez symetrię osiową względem osi  $OX$  i otrzymano wykres funkcji  $g$ . Wskaż zbiór wartości funkcji  $g$ .


- A.  $\langle -5, 1 \rangle$    B.  $\langle -5, 1 \rangle$    C.  $\langle -1, 5 \rangle$    D.  $\langle -1, 5 \rangle$

13. Funkcja  $y = f(x)$  ma dwa miejsca zerowe:  $-3$  oraz  $1$ . Miejscami zerowymi funkcji  $y = f(x + 1)$  są liczby:

- A.  $-2$  oraz  $2$    B.  $-4$  oraz  $0$    C.  $-2$  oraz  $0$    D.  $-4$  oraz  $2$

14. Na rysunku obok znajduje się wykres funkcji  $f$ , określonej w przedziale  $\langle -1, 8 \rangle$ . Wskaż zbiór rozwiązań równania  $-f(x + 1) = 2$ .

- A.  $\{-1\}$    B.  $\{3, 5\}$   
C.  $\{2, 4\}$    D.  $\{4, 6\}$



15. Wykres funkcji  $f$  jest przedstawiony w zadaniu 14. Wskaż zbiór rozwiązań nierówności  $f(-x) + 1 > 0$ .

- A.  $(2, 6)$    B.  $\langle -1, 2 \rangle \cup (6, 8)$    C.  $\langle -8, -6 \rangle \cup (-2, 1)$    D.  $(0, 8)$

## Zadania powtórzeniowe do rozdziału 1.

16. Dany jest punkt  $B(4, -3)$  oraz wektor  $\vec{AB} = [-2, 5]$ . Oblicz:

- a) współrzędne punktu  $A$ ,  
b) współrzędne punktu  $C$ , jeśli  $\vec{AC} = -3\vec{AB}$ .

17. W trójkącie  $ABC$  dane są:  $A(-7, -1)$ ,  $B(5, 1)$  oraz  $\vec{BD} = [-9, 1]$ , gdzie  $D$  to środek boku  $AC$ . Oblicz współrzędne punktu  $D$  oraz długość boku  $AC$ .

18. W trójkącie  $ABC$  dane są:  $A(-5, 2)$ ,  $B(3, -4)$ ,  $C(1, 5)$ . Wyznacz współrzędne punktu  $D$  tak, aby figura  $ABCD$  była równoległobokiem.

19. Dane są punkty:  $A(0, -3)$ ,  $B(4, -1)$ ,  $C(5, 3)$ ,  $D(-3, -1)$ . Korzystając z własności wektorów wykaż, że czworokąt  $ABCD$  jest trapezem.

20. Funkcja  $f$  jest określona wzorem  $f(x) = -x^2 + 10$ . Wykres funkcji  $g$  powstał w wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji  $f$  o 3 jednostki w lewo.

- Napisz wzór funkcji  $g$ .
- Do wykresu funkcji  $g$  należy punkt  $(-2, a)$ . Oblicz  $a$ .

21. Wykres funkcji liniowej  $f(x) = 3x + 5$  przesunięto o 2 jednostki w prawo i otrzymano wykres funkcji  $g$ .

- Podaj wzór funkcji  $g$ .
- O jaki wektor można przesunąć wykres funkcji  $g$  wzdłuż osi  $OY$ , aby otrzymać wykres funkcji  $f$ ?


22. Wykres funkcji  $f(x) = -2x^2$  przesunięto równoległe o wektor  $\vec{v} = [1, 4]$  i otrzymano wykres funkcji  $g$ . Wykaż, że  $g(x) = -2x^2 + 4x + 2$ .

23. Funkcja liniowa  $f$  jest określona wzorem  $f(x) = -2x + 3$ . Napisz wzór funkcji:

- $g$ , której wykres jest symetryczny do wykresu funkcji  $f$  względem osi  $OX$ ,
- $h$ , której wykres jest symetryczny do wykresu funkcji  $f$  względem osi  $OY$ ,
- $k$ , której wykres jest symetryczny do wykresu funkcji  $f$  względem punktu  $O(0, 0)$ .


24. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji  $y = f(x)$ .

- Naszkicuj wykres funkcji  $y = g(x)$ , gdzie  $g(x) = -f(x)$ .
- Podaj zbiór rozwiązań równania  $g(x) = -2$ .




25. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji  $y = f(x)$ .

- Naszkicuj wykres funkcji  $y = g(x)$ , gdzie  $g(x) = f(-x)$ .
- Podaj maksymalne przedziały, w których funkcja  $g$  jest rosnąca.



26. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji  $y = f(x)$ .

- Naszkicuj wykres funkcji  $y = g(x)$ , gdzie  $g(x) = f(x + 2) - 1$ .
- Podaj zbiór rozwiązań nierówności  $g(x) < 0$ .



27. Dziedzina funkcji  $f$  jest zbiór  $D_f = \langle -4, 8 \rangle$ , a jej zbiorem wartości jest zbiór  $ZW_f = \langle -1, +\infty \rangle$ . Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji:

- $y = f(-x)$
- $y = -f(x)$
- $y = f(x + 3) - 4$

28. Naszkicuj wykres funkcji  $f(x) = \frac{x}{2} + 1$ , gdzie  $x \in (-2, 0) \cup (0, 2)$ .

- Podaj wzór funkcji  $g$ , której wykres otrzymamy w wyniku przekształcenia wykresu funkcji  $f$  przez symetrię środkową względem punktu  $O(0, 0)$ .
- Na podstawie wykresu funkcji  $g$  rozwiąż nierówność  $g(x) \leq -1$ .

29. Rozwiąż graficznie równanie:

- $\frac{1}{x+5} = -x - 3$
- $(x - 1)^2 = 2x - 2$
- $-|x| = x^2 - 6$

30. Rozwiąż graficznie nierówność:


- $-x^3 \geq \sqrt{-x}$
- $|x - 2| > x^2$
- $\frac{-4}{x+1} \leq x + 6$

31. Podaj dwa kolejne przekształcenia, które można wykonać, aby z wykresu funkcji  $f(x) = \sqrt{x}$  otrzymać wykres funkcji:

- $g(x) = 7 - \sqrt{x}$
- $h(x) = \sqrt{7-x}$
- $k(x) = -(\sqrt{-x} + 7)$

32. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji  $f$ .

- Naszkicuj wykres funkcji  $g$ , określonej wzorem  $g(x) = f(-x) + 1$ .
- Podaj dziedzinę funkcji  $g$ .
- Podaj zbiór wartości funkcji  $g$ .
- Oblicz wartość wyrażenia  $[g(-4) + g(5)] \cdot [g(-3) - g(1)]$ .



## 2. Równania i nierówności z wartością bezwzględną

### Wartość bezwzględna liczby rzeczywistej

2.1. Oblicz:

a)  $\left| -2\frac{1}{2} \right| + \left| 1\frac{1}{2} \right|$

b)  $\left| -2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{3} \right|$

c)  $|-2,6| - |-3,3|$

d)  $|\sqrt{2} - 3|$

e)  $|2 - \sqrt{5}|$

f)  $|-2\sqrt{3} + \sqrt{12}|$

2.2. Oblicz wartość danego wyrażenia. Oceń, jaką liczbą – wymierną czy niewymierną – jest wynik obliczeń.

a)  $2\sqrt{3} - |3 - 2\sqrt{3}|$

b)  $2\pi - |2\pi - 7|$

c)  $|3 - \sqrt{2}| - |\sqrt{2} + 1,3|$

d)  $|\sqrt{2} - \sqrt{3}| + |2\sqrt{2} - \sqrt{3}|$

e)  $|3 - \pi| - |\pi - 3|$

f)  $|1 - \sqrt{3}| + |-1 + \sqrt{3}|$

2.3. Oblicz wartość danego wyrażenia. Oceń, jaką liczbą – wymierną czy niewymierną – jest wynik obliczeń.

a)  $3|1 - \sqrt{6}| - 3\sqrt{6}$

b)  $|1 - \sqrt{2}| \cdot |-\sqrt{2}|$

c)  $|1,8 - \sqrt{3}| + (-1)|\sqrt{3} - 3|$

d)  $-|-8| - |8 - \pi^2|$

2.4. Oblicz wartość wyrażenia:

a)  $\left| (\sqrt{6} - \sqrt{5})(\sqrt{5} + \sqrt{6}) \right| - 3 \cdot (\sqrt{20} - 2 \cdot |\sqrt{5} - 2|)$

b)  $\left( |\sqrt{75} - 4\sqrt{3}| - |\sqrt{27} - \sqrt{108}| + 1 \right) \cdot (1 + 2\sqrt{3})$

c)  $|4\sqrt{2} - 3\sqrt{8} + 5| \cdot |-2\sqrt{2} - 5|$

d)  $|3\sqrt{5} - 2\sqrt{125} + 10| \cdot |7\sqrt{5} - 10|$

2.5. Oblicz wartość wyrażenia:

a)  $\frac{|\sqrt{12} - 5|}{|\sqrt{3} - 2|} + |4 - \sqrt{3}|$

b)  $\frac{|4 - 2\sqrt{5}| \cdot |\sqrt{20} - 4|}{|-4(4\sqrt{5} - 9)|}$

c)  $\frac{(\sqrt{6} - 2\sqrt{3}) \cdot (2\sqrt{3} - \sqrt{6})}{2\sqrt{2} - 3}$

d)  $\frac{(\sqrt{5} - 2\sqrt{2})(\sqrt{5} + 2\sqrt{2})}{|\sqrt{5} - 1| \cdot |1 - \sqrt{5}|} + \frac{3}{6 + 2\sqrt{5}}$

2.6. Oblicz wartość wyrażenia:

a)  $2a \cdot |a - 3|$ , jeśli  $a = -4$

b)  $|2a - 3| \cdot (3 + 2a)$ , jeśli  $a = -\sqrt{3}$

2.7. Oblicz wartość wyrażenia:

a)  $|-1 - |2 - b|| + b$ , jeśli  $b = 3$

b)  $b - |-b + 1|$ , jeśli  $b = \sqrt{2}$

2.8. Oblicz wartość wyrażenia  $||a^2 - 200| - 3a| + 2a$  w przypadku, gdy:

a)  $a = -10$

b)  $a = \sqrt[3]{20 \cdot 3^3 + 2 \cdot 3^4 + 5 \cdot 3^5 + 2 \cdot 3^6}$

2.9. Zapisz podane wyrażenie bez użycia symbolu wartości bezwzględnej.

a)  $|a - 2|$ , jeśli  $a \in \langle 2, +\infty \rangle$

b)  $|3 + a|$ , jeśli  $a \in (-\infty, -3)$

c)  $|3a - 2|$ , jeśli  $a \in \langle 1, +\infty \rangle$

d)  $|4 - 8a|$ , jeśli  $a \in \langle 1, +\infty \rangle$

2.10. Zapisz podane wyrażenie bez użycia symbolu wartości bezwzględnej:

a)  $|-2a| \cdot |a - 1|$ , jeśli  $a \in (-\infty, -1)$

b)  $|1 + 2a| + |-3a|$ , jeśli  $a \in (-\infty, -2)$

c)  $2a - |3 - |a||$ , jeśli  $a \in (4, +\infty)$

d)  $|2a| - |1 - |a||$ , jeśli  $a \in (-\infty, -3)$

2.11. Napisz wzór funkcji  $f$  bez użycia symbolu wartości bezwzględnej. Następnie naskicuj wykres funkcji  $f$  w układzie współrzędnych.

a)  $f(x) = x - |x|$

b)  $f(x) = 2|x + 3|$

c)  $f(x) = 3 - |3 - 3x|$

d)  $f(x) = -\left| 1 - \frac{1}{3}x \right| + 2$

2.12. Napisz wzór funkcji  $f$  bez użycia symbolu wartości bezwzględnej. Następnie naskicuj wykres funkcji  $f$  w układzie współrzędnych.

a)  $f(x) = x \cdot |x|$

b)  $f(x) = \frac{|2x|}{x} + 1$

c)  $f(x) = |0,5x - 1| + x$

d)  $f(x) = x - |4 + x|$

**D 2.13.** Wykaż, że wartość podanego wyrażenia jest stała.

- a)  $|a-3| - |a-2|$ , jeśli  $a \in (-\infty, 0)$   
 b)  $|4-a| + |2+a|$ , jeśli  $a \in (-2, 4)$   
 c)  $|a-3| - |a+4|$ , jeśli  $a \in (3, +\infty)$   
 d)  $|a+1| - |a+5|$ , jeśli  $a \in (-\infty, -5)$

**D 2.14.** Wykaż, że jeśli  $a$  jest liczbą ujemną i  $b$  jest liczbą dodatnią, to  $|-3a+4b| - 2|3b-a| = -a-2b$ .

**D 2.15.** Wykaż, że jeśli liczby  $x$  i  $y$  są ujemne, to

$$|2x+y| \cdot |-2x-y| - |4x^2+y^2| = 4xy.$$

**D 2.16.** Wykaż, że jeśli  $a > b > 0$ , to  $2(b^2 - |ab|) + |b-a| \cdot |a+b| > 0$ .

**2.17.** Oblicz:

a)  $\left| 1 + \log_{\frac{1}{3}} 9 \right| - \left| 5 + 8^{\frac{1}{3}} \right| \cdot \left| -2 \log_2 4 - \left( \frac{1}{3} \right)^{-2} \right|$

b)  $2 - \left| 2 \log_5 25 - 81^{\frac{3}{4}} \right| - \left| (1 - \sqrt{3})(1 + \sqrt{3}) \right|$

c)  $\left| -3 \log_{\frac{1}{2}} 0,25 - \sqrt[3]{216} \right| - \left| 0,75^{-\frac{1}{2}} - \sqrt{3} \right| \cdot \sqrt{3}$

d)  $\left| 3^{\log_3 2} - 5 \right| \cdot 16^{\frac{3}{4}} - 0,5^{-3} - \log_{81} 9$

**Odległość między liczbami na osi liczbowej.  
 Geometryczna interpretacja wartości  
 bezwzględnej na osi liczbowej**

**2.18.** Dane są liczby  $a$  i  $b$ . Wyznacz na osi liczbowej liczbę  $c$  równoodległą od liczb  $a$  i  $b$ . Jaka jest odległość  $d$  liczby  $c$  od liczb  $a$  i  $b$ ?

a)  $a = -2$  i  $b = 4$

b)  $a = -2$  i  $b = 5$

c)  $a = -8,4$  i  $b = 1,5$

d)  $a = 3\frac{1}{3}$  i  $b = 87\frac{5}{6}$

e)  $a = -3\sqrt{7}$  i  $b = -29\sqrt{7}$

f)  $a = -9 + 4\sqrt{5}$  i  $b = 5 - 2\sqrt{5}$

**2.19.** Wyznacz liczby, które znajdują się na osi liczbowej w odległości  $d$  od liczby  $a$ , jeśli:

a)  $a = 2, d = 3$

b)  $a = -2, d = 5$

c)  $a = -7, d = 26$

d)  $a = \sqrt{2}, d = 3$

e)  $a = -3, d = \pi + 1$

f)  $a = 1 + \sqrt{3}, d = 4 - \sqrt{3}$

**2.20.** Zaznacz na osi liczbowej i zapisz za pomocą przedziału zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, których:

a) odległość na osi liczbowej od liczby 1 jest mniejsza od 5 lub równa 5,

b) odległość na osi liczbowej od liczby 3 jest mniejsza od 4,

c) odległość na osi liczbowej od liczby  $-2$  jest większa od 3 lub równa 3,

d) odległość na osi liczbowej od liczby  $-5$  jest większa od 2,

e) odległość na osi liczbowej od liczby 6 jest nie mniejsza niż 1,

f) odległość na osi liczbowej od liczby  $-4$  jest nie większa niż 5.

**2.21.** Zapisz odległość na osi liczbowej między danymi liczbami, używając znaku wartości bezwzględnej. Następnie oblicz tę odległość.

a)  $-4$  i  $-28$

b)  $-14\frac{2}{3}$  i  $16\frac{2}{3}$

c)  $\pi$  i  $2\sqrt{3}$

d)  $-2\sqrt{2}$  i  $4\sqrt{2} + 3$

e)  $\sqrt{3} - 1$  i  $\sqrt{3} + 7$

f)  $1 - 2\sqrt{3}$  i  $4 + 2\sqrt{3}$

**2.22.** Zapisz poniższe zdanie, używając symbolu wartości bezwzględnej.

a) Odległość liczby  $x$  od liczby 0 jest równa 8.

b) Odległość liczby  $y$  od liczby 5 jest równa 1.

c) Odległość liczby  $(-3)$  od liczby  $a$  jest równa 4.

d) Odległość liczby  $z$  od liczby 8 jest mniejsza od 3.

e) Odległość liczby  $p$  od liczby  $-2$  jest większa od 7.

f) Odległość liczby  $k$  od liczby  $-1$  jest nie większa od 5.

g) Odległość liczby 7 od liczby  $m$  jest nie mniejsza od 2.

**2.23.** Wyznacz odległość między danymi liczbami  $a$  i  $b$  w zależności od  $m$ , jeśli:

a)  $a = 12 - 3m, \quad b = 5m - 4 \quad i \quad m \in (-\infty, 2)$

b)  $a = \frac{12m}{5} - 9, \quad b = 6 - 3,6m \quad i \quad m \in (3, +\infty)$

c)  $a = m^2 + 5m - 6, \quad b = (m + 3)^2 \quad i \quad m \in (0, +\infty)$

d)  $a = (m - 4)^2, \quad b = -8m - 17 \quad i \quad m \in \mathbf{R}$

## Proste równania z wartością bezwzględną

**2.24.** Sprawdź, które z podanych liczb są rozwiązaniami równania:

- a)  $2|x| = 6$     0, -3, 3  
 b)  $|x + 3| = 7$     -4, -10, 4  
 c)  $|x - 2| = -6$     0, -4, 2  
 d)  $|x + 5| = 0$     0, 3, -5

**2.25.** Rozwiąż równanie:

- a)  $|x| = \frac{1}{5}$   
 b)  $|x| = -2$   
 c)  $3|x| = \sqrt{18}$   
 d)  $5|x| + 10\sqrt{3} = 0$   
 e)  $-\frac{|x|}{3} + 1 = 1$   
 f)  $\frac{3|x| + 1}{2} = 5$

**2.26.** Rozwiąż dane równanie, korzystając z odległości między liczbami na osi liczbowej.

- a)  $|x - 2| = 3$   
 b)  $|x + 1| = 4$   
 c)  $|3 - x| = 0$   
 d)  $|2 + x| = 1$   
 e)  $|x - 5| = 2$   
 f)  $|-4 + x| = 5$

**2.27.** Rozwiąż dane równanie, korzystając z odległości między liczbami na osi liczbowej.

- a)  $|9 + x| = 0$   
 b)  $|3 - x| = 8$   
 c)  $|16 + x| = 5$   
 d)  $|x - 21| = 3$   
 e)  $|-1 - x| = 7$   
 f)  $|-2 - x| = -2$

**2.28.** Zapisz równanie z niewiadomą  $x$  typu  $|x - a| = b$ , które:

- a) ma jedno rozwiązanie, równe 11,  
 b) ma jedno rozwiązanie, równe -19,  
 c) jest sprzeczne,  
 d) ma dwa rozwiązania: -8 i 8,  
 e) ma dwa rozwiązania: -3 i 7,  
 f) ma dwa rozwiązania:  $3\pi$  i  $-7\pi$ .

**2.29.** Zapisz równanie z niewiadomą  $x$  typu  $|x - a| = b$ , którego zbiorem rozwiązań jest zbiór:

- a)  $\{-\sqrt{6}, \sqrt{6}\}$   
 b)  $\{2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3}\}$   
 c)  $\{-3\sqrt{5}\}$   
 d)  $\{5, 17\}$   
 e)  $\left\{-8\frac{1}{2}, 3\frac{1}{2}\right\}$   
 f)  $\left\{-2\frac{1}{3}, 5\frac{2}{3}\right\}$

**2.30.** Rozwiąż algebraicznie równanie:

- a)  $|x - 1| = 2$   
 b)  $|x - 4| = 0$   
 c)  $|-x - 1| = 4$   
 d)  $|2 + x| = 3$   
 e)  $|x - 3| + 7 = 0$   
 f)  $1 - |x + 5| = 0$

**2.31.** Rozwiąż algebraicznie równanie:

- a)  $|x - 1,2| - 6,8 = 0$   
 b)  $|3,4 - x| = 0,6$   
 c)  $-|2,5 + x| = 0$   
 d)  $7|-x - 5| = -21$   
 e)  $0,2|x - 1| = 0,4$   
 f)  $-0,1|-3 - x| = -1$

**2.32.** Rozwiąż algebraicznie równanie:

- a)  $\frac{3|x - 2|}{4} = 1,5$   
 b)  $\frac{|x + 2,4| + 1,2}{3} = 1$   
 c)  $\frac{5|3 + x| - 1,2}{8} = 0$   
 d)  $\frac{4 - |-x + 2|}{3} = 4,8$   
 e)  $\frac{|3 - x| - 5,3}{2} = 8$   
 f)  $\frac{6 - 2|-x - 1|}{3} = -4$

**2.33.** Rozwiąż równanie:

- a)  $|x - \sqrt{2}| + 3 = \sqrt{2}$   
 b)  $3|2\sqrt{5} - x| = 21 - 9\sqrt{5}$   
 c)  $\frac{|x - 2\sqrt{3}| - 1}{3} = 2 - \sqrt{3}$   
 d)  $0,2|-x - 5\sqrt{2}| = \frac{1}{5} + \sqrt{2}$   
 e)  $\frac{|\sqrt{2} - x| + \sqrt{2}}{3} = 1$   
 f)  $\frac{|x + 2\sqrt{3}| - 2}{\sqrt{3}} = 4$

**2.34.** Rozwiąż równanie:

- a)  $|3x + 7| = 2$   
 b)  $|25x - 3| = 122$   
 c)  $|9 - 4x| = 21$   
 d)  $|1 - 2x| = 13$   
 e)  $|-8x + 5| = 11$   
 f)  $|-2 - 5x| = 16$

**2.35.** Rozwiąż równanie graficznie, szkicując wykres odpowiedniej funkcji.

- a)  $|x + 4| = 2$   
 b)  $|3 - x| = 1$   
 c)  $|1 + x| - 4 = 0$   
 d)  $|-x - 1| = 5$   
 e)  $|2x - 6| = 0$   
 f)  $|0,5x + 1| = 2$

**2.36.** Dane są zbiory:

$$A = \{x: x \in \mathbf{R} \wedge 3|2 - x| = 4 - |x - 2|\}$$

$$B = \{x: x \in \mathbf{R} \wedge |x + 5| = 2|5 - x|\}$$

$$C = \{x: x \in \mathbf{R} \wedge 2(|x + 1| - 3) = |1 + x| - 2\}$$

- a) Wypisz elementy zbiorów  $A$ ,  $B$ ,  $C$ .  
 b) Wyznacz zbiory:  $(B \cup C) \cap A$ ,  $(A - C) \cup B$ ,  $C - A - B$ .

## Proste nierówności z wartością bezwzględną

**2.37.** Sprawdź, która z liczb podanych obok nierówności spełnia tę nierówność, jeśli:

a)  $|5-x| \leq 2$     0, 3, 6, 7    b)  $|x+1| > 5$     -9, -4, -1, 6

c)  $|x-4| > 0$     -2,  $3\frac{1}{2}$ , 4, 5    d)  $|-x-2| \leq 0$     -3, -2, 0, 1

**2.38.** Podaj zbiór rozwiązań nierówności:

a)  $|x| \leq 0$     b)  $|x+1| > 0$     c)  $-|x| \leq 9$     d)  $2|x| < -4$

**2.39.** Podaj przykład nierówności z wartością bezwzględną, której zbiorem rozwiązań jest:

a) zbiór pusty    b) zbiór jednoelementowy  
c) zbiór liczb rzeczywistych    d) zbiór  $R - \{3\}$

**2.40.** Rozwiąż nierówność, korzystając z odległości między liczbami na osi liczbowej.

a)  $|x| < 4$     b)  $|x| \geq 6$     c)  $|x| > 9$   
d)  $|x| \leq 2$     e)  $|x-5| \leq 3$     f)  $2|x| - 2\sqrt{3} > 0$

**2.41.** Rozwiąż nierówność, korzystając z odległości między liczbami na osi liczbowej.

a)  $|x-4| < 3$     b)  $|x+1| \leq 2$     c)  $|x-2| > 0$   
d)  $4 - |1-x| \geq 0$     e)  $|3-x| - 1 \leq 0$     f)  $|5+x| - 2 > 0$

**2.42.** Rozwiąż nierówność, korzystając z odległości między liczbami na osi liczbowej.

a)  $|x+1| - 2 > 0$     b)  $1 - |x-1| \leq 0$     c)  $-3|x| + 8 > 2$   
d)  $0 < 4 - |x-4|$     e)  $-|9-x| \leq -3$     f)  $3 - 3|6+x| < 0$

**2.43.** Zapisz nierówność z wartością bezwzględną, jeśli dany jest jej zbiór rozwiązań.

a)  $(-9, 9)$     b)  $(-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$     c)  $(-4, 12)$   
d)  $(-\infty, -4) \cup (2, +\infty)$     e)  $(-\infty, 5) \cup (7, +\infty)$     f)  $(0, 10)$   
g)  $(-9, 5)$     h)  $(2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3})$     i)  $(-2\pi, 4\pi)$

**2.44.** Korzystając z wykresu odpowiedniej funkcji rozwiąż graficznie nierówność:

a)  $|x-5| > 1$     b)  $|x+3| \leq 2$     c)  $|4+x| \geq 3$   
d)  $|2x-4| \leq 0$     e)  $|0,5x-1| > 2$     f)  $-|2(x+1)| > -4$

**2.45.** Rozwiąż algebraicznie nierówność:

a)  $|x+1,4| - 8,4 \leq 0$     b)  $0 > 1,4 - |2,6-x|$     c)  $|0,25+x| \geq 1,25$   
d)  $10|x-1,3| < 18$     e)  $|0,3x+1| \leq 0$     f)  $-2|x-0,3| + 3 > 0$

**2.46.** Rozwiąż algebraicznie nierówność:

a)  $|x-\sqrt{2}| < 1$     b)  $|\sqrt{3}+x| \geq 2\sqrt{3}$     c)  $|-x-\sqrt{5}| \leq 0$   
d)  $|3-x| < 2-\sqrt{6}$     e)  $|x-\sqrt{2}+1| > 1$     f)  $|x+\sqrt{3}+5| < 4$

**2.47.** Rozwiąż algebraicznie nierówność:

a)  $|3x+13| \leq 100$     b)  $|12x-2| < 50$     c)  $|4-5x| > 13$   
d)  $|17-6x| \geq 5$     e)  $1 - |2x-7| \leq 0$     f)  $3 - |2-5x| > 0$

**2.48.** Rozwiąż nierówność:

a)  $0,7 \cdot |x-0,1| > 0$     b)  $3|x+2| + 1\frac{5}{7} < 0$     c)  $-2\left|5-\frac{x}{3}\right| + 1\frac{1}{3} > 0$   
d)  $2 + |-6x+5| > 1$     e)  $3 - |-9x+8| \geq 3$     f)  $|x-2| \geq 1 + \sqrt{5}$

**2.49.** Zbiór A jest zbiorem rozwiązań nierówności  $3 - |x+3| > 0$ , zaś zbiór B – zbiorem rozwiązań nierówności  $|x+4| \geq 1$ .

- Wypisz wszystkie liczby parzyste należące do zbioru A.
- Podaj przykład liczby wymiernej, która nie należy do zbioru B.
- Wyznacz zbiory:  $A \cap B$  i  $B - A$ .

**2.50.** Zbiór A jest zbiorem rozwiązań nierówności  $4 - 2|x| > 0$ , zaś zbiór B – zbiorem rozwiązań nierówności  $|x+1| - 2 \leq 0$ .

- Zaznacz na osi liczbowej zbiory A i B.
- Wypisz wszystkie liczby naturalne należące do zbioru  $A \cup B$ .
- Podaj przykład liczby niewymiernej należącej do zbioru  $B - A$ .
- Wyznacz zbiór  $A' \cap B'$ .

**2.51.** Wyznacz wszystkie liczby całkowite spełniające jednocześnie dwie nierówności:

a)  $|x-2| < 3$  i  $3 - |x| > 0$     b)  $|x+1| \geq 4$  i  $|x-2| - 4 < 0$   
c)  $|x-1,2| \leq 4$  i  $-2 + |x| \leq 0$     d)  $2|x-0,4| < 5$  i  $|x+0,1| - 0,4 \leq 0$

**2.52.** Rozwiąż nierówność podwójną:

a)  $|x-2| < 3 < |x-1| + 1$     b)  $2 - |x+1| \leq 2|1+x| \leq 4$

## Test sprawdzający do rozdziału 2.

1. Wartość wyrażenia  $\frac{|\sqrt{3}-2| \cdot |-2-\sqrt{3}|}{2}$  jest równa:  
 A. -0,5      B.  $\frac{7-4\sqrt{3}}{2}$       C.  $2\sqrt{3} + \frac{7}{2}$       D. 0,5
2. Jeśli  $x \in (-6, 2)$ , to wyrażenie  $|2x-4| - 3|x+6|$  można zapisać w postaci:  
 A.  $x-14$       B.  $-x+10$       C.  $-5x-14$       D.  $-5x-2$
3. Wiadomo, że  $a < 0$  i  $b > 0$ . Wobec tego wyrażenie  $|b-3a| \cdot |a-3b|$  jest równe:  
 A.  $3a^2 - 10ab + 3b^2$       B.  $3(a^2 + b^2)$       C.  $-10ab$       D.  $10ab - 3(a^2 + b^2)$
4. Liczbą równoodległą od liczb  $\sqrt[3]{27} - 3\sqrt{2}$  i  $\sqrt{50} - 7$  na osi liczbowej jest liczba:  
 A.  $2(\sqrt{2}-1)$       B.  $5-4\sqrt{2}$       C.  $\sqrt{2}-4$       D.  $\sqrt{2}-2$
5. Odległość między liczbami  $\sqrt{5} + 2$  i  $\sqrt{5} - 17$  na osi liczbowej jest równa:  
 A. 4      B. 19      C.  $2 + \sqrt{5}$       D. 18
6. Wskaż liczbę, która spełnia równanie  $|4-5x| - 2x = |x|$ .  
 A. 1      B. 0      C. -1      D. 2
7. Wskaż równanie sprzeczne.  
 A.  $|-3-x| = 0$       B.  $|x+3| + 1 = 0$       C.  $|7-x| = 1$       D.  $|-2-x| = 4$
8. Wskaż równanie, którego rozwiązaniami są liczby 8 i -12:  
 A.  $|-x-2| = 10$       B.  $|x+2| = 6$       C.  $|x-2| = 10$       D.  $|2-x| = 6$
9. Zbiór  $(-\infty, -15) \cup (21, +\infty)$  jest zbiorem rozwiązań nierówności:  
 A.  $|x+3| > 18$       B.  $|2x-6| > 15$       C.  $|x-6| > 15$       D.  $|x-3| > 18$
10. Najmniejszą liczbą pierwszą należącą do zbioru rozwiązań nierówności  $|2-x| \leq 1$  jest liczba:  
 A. 1      B. 2      C. 3      D. 5

## Zadania powtórzeniowe do rozdziału 2.

11. Oblicz wartość wyrażenia dla podanej obok wartości zmiennej:

a)  $|2-a|a-4| + 1\frac{7}{9}$        $a=0,3^{-1}$

b)  $15+|5-b| \cdot |10-b| - |2b-6| \cdot |30-b|$        $b = \sqrt{33^2 + 44^2}$

12. Oblicz wartość wyrażenia:  $\frac{|\sqrt{48}-3\sqrt{3}| \cdot |1-\sqrt{3}|}{|\sqrt{5}-2| \cdot |-2-\sqrt{5}|} - |\sqrt{3}-2|$ .

13. Wykaż, że:

a)  $|3\sqrt{5}-5\sqrt{2}| \cdot |5\sqrt{2}-3\sqrt{5}| + |35+30\sqrt{10}| = 130$

b)  $\left| 0,75 \cdot \log_3 81 + \log_{\frac{1}{2}} 128 \right| - \log_5 \left| 2,8 - 27\frac{4}{5} \right| = 2$

14. Zapisz w najprostszej postaci wyrażenie:

a)  $8 - |3-x| - |-2x-4|$ , jeśli  $x \in \langle -2, 3 \rangle$

b)  $|3a-1| \cdot |1-3b| - 9|ab| - 1$ , jeśli  $a < 0$  i  $b < 0$

15. Rozwiąż algebraicznie równanie:

a)  $|x-4| = 5$

b)  $|2-x| + 1 = 0$

c)  $|-x-3| = 0$

16. Korzystając z odległości na osi liczbowej rozwiąż równanie:

a)  $2|x+7| = 6$

b)  $|-x-4| = 9$

17. Korzystając z odległości na osi liczbowej rozwiąż nierówność:

a)  $|x-3| \geq 8$

b)  $1 - |x+13| > -4$

18. Rozwiąż graficznie:

a) równanie  $2|x+5| = 6$

b) nierówność  $|x+2| \leq 5$

19. Rozwiąż algebraicznie nierówność:

a)  $|2-x| > 1$

b)  $|x+5| \leq 0$

c)  $|-x-1| > 0$

d)  $|-x-7| \geq -7$

20. Rozwiąż nierówność podwójną:

a)  $\frac{3x-14}{4} \leq 1 \leq |x-3|$

b)  $1 < |4+x| \leq 6$

21. Wyznacz zbiory  $A \cup B$ ,  $A \cap B$ ,  $A - B$  oraz  $B - A$  wiedząc, że:

$A$  – zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność  $8 - |x+2| > 3$

$B$  – zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność  $|x-1| - 2 \geq 0$

22. Wykaż, że jeśli  $x$  jest liczbą rzeczywistą ujemną, zaś  $y$  jest liczbą rzeczywistą dodatnią, to  $|4x-3| \cdot (y-x) - 3|x-y| + y^2 = (2x-y)^2$ .

23. Wykaż, że jeśli  $x$  i  $y$  są liczbami rzeczywistymi ujemnymi, to

$$\frac{9|x^2-y| - (3x-2y)^2 + 4|y|^2}{3} = |3y| + 4|xy|$$

24. Rozwiąż:

a) równanie  $\frac{|x-7|}{9} = \frac{|7-x|}{3}$

b) nierówność  $8 - 6|-x-1| - |x+1| \geq 4 - 5|1+x|$

## 3. Funkcja kwadratowa

### Przypomnienie wiadomości o funkcji kwadratowej z klasy 1.

3.1. Zapisz podany wzór funkcji kwadratowej  $f$  w postaci ogólnej  $f(x) = ax^2 + bx + c$ . Następnie wypisz współczynniki  $a$ ,  $b$ ,  $c$ .

a)  $f(x) = (x-1)(2x+3) - 4x$

b)  $f(x) = 5 - 2(x+4)^2$

c)  $f(x) = -3[(x-2)(2x+3) + 6]$

d)  $f(x) = (1-2x)^2 + 4(x-1) + 3$

3.2. Napisz wzór funkcji kwadratowej  $y = ax^2$  wiedząc, że do jej wykresu należy punkt:

a)  $A(3\sqrt{2}, 12)$

b)  $B(2, -4)$

c)  $C(-2, 8\sqrt{5})$ .

3.3. Wyznacz współczynniki  $b$ ,  $c$  we wzorze funkcji kwadratowej  $f(x) = x^2 + bx + c$  wiedząc, że do wykresu funkcji  $f$  należą punkty:

a)  $A(4, 9)$ ,  $B(-3, -12)$

b)  $A(-1, 6)$ ,  $B(4, -4)$ .

3.4. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, jeśli do wykresu tej funkcji należą punkty:

a)  $A(-2, 9)$ ,  $B(0, 4)$ ,  $C(4, 6)$

b)  $A(1, 6)$ ,  $B(-2, -3)$ ,  $C(0, 9)$ .

3.5. Napisz wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, której wykres otrzymamy przesuwając równolegle wykres funkcji:

a)  $y = \frac{1}{3}x^2$  o 5 jednostek w lewo wzdłuż osi  $OX$ ,

b)  $y = -2x^2$  o 3 jednostki w prawo wzdłuż osi  $OX$ ,

c)  $y = \frac{2}{5}x^2$  o 4 jednostki w górę wzdłuż osi  $OY$ ,

d)  $y = -x^2$  o 2 jednostki w dół wzdłuż osi  $OY$ .

3.6. Napisz wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, wiedząc, że jej wykres otrzymamy przesuwając równolegle wykres funkcji  $y = -\frac{1}{4}x^2$ :

- a) o 2 jednostki w prawo wzdłuż osi  $OX$  i o 3 jednostki w dół wzdłuż osi  $OY$ ,  
 b) o 1 jednostkę w lewo wzdłuż osi  $OX$  i o 5 jednostek w dół wzdłuż osi  $OY$ ,  
 c) o 3 jednostki w lewo wzdłuż osi  $OX$  i o 4 jednostki w górę wzdłuż osi  $OY$ ,  
 d) o 5 jednostek w prawo wzdłuż osi  $OX$  i o 2 jednostki w górę wzdłuż osi  $OY$ .

**3.7.** Dany jest wzór funkcji kwadratowej  $f$  w postaci kanonicznej. Podaj współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji  $f$  oraz współrzędne punktu wspólnego paraboli i osi  $OY$ . Naszkiuj wykres tej funkcji.

a)  $f(x) = -(x+3)^2$       b)  $f(x) = 2(x-1)^2 + 1$       c)  $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 4$   
 d)  $f(x) = \frac{1}{2}(x+3)^2 - 2$       e)  $f(x) = \frac{1}{4}(x-1)^2$       f)  $f(x) = -\frac{1}{4}(x-2)^2 - 1$

**3.8.** Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej. Podaj zbiór wartości funkcji  $f$ , maksymalne przedziały monotoniczności tej funkcji i równanie osi symetrii jej wykresu.

a)  $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 3$       b)  $f(x) = x^2 - 5$       c)  $f(x) = \frac{2}{3}(x+4)^2$   
 d)  $f(x) = -2(x-1)^2 + 7$       e)  $f(x) = \frac{1}{4}(x+5)^2 - 3$       f)  $f(x) = -\frac{1}{3}(x-2)^2 - 4$

**3.9.** Dany jest wierzchołek  $W$  paraboli, będącej wykresem funkcji kwadratowej  $f$  oraz punkt  $A$  należący do tej paraboli. Wyznacz wzór funkcji  $f$  w postaci kanonicznej, a następnie doprowadź go do postaci ogólnej.

a)  $W(2, 0)$ ,  $A(5, -3)$       b)  $W(3, 1)$ ,  $A(1, 2)$   
 c)  $W(-1, 3)$ ,  $A(0, 1)$       d)  $W\left(2\frac{1}{2}, -3\frac{1}{8}\right)$ ,  $A(5, 0)$   
 e)  $W(-1, -1)$ ,  $A(2, -4)$       f)  $W(-4, 0)$ ,  $A\left(-7, 1\frac{4}{5}\right)$

**3.10.** Wykres funkcji kwadratowej  $f$  jest symetryczny względem prostej  $x+3=0$  i przecina oś  $OY$  w punkcie o rzędnej 10. Podaj argumenty, dla których funkcja  $f$  przyjmuje wartość 10.

**3.11.** Wyznacz wzór funkcji kwadratowej  $f$  w postaci kanonicznej wiedząc, że zbiorem wartości tej funkcji jest przedział  $(-\infty, 4)$  oraz dla argumentów  $-2$  i  $8$  funkcja przyjmuje tę samą wartość, równą  $-1$ .

**3.12.** Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej wiedząc, że funkcja  $f$  jest rosnąca w przedziale  $(-1, +\infty)$  i malejąca w przedziale  $(-\infty, -1)$ , zbiorem wartości tej funkcji jest przedział  $(-2, +\infty)$ , a jej wykres przechodzi przez początek układu współrzędnych.

**3.13.** Funkcja kwadratowa  $f$  dla argumentu  $-3$  przyjmuje najmniejszą wartość, równą 5. Wiedząc, że do wykresu tej funkcji należy punkt  $A(-2, 10)$ , wyznacz wzór funkcji  $f$  w postaci kanonicznej.

**3.14.** Funkcja kwadratowa  $f$  dla argumentu 2 przyjmuje największą wartość, równą 4. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej wiedząc, że jej wykres przecina oś  $OY$  w punkcie o rzędnej 1.

**D 3.15.** Dana jest funkcja kwadratowa  $f(x) = x^2$ , gdzie  $x \in \mathbb{R}$ . Wykaż, że dla każdej liczby całkowitej  $k$ :

- a) różnica  $f(k) - f(k-1)$  jest liczbą całkowitą nieparzystą  
 b) różnica  $f(k+3) - f(k+1)$  jest liczbą podzielną przez 4.

## Związek między wzorem funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, a wzorem funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej

**3.16.** Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej. Sprawdź ten wzór do postaci ogólnej.

a)  $f(x) = 4(x-3)^2 - 20$       b)  $f(x) = \frac{1}{2}(x+4)^2 - 6$       c)  $f(x) = -5(x-1)^2 + 1$

**3.17.** Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej. Sprawdź ten wzór do postaci kanonicznej, stosując wzór skróconego mnożenia na kwadrat sumy lub kwadrat różnicy.

a)  $f(x) = x^2 - 2x$       b)  $f(x) = -2x^2 + 6x + 1$       c)  $f(x) = -x^2 + 2x + 8$   
 d)  $f(x) = 3x^2 - 24x + 50$       e)  $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x + \frac{1}{2}$       f)  $f(x) = -\frac{1}{4}x^2 + 2x + 2$

**3.18.** Oblicz wyróżnik funkcji kwadratowej  $f$ , jeśli:

a)  $f(x) = -3x^2 + 6x - 3$       b)  $f(x) = -\frac{3}{4}x^2 - 7x$       c)  $f(x) = (1-4x)(1+4x)$   
 d)  $f(x) = 3(x-1)x + 1$       e)  $f(x) = (3x-2)^2$       f)  $f(x) = \frac{x^2 - 6(x-4)}{2}$

**3.19.** Oblicz współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej  $f$ , stosując poznane wzory. Napisz wzór funkcji  $f$  w postaci kanonicznej.

a)  $f(x) = 2x^2 + 3x$

b)  $f(x) = x^2 - 4$

c)  $f(x) = -x^2 + 10x - 25$

d)  $f(x) = x^2 - 6x + 5$

e)  $f(x) = 4x^2 - x + 1$

f)  $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2x - 3$

**3.20.** Prosta  $k$  jest osią symetrii paraboli, będącej wykresem funkcji kwadratowej  $f$ . Oblicz współczynnik  $b$  we wzorze tej funkcji.

a)  $f(x) = 4x^2 - bx + 2$ ,  $k: x = 0$

b)  $f(x) = -x^2 + bx + 12$ ,  $k: x = 5$

c)  $f(x) = \frac{1}{3}x^2 + bx - 1$ ,  $k: x = -3$

d)  $f(x) = -5x^2 + bx - 4$ ,  $k: x = -\frac{1}{2}$

**3.21.** Dany jest wyróżnik funkcji kwadratowej  $y = ax^2 + bx + c$  i wierzchołek  $W$  paraboli, będącej wykresem tej funkcji. Wyznacz współczynniki  $a$ ,  $b$ ,  $c$ .

a)  $\Delta = 12$ ,  $W(4, 3)$

b)  $\Delta = -8$ ,  $W\left(\frac{1}{2}, 1\right)$

c)  $\Delta = 120$ ,  $W(0, -5)$

d)  $\Delta = 36$ ,  $W(-1, 3)$

e)  $\Delta = -48$ ,  $W(2, -3)$

f)  $\Delta = -1$ ,  $W\left(\frac{3}{10}, \frac{1}{20}\right)$

**3.22.** Oblicz współczynnik  $a$  we wzorze funkcji kwadratowej  $f$  oraz współrzędne punktu wspólnego wykresu funkcji  $f$  i osi  $OY$ .

a)  $f(x) = a(x + 2)^2 - 7$ ,  $\Delta = -84$

b)  $f(x) = ax^2 - \sqrt{3}$ ,  $\Delta = 24$

c)  $f(x) = a(x - 3)^2 + 5$ ,  $\Delta = -10$

d)  $f(x) = a(4 - x)^2 - 2$ ,  $\Delta = -8$

e)  $f(x) = a(-5 - x)^2 - 1$ ,  $\Delta = \frac{4}{5}$

f)  $f(x) = a(-x - 1)^2 - 8$ ,  $\Delta = 128$

**3.23.** Doprowadź wzór funkcji kwadratowej  $f$  do postaci kanonicznej. Podaj współrzędne punktu przecięcia paraboli będącej wykresem funkcji  $f$  z osią  $OY$  i współrzędne punktu  $A$ , symetrycznego do niego względem osi symetrii tej paraboli. Naszkicuj wykres funkcji  $f$ .

a)  $f(x) = x^2 - 6x + 5$

b)  $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 - 4x - 7$

c)  $f(x) = 2x^2 - 8x + 9$

d)  $f(x) = -\frac{1}{3}x^2 + \frac{8}{3}x - 6$

e)  $f(x) = -2x^2 - 6x$

f)  $f(x) = \frac{1}{4}x^2 + 2x + 1$

**3.24.** Wyznacz zbiór wartości funkcji kwadratowej  $f$  nie szkicując jej wykresu.

a)  $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 10x + 50$

b)  $f(x) = -8x^2 + 7$

c)  $f(x) = -\frac{1}{3}x^2 + 2x + 3$

d)  $f(x) = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x$

**3.25.** Podaj maksymalne przedziały monotoniczności funkcji kwadratowej  $f$  nie szkicując jej wykresu.

a)  $f(x) = \frac{2}{3}x^2 - 4x - 4$

b)  $f(x) = -\frac{1}{4}x^2 + 5x - 25$

c)  $f(x) = \frac{3}{4}x^2 - 9x$

d)  $f(x) = -\frac{4}{5}x^2 - 12x + 19$

**3.26.** Ile jest takich funkcji kwadratowych, których zbiorem wartości jest przedział  $(-4, +\infty)$ , wyróżnik jest równy 16, a wykres przecina oś  $OY$  w punkcie  $A(0, 5)$ ?

a) Podaj wzory tych funkcji w postaci kanonicznej.

b) Naszkicuj wykresy tych funkcji w jednym układzie współrzędnych.

c) Podaj równanie prostej względem której wykresy tych funkcji są symetryczne.

## Miejsce zerowe funkcji kwadratowej. Wzór funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej

**3.27.** Dany jest wzór funkcji kwadratowej  $y = a(x - p)^2 + q$ ,  $a \neq 0$ . Podaj, na podstawie wartości  $a$  i  $q$ , liczbę miejsc zerowych tej funkcji.

a)  $y = 3(x - 1)^2 + 4$

b)  $y = -\frac{1}{2}(x + 3)^2 + 5$

c)  $y = (x + 8)^2 - 2$

d)  $y = \frac{1}{4}(x - 4)^2 + 1$

e)  $y = -(x + 5)^2$

f)  $y = -2(x + 1)^2 - 6$

**3.28.** Dany jest wzór funkcji kwadratowej  $f$  w postaci kanonicznej. Wyznacz miejsca zerowe tej funkcji, o ile istnieją.

a)  $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 4$

b)  $f(x) = 2(x - 3)^2$

c)  $f(x) = 9x^2 - 81$

d)  $f(x) = (x + 2)^2 - 36$

e)  $f(x) = (x - 1)^2 + 5$

f)  $f(x) = -2(x + 1)^2 + 8$

**3.40.** Dany jest wzór funkcji kwadratowej  $f$  w postaci iloczynowej. Podaj wzór funkcji  $f$  w postaci kanonicznej.

a)  $f(x) = (x-1)(x+5)$

c)  $f(x) = 2(x-\sqrt{6})^2$

e)  $f(x) = \frac{3}{5}(x-1)(x+5)$

b)  $f(x) = 2\sqrt{3}x(x+4)$

d)  $f(x) = -\frac{1}{2}(x+6)(x-6)$

f)  $f(x) = -\frac{2}{3}(x-3)(x-4)$

**3.41.** Dany jest wzór funkcji kwadratowej  $f$  w postaci kanonicznej. Sprowadź wzór tej funkcji do postaci iloczynowej, o ile istnieje.

a)  $f(x) = (x-1)^2 - 4$

b)  $f(x) = -1(x+3)^2 + 9$





c)  $f(x) = 4(x-5)^2 - 16$

d)  $f(x) = -9(x+2)^2 + 36$

e)  $f(x) = 2(x-3)^2 + 4$

f)  $f(x) = -\frac{1}{2}(x+7)^2 - 1$

**3.42.** Na podstawie danych punktów wyróżnionych na wykresie funkcji kwadratowej  $f$ , wyznacz wzór tej funkcji w postaci iloczynowej. Następnie podaj jej wzór w postaci ogólnej i w postaci kanonicznej.



**D 3.43.** Wykaż, że dla dowolnej liczby  $a$  różnej od 0 i dowolnej liczby rzeczywistej  $c$  funkcja kwadratowa  $f(x) = ax^2 + (a+c)x + c$  ma co najmniej jedno miejsce zerowe.

**D 3.44.** Wykaż, że jeśli suma wszystkich współczynników we wzorze funkcji  $f(x) = ax^2 + bx + c$  jest równa zero, to funkcja ma co najmniej jedno miejsce zerowe.

**D 3.45.** Wykaż, że jeśli  $a \in \mathbf{R} - \{1\}$ , to funkcja kwadratowa  $f(x) = (a-1)x^2 + 2ax + a + 1$  ma dwa miejsca zerowe, z których jedno jest równe  $-1$ .

## Szkicowanie wykresów funkcji kwadratowych. Odczytywanie własności funkcji kwadratowej na podstawie wykresu

**3.46.** Naszkicuj wykres funkcji kwadratowej  $f$  i omów własności tej funkcji poprzez odpowiedzi na następujące pytania:

- Jaka jest dziedzina funkcji?
- Jaki jest zbiór wartości funkcji?
- Czy funkcja  $f$  ma miejsce zerowe? Jeśli tak, to jakie?
- Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne?
- W jakich przedziałach funkcja jest rosnąca, a w jakich malejąca?
- Czy funkcja przyjmuje wartość największą, czy najmniejszą? Jeśli tak, to dla jakiego argumentu?

a)  $f(x) = x^2 + 1$

b)  $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 2$

c)  $f(x) = 3x^2 - 6x$

d)  $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x + 2\frac{1}{2}$

e)  $f(x) = -x^2 + 2x - 2$

f)  $f(x) = -x^2 - 6x - 9$

**3.47.** Naszkicuj wykres funkcji kwadratowej  $f$  i omów jej własności, jeśli:

a)  $f(x) = 2(x-1)(x+1)$

b)  $f(x) = -(x-1)(x-5)$

c)  $f(x) = \frac{1}{4}x^2 + x + 1$

d)  $f(x) = -\frac{1}{2}(x+1)^2 + 4,5$

e)  $f(x) = \frac{1}{2}(x+1)^2 - 2$

f)  $f(x) = -2x(x-2)$ .

**3.48.** Naszkicuj we wspólnym układzie współrzędnych wykresy funkcji  $f$  i  $g$ . Następnie rozwiąż graficznie równanie  $f(x) = g(x)$ .

a)  $f(x) = (x+2)^2, g(x) = 1$

b)  $f(x) = -(x-1)^2 - 1, g(x) = -5$

c)  $f(x) = \frac{1}{2}(x-4)(x+2), g(x) = -x-2$

d)  $f(x) = -\frac{1}{4}x^2 + x, g(x) = x-1$

**3.49.** Naszkicuj we wspólnym układzie współrzędnych wykres funkcji kwadratowej  $f$  i wykres funkcji liniowej  $g$ . Następnie rozwiąż graficznie nierówność, podaną obok wzorów funkcji  $f$  i  $g$ .

a)  $f(x) = -x^2 - 6x - 9$ ,  $g(x) = x + 1$ ,  $f(x) \geq g(x)$

b)  $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2x + 3$ ,  $g(x) = -2x - 3$ ,  $f(x) > g(x)$

c)  $f(x) = \frac{1}{4}x^2 - \frac{3}{2}x + 3\frac{1}{4}$ ,  $g(x) = \frac{3}{4}x + 1\frac{1}{4}$ ,  $f(x) < g(x)$


**3.50.** Naszkicuj we wspólnym układzie współrzędnych wykresy funkcji kwadratowych  $f$  i  $g$ . Następnie rozwiąż graficznie nierówność, podaną obok wzorów tych funkcji.

a)  $f(x) = -x^2 - 4x$ ,  $g(x) = x^2 + 2x + 4$ ,  $g(x) \geq f(x)$

b)  $f(x) = -\frac{1}{4}x^2 - x - 2$ ,  $g(x) = x^2 + 4x + 3$ ,  $f(x) < g(x)$

c)  $f(x) = x^2 - 3x - 4$ ,  $g(x) = x^2 + 3x - 4$ ,  $f(x) \geq g(x)$

**3.51.** Ustal znaki współczynników  $a$ ,  $b$ ,  $c$  we wzorze funkcji kwadratowej  $f(x) = ax^2 + bx + c$ , na podstawie szkicu wykresu tej funkcji w układzie współrzędnych.



**3.52.** Naszkicuj wykres funkcji  $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x, & \text{jeśli } x \in (-\infty, 3) \\ -x + 6, & \text{jeśli } x \in (3, +\infty) \end{cases}$  i na jego pod-

stawie:

- wyznacz przedziały, w których funkcja  $f$  jest malejąca
- podaj miejsca zerowe tej funkcji
- odczytaj zbiór, w którym funkcja przyjmuje wartości ujemne.

**3.53.** Dana jest funkcja  $f(x) = \begin{cases} -2x^2 - 8x - 6, & \text{jeśli } x \in (-\infty, 0) \\ -6, & \text{jeśli } x \in (0, +\infty) \end{cases}$

- Naszkicuj wykres funkcji  $f$ .
- Podaj zbiór wartości funkcji  $f$ .
- Oblicz wartość funkcji  $f$  dla argumentu  $-4$ .
- Dla jakich argumentów funkcja  $f$  przyjmuje wartości nieujemne?

**3.54.** Naszkicuj wykres funkcji  $f$  i omów jej własności, jeśli:

a)  $f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4}x + 2\frac{1}{4}, & \text{jeśli } x \in (-\infty, 1) \\ x^2 - 6x + 8, & \text{jeśli } x \in (1, +\infty) \end{cases}$

b)  $f(x) = \begin{cases} -x + 1, & \text{jeśli } x \in (-\infty, 2) \\ -\frac{1}{4}x^2 + 2x - 4, & \text{jeśli } x \in (2, 8) \\ -4, & \text{jeśli } x \in (8, +\infty) \end{cases}$

c)  $f(x) = \begin{cases} x^2 + 4x + 5, & \text{jeśli } x \in (-\infty, 0) \\ x^2 - 6x + 5, & \text{jeśli } x \in (0, +\infty) \end{cases}$

d)  $f(x) = \begin{cases} -x^2 - 10x - 21, & \text{jeśli } x \in (-\infty, -4) \\ -\frac{3}{4}x, & \text{jeśli } x \in (-4, 0) \\ 0,75x^2 - 3x, & \text{jeśli } x \in (0, +\infty) \end{cases}$

**3.55.** Dana jest funkcja  $f(x) = \begin{cases} -x - 3, & \text{jeśli } x \in (-\infty, -4) \\ -\frac{1}{2}x^2 - 2x + 1, & \text{jeśli } x \in (-4, 2) \\ \frac{1}{5}x^2 - \frac{4}{5}x - 4\frac{1}{5}, & \text{jeśli } x \in (2, +\infty) \end{cases}$

- Naszkicuj wykres funkcji  $f$ .
- Podaj zbiór wartości tej funkcji.
- Podaj przedziały monotoniczności funkcji  $f$ .
- Określ znak iloczynu:  $f(-2\pi) \cdot f(\sqrt{2} + 1)$ .

## Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej na podstawie jej własności

**3.56.** Wyznacz współczynniki  $b$  i  $c$  we wzorze funkcji kwadratowej

$$f(x) = -\frac{1}{4}x^2 + bx + c \text{ wiedząc, że funkcja } f \text{ ma tylko jedno miejsce zerowe oraz}$$

$$f(-4) = f(8).$$

**3.57.** Wyznacz współczynniki  $b$  i  $c$  we wzorze funkcji kwadratowej

$$f(x) = \frac{1}{3}x^2 + bx + c \text{ wiedząc, że miejscami zerowymi funkcji } f \text{ są liczby 9 oraz } -6.$$

**3.58.** Funkcja kwadratowa  $f(x) = -2x^2 + bx + c$  jest rosnąca w przedziale  $(-\infty, 1)$  i malejąca w przedziale  $(1, +\infty)$ . Wiedząc, że  $f(-3) = -25$ , oblicz współczynniki  $b$  i  $c$ .

**3.59.** Funkcja kwadratowa  $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + bx + c$  ma jedno miejsce zerowe, a jej wykres przecina oś  $OY$  w punkcie  $P(0, -8)$ . Wyznacz wartości współczynników  $b$  i  $c$ .

**3.60.** Ośią symetrii paraboli, będącej wykresem funkcji kwadratowej  $f(x) = 3x^2 + bx + c$ , jest prosta o równaniu  $x = -2$ . Wiedząc, że najmniejsza wartość funkcji  $f$  jest równa  $-4$ , oblicz współczynniki  $b$  i  $c$ .

**3.61.** Napisz wzór funkcji kwadratowej  $f$  w postaci ogólnej wiedząc, że przyjmuje ona wartości dodatnie wtedy i tylko wtedy, gdy  $x \in (-8, -2)$ , a największa wartość tej funkcji jest równa  $2\frac{1}{4}$ .

**3.62.** Napisz wzór funkcji kwadratowej  $f$  w postaci ogólnej jeśli wiadomo, że funkcja ta przyjmuje wartości ujemne wtedy i tylko wtedy, gdy  $x \in (-\infty, -2) \cup (3, +\infty)$ , a do jej wykresu należy punkt  $A(1, 12)$ .

**3.63.** Napisz wzór funkcji kwadratowej  $f$  w postaci ogólnej wiedząc, że do wykresu tej funkcji należy punkt  $P(-1, 1)$ , zbiorem wartości funkcji  $f$  jest przedział  $(-\infty, 4)$ , a maksymalny przedział, w którym funkcja  $f$  jest malejąca, to  $(-2, +\infty)$ .

**3.64.** Napisz wzór funkcji kwadratowej  $f$  w postaci ogólnej wiedząc, że dla argumentu 3 funkcja  $f$  przyjmuje najmniejszą wartość, równą  $-2$ , a jednym z miejsc zerowych tej funkcji jest liczba 1.

**3.65.** Funkcja kwadratowa  $f$  ma tylko jedno miejsce zerowe. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej  $f$  w postaci ogólnej wiedząc, że prosta o równaniu  $x - 5 = 0$  jest osią symetrii wykresu tej funkcji, a punkt  $A\left(2, -1\frac{4}{5}\right)$  należy do tego wykresu.

**3.66.** Zbiorem wartości funkcji kwadratowej  $f$  jest przedział  $(-2, +\infty)$ . Wykres funkcji  $f$  przecina oś  $OY$  w punkcie o rzędnej 30. Napisz wzór tej funkcji w postaci ogólnej wiedząc, że suma jej miejsc zerowych jest równa 16.

**3.67.** Zbiorem wartości funkcji kwadratowej  $f$  jest przedział  $(-\infty, 162)$ . Wykres funkcji  $f$  przecina oś  $OY$  w punkcie  $B(0, 90)$ , a osią symetrii tego wykresu jest prosta o równaniu  $x = 6$ . Napisz wzór funkcji  $f$  w postaci ogólnej.

**3.68.** Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej  $f$  jest liczba 4, a najmniejsza wartość tej funkcji jest równa  $-144,5$ . Napisz wzór funkcji kwadratowej  $f$  w postaci ogólnej wiedząc, że maksymalny przedział, w którym funkcja jest rosnąca to  $(-13, +\infty)$ .

**3.69.** Punkt  $A(-6, 8)$  należy do wykresu tej funkcji kwadratowej  $f$ . Wyznacz wzór funkcji  $f$  w postaci ogólnej wiedząc, że  $f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in \mathbb{R} - \{-2\}$ .

**3.70.** Wyznacz wzór funkcji kwadratowej  $f$  w postaci iloczynowej wiedząc, że prosta o równaniu  $y = 90$  przecina wykres tej funkcji w punktach o odciętych  $-5$  oraz  $-1$ , zaś największa wartość tej funkcji jest równa 98.

**3.71.** Wyznacz wzór funkcji kwadratowej  $f$  w postaci iloczynowej wiedząc, że suma jej miejsc zerowych jest równa 3, zbiorem wartości funkcji  $f$  jest przedział  $\left(-6\frac{3}{4}, +\infty\right)$ , a wykres tej funkcji przecina oś  $OY$  w punkcie o rzędnej  $-6$ .

**3.72.** Funkcja kwadratowa  $f$  przyjmuje wartości nie większe od 18 wtedy i tylko wtedy, gdy  $x \in (-\infty, 0) \cup (6, +\infty)$ . Wyznacz wzór tej funkcji w postaci ogólnej wiedząc, że wierzchołek paraboli będącej wykresem tej funkcji należy do prostej o równaniu  $y = 24$ .





**3.73.** Funkcja kwadratowa  $f(x) = ax^2 + bx + 12\frac{1}{2}$ ,  $a \neq 0$ , dla argumentu 3 przyjmuje jej najmniejszą wartość, równą 8. Wyznacz wartości współczynników  $a$  i  $b$ .

**3.74.** Średnia arytmetyczna miejsc zerowych funkcji kwadratowej  $f(x) = ax^2 + bx$ ,  $a \neq 0$ , jest równa 3. Rzędna wierzchołka paraboli, będącej wykresem funkcji  $f$ , wynosi 36. Wyznacz wartości współczynników  $a$  i  $b$ .

**3.75.** Funkcja kwadratowa  $f(x) = ax^2 + bx + c$  ma dwa miejsca zerowe 2 oraz 3. Wyznacz wartości współczynników  $a$ ,  $b$ ,  $c$  wiedząc, że ich suma jest równa  $-4$ .

### Najmniejsza oraz największa wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym

**3.76.** Na poniższym rysunku przedstawiony jest wykres funkcji kwadratowej  $f$ . Odczytaj z wykresu najmniejszą oraz największą wartość funkcji  $f$  w podanym przedziale.

a)  $\langle 1, 4 \rangle$ b)  $\langle 3, 4 \rangle$ c)  $\langle -4, -2 \rangle$ d)  $\langle 0, 3 \rangle$ 

**3.77.** Naszkicuj wykres funkcji  $f$ . Odczytaj z wykresu najmniejszą oraz największą wartość funkcji  $f$  w podanym przedziale, jeśli:

a)  $f(x) = -x^2 + 2x + 5$ ,  $x \in \langle 0, 3 \rangle$

b)  $f(x) = 1\frac{3}{4} + \left(x + 1\frac{1}{2}\right)^2$ ,  $x \in \langle -1, 0 \rangle$

c)  $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 2$ ,  $x \in \langle 2, 4 \rangle$

d)  $f(x) = -\frac{1}{2}x(x+2)$ ,  $x \in \langle -4, -2 \rangle$ .

**3.78.** Nie szkicując wykresu funkcji kwadratowej, oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji  $f$  w podanym przedziale, jeśli:

a)  $f(x) = -\frac{1}{3}x^2 + 2$ ,  $x \in \langle 0, 3 \rangle$

b)  $f(x) = -\frac{3}{4}(x-1)^2 + 5$ ,  $x \in \left\langle \frac{1}{2}, 2 \right\rangle$

c)  $f(x) = \frac{2}{3}x^2 + 4x + 5$ ,  $x \in \langle -2, -1 \rangle$

d)  $f(x) = \sqrt{3}(x-2)(x+8)$ ,  $x \in \langle -2, 1 \rangle$

e)  $f(x) = \frac{1}{4}(x-5)(x+5)$ ,  $x \in \langle -1, \sqrt{2} \rangle$

f)  $f(x) = \frac{1}{5}(x-4)^2 + 9$ ,  $x \in \left\langle \frac{1}{2}, 1 \right\rangle$ .

**3.79.** Funkcja kwadratowa  $f$  opisana jest wzorem  $f(x) = -3x^2 - 12x + 96$ .

a) Czy funkcja  $f$  ma wartość najmniejszą, czy największą? Ile ta wartość wynosi i dla jakiego argumentu jest przyjmowana?

b) Bez obliczania wartości funkcji uzasadnij, że  $f(\sqrt{3}) < f(-\sqrt{3})$ .

c) Oblicz najmniejszą oraz największą wartość tej funkcji w przedziale  $\langle -4, -3 \rangle$ .

**3.80.** Funkcja kwadratowa  $f$  ma następujące własności:  $f(-3) = 0$  oraz  $f(-1) = f(5) = 3$ .

a) Czy funkcja kwadratowa ma wartość najmniejszą, czy największą? Dla jakiego argumentu ta wartość jest przyjmowana?

b) Podaj najmniejszą i największą wartość funkcji  $f$  w przedziale  $\langle 5, 7 \rangle$ .

**3.81.** Wyznacz wzór funkcji kwadratowej  $f$  w postaci ogólnej wiedząc, że w przedziale  $\langle 1, 2 \rangle$  funkcja  $f$  przyjmuje największą wartość równą 5, a jej wykresem jest parabola o wierzchołku  $W(3, 2)$ .

**3.82.** Wyznacz wzór funkcji kwadratowej  $f$  w postaci ogólnej wiedząc, że funkcja  $f$  przyjmuje wartości ujemne wtedy i tylko wtedy, gdy  $x \in \langle -2, 4 \rangle$ , a największa wartość funkcji  $f$  w przedziale  $\langle 3, 6 \rangle$  jest równa 4.

**3.83.** Wyznacz wzór funkcji kwadratowej  $f$  w postaci ogólnej wiedząc, że jej zbiorem wartości jest przedział  $(-\infty, 6)$ , największa wartość funkcji  $f$  w przedziale  $\langle -7, -5 \rangle$  jest równa 4, a osią symetrii wykresu tej funkcji jest prosta o równaniu  $x + 3 = 0$ .

**3.84.** Wyznacz wzór funkcji kwadratowej  $f$  w postaci ogólnej wiedząc, że jej miejscami zerowymi są liczby 1 i  $-3$ , a najmniejsza wartość funkcji  $f$  w przedziale  $\langle -2, 0 \rangle$  jest równa  $-8$ .

**3.85.** Wyznacz wzór funkcji kwadratowej  $f$  w postaci ogólnej wiedząc, że funkcja  $f$  ma tylko jedno miejsce zerowe,  $f(2) = f(10)$  oraz największa wartość funkcji  $f$  w przedziale  $\langle 8, 9 \rangle$  jest równa  $-2$ .

**3.86.** Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej  $f$  jest liczba 2, a największa wartość funkcji  $f$  w przedziale  $\langle 10, 12 \rangle$  jest równa 10. Wyznacz wzór funkcji  $f$  w postaci ogólnej wiedząc, że jej wykres jest symetryczny względem prostej o równaniu  $x = 5$ .

**3.87.** Największa wartość funkcji kwadratowej  $f$  w przedziale  $\langle -3, 0 \rangle$  jest równa 4, a najmniejsza wartość w tym przedziale jest równa 1. Wyznacz wzór tej funkcji w postaci ogólnej wiedząc, że maksymalny przedział, w którym funkcja  $f$  jest rosnąca, to  $(-\infty, -2)$ .

**3.88.** Największa wartość funkcji kwadratowej  $f$  w przedziale  $\langle -5, -4 \rangle$  jest równa  $-14$ . Wyznacz wzór funkcji kwadratowej  $f$  w postaci ogólnej wiedząc, że maksymalny przedział, w którym funkcja jest malejąca to  $\langle -1, +\infty \rangle$  oraz  $f(1) = -4$ .

**3.89.** Wyznacz wzór funkcji kwadratowej  $f$  w postaci ogólnej wiedząc, że w przedziale  $\langle -5, -3 \rangle$  funkcja  $f$  przyjmuje największą wartość, równą 3 oraz  $f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in \mathbf{R} - \{-2\}$ .

## Badanie funkcji kwadratowej – zadania optymalizacyjne

**3.90.** Tor lotu piłki przedstawiony na rysunku obok, opisuje wzór:  $g(x) = -0,25x^2 + 2x$ , gdzie  $x \in (0, 8)$ . Na jaką maksymalną wysokość wzniósł się piłka?



**3.91.** Funkcja  $f(x) = \frac{-x^2 + 6x + 21}{2}$  opisuje wydajność pracy robotnika w zależności od czasu pracy  $x$ , w ciągu 8-godzinnego dnia pracy. Robotnik rozpoczyna pracę o godzinie 7<sup>00</sup>. O której godzinie jego wydajność jest największa?

**3.92.** Pewne ciało w czasie  $t$  [s] przebyło drogę  $S$  [m], którą opisuje wzór  $S(t) = t^2 + 5t + 8$ , gdzie  $t \in \langle 1, 5 \rangle$ . Oblicz:

- długość drogi przebytej przez to ciało w ciągu czterech sekund
- średnią prędkość ciała.

**3.93.** Rzucono kamień z prędkością początkową 10 m/s pionowo do góry. Wysokość  $S$  [m], jaką osiągnie kamień po  $t$  sekundach, określona jest w przybliżeniu funkcją  $S(t) = 10t - 5t^2$ . Jaką maksymalną wysokość osiągnie ten kamień?

**3.94.** Liczbę 100 przedstaw w postaci sumy takich dwóch liczb, których suma kwadratów jest najmniejsza.

**3.95.** Liczbę 30 przedstaw w postaci różnicy takich dwóch liczb, aby suma ich kwadratów była najmniejsza.

**3.96.** Liczbę 18 przedstaw w postaci sumy dwóch takich składników, aby suma ich sześcianów była najmniejsza.


**3.97.** Większa część uczniów klasy liczącej 31 osób zachorowała na gripę. Zdrowi uczniowie postanowili wysłać chorym kolegom kartki z pozdrowieniami. Wiedząc, że każdy zdrowy uczeń wysłał do każdego chorego kolegi kartkę, oraz że liczba wysłanych kartek była największa z możliwych, oblicz ilu uczniów zachorowało na gripę.

**3.98.** Krótszy bok prostokąta o wymiarach 5 cm  $\times$  8 cm zwiększamy o  $x$  cm, a dłuższy bok zmniejszamy o  $x$  cm.

- Wyznacz wzór funkcji opisującej pole nowego prostokąta w zależności od  $x$ ; podaj dziedzinę tej funkcji.
- Dla jakiej długości  $x$  pole otrzymanego prostokąta jest największe? Oblicz to pole.

**3.99.** Z prostokątnego arkusza tektury o wymiarach 20 cm  $\times$  30 cm odcięto w rogach kwadraty, których boki mają długość  $x$  cm. Następnie po zagięciu powstałych brzegów zbudowano prostopadłościennie (otwarte) pudełko, jak na rysunku poniżej.

- Wyznacz wzór funkcji opisującej pole powierzchni bocznej tego pudełka w zależności od długości boku wyciętego kwadratu; podaj dziedzinę tej funkcji.
- Dla jakiej długości  $x$  pole powierzchni bocznej pudełka jest największe z możliwych? Oblicz to pole.



**3.100.** Suma długości podstawy trójkąta i wysokości opuszczonej na tę podstawę wynosi 30 cm. Wyznacz długość podstawy tak, aby pole trójkąta było największe.


**3.101.** Właściciel gospodarstwa agroturystycznego chce wygrodzić w ogrodzie prostokątny plac zabaw dla dzieci. Dysponuje płotem długości 84 m, a powierzchnia placu ma być możliwie największa. Wyznacz wymiary tego placu zabaw i oblicz jego powierzchnię (w arach).

**3.102.** Gospodarz chce siatką o długości 12 m wygrodzić na podwórku prostokątny wybieg dla psa, przylegający jednym bokiem do budynku. Jakie wymiary powinien mieć ten wybieg, aby jego pole powierzchni było największe? Oblicz powierzchnię tego największego wybiegu.




**3.103.** Strona książki ma obwód 68 cm. Oblicz, jakie wymiary powinna mieć strona tej książki, aby zapewnić maksymalną powierzchnię druku, jeśli założymy, że marginesy boczne i dolny będą jednocentymetrowe, zaś margines górny – dwucentymetrowy.

**3.104.** Z kawałka płótna w kształcie trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych długości 2 m i 1,5 m hałciarka chce wyciąć prostokątną serwetkę w sposób przedstawiony na rysunku obok. Jakie powinny być wymiary serwetki, aby jej pole było największe?




**3.105.** Z kawałka płótna w kształcie trójkąta równoramiennego o podstawie 4 m i wysokości opuszczonej na tę podstawę równej 3 m hałciarka chce wyciąć prostokątny obrus w sposób przedstawiony na rysunku obok. Jakie powinny być wymiary obrusa, aby jego powierzchnia była największa?



**3.106.** Na bokach kwadratu o polu  $16 \text{ cm}^2$  zaznaczamy punkty  $K, L, M, N$  tak, że  $|AK| = |DL| = |CM| = |BN|$ , jak na rysunku obok.

a) Oznacz literą  $x$  długość odcinków  $AK, DL, CM$  oraz  $BN$ . Napisz wzór funkcji pola czworokąta  $KLMN$  w zależności od  $x$ . Określ dziedzinę tej funkcji.

b) Jak należy wybrać punkty  $K, L, M, N$ , aby pole czworokąta  $KLMN$  było najmniejsze?



**3.107.** Właściciel sklepu kupuje aparaty fotograficzne, płacąc producentowi 1200 zł za sztukę. Następnie sprzedaje miesięcznie 40 sztuk takich aparatów

po 1800 zł za sztukę. Sprzedawca oszacował, że każda obniżka ceny aparatu o 10 zł w jego sklepie zwiększy liczbę sprzedanych aparatów o jedną sztukę. Jaką powinien ustalić cenę, aby jego miesięczny zysk był największy?

**3.108.** Firma ma 180 lokali użytkowych i zajmuje się wynajmem tych lokali na działalność usługową. Obecnie wszystkie lokale są wynajęte, a miesięczna opłata za wynajem każdego lokalu wynosi 1200 zł. Firma postanowiła zoptymalizować swój miesięczny zysk i wprowadzić podwyżkę. W tym celu oszacowano, że każda podwyżka ceny o 40 zł spowoduje zmniejszenie o 5 liczby wynajmowanych pomieszczeń. Jaką miesięczną cenę wynajmu każdego lokalu powinna ustalić ta firma, aby jej zysk był największy? Ile wynosi ten największy miesięczny zysk?

**3.109.** Hotel ma 60 pokoi. Opłata za dobę hotelową w każdym pokoju wynosi 320 zł. Właściciel hotelu udziela specjalnej zniżki firmom rezerwującym więcej niż 30 pokoi. Wówczas dobowo opłata za każdy wynajęty pokój jest niższa o 4 złote pomnożone przez liczbę pokoi, które firma rezerwuje ponad liczbę 30.

a) Jaka liczba rezerwowanych przez daną firmę pokoi dawałaby hotelowi największy przychód na dobę?

b) Przy jakiej liczbie wynajętych pokoi właściciel hotelu osiągnie największy zysk, jeśli uwzględni koszt sprzętania i obsługi każdego pokoju, równy 24 złote za dobę?

**3.110.** Drut długości 2 m trzeba podzielić na dwa kawałki: z jednego powstanie kwadratowa ramka, a z drugiego ramka prostokątna, której długości boków pozostają w stosunku 1 : 3. Jaką długość powinien mieć każdy z tych kawałków drutu, aby suma pól kwadratu i prostokąta była najmniejsza?

## Równania kwadratowe

**3.111.** Rozwiąż równanie:

a)  $(x + 2)^2 = 0$

b)  $4x^2 - 7x = 0$

c)  $3x^2 + 8 = 0$

d)  $4x^2 - 12x + 9 = 0$

e)  $3x^2 - 6 = 0$

f)  $(x + 3)(x - 7) = 0$

**3.112.** Rozwiąż równanie:

a)  $81x^2 = 25$

b)  $1 - 4x^2 = 0$

c)  $\frac{1}{2}(x^2 + 2) = 7$

d)  $(x - 3)^2 = 25$

e)  $2(x + 1)^2 = 18$

f)  $(x - 13)^2 + 1 = 0$

**3.113.** Rozwiąż równanie:

a)  $2x^2 + 5x - 12 = 0$

b)  $3x^2 - 7x = 20$

c)  $9x^2 = 12x - 4$

d)  $2(x^2 + 4) = -3x$

e)  $49x^2 = 4x$

f)  $16x^2 + 25 = 40x$

3.114. Rozwiąż równanie:

a)  $3x^2 + 5x = 2$

b)  $5x = 2x^2 + 3$

d)  $6(x^2 + 2) = 4(3 - x)$

e)  $5x^2 = 2 - 9x$

c)  $4x - x^2 = 7$

f)  $(2x + 3)^2 = 8x + 4$

3.115. Rozwiąż równanie:

a)  $(2x + 6)(5 - x) = 0$

c)  $x(x - 1) + 3(x - 1) = 0$

e)  $4 - (x + 3)^2 = 0$

b)  $5x(x + 2) - 3x = 0$

d)  $(x + 1)^2 - 100 = 0$

f)  $x(x + 2) = x + 2$

3.116. Rozwiąż równanie:

a)  $x(x + 5) = x + 5$

c)  $x^2 = (4 - x)(x + 4)$

e)  $81 - (3x + 7)^2 = 0$

b)  $(x + 1)^2 = x + 1$

d)  $x(2x - 1) = (1 - 2x)(1 + 2x)$

f)  $(2x + 1)(2x + 1) = 4$

3.117. Rozwiąż równanie:

a)  $(x + 1)(2x - 3) + (x + 1)x = 0$

c)  $(5x + 1)^2 = (7x - 2)^2$

e)  $(3x - 1)(4x - 3) = (3x - 1)(2x - 1)$

b)  $(3x - 1)(3x + 1) = 10x^2 + 3$

d)  $(2x - 7)^2 = (4x - 1)^2$

f)  $(2x - 1)^2 - 3x^2 = 6(x - 4)$

3.118. Rozwiąż równanie:

a)  $x^2 - (3x - 1)^2 = 56x - 43$

c)  $(-2x - 1)(1 + 2x) = 8$

e)  $(2x - 3)(x + 1) = 1 + (x + 2)(3x - 2)$

b)  $11 - 14x = (2x + 1)^2$

d)  $2x^2 + 11x + 21 = (-x + 5)(5 + x)$

f)  $(3x - 1)^2 - (2x - 3)^2 + 2(x + 6) = x^2$

3.119. Rozwiąż równanie:

a)  $(2x - 3)(2x + 3) = (x + 5)^2 - 9$

b)  $2x(x - 3) - (x + 1)(x + 2) = (2x - 3)^2$

c)  $(2x - 1)^2 - (4x + 1)(4x - 1) = 4x(1 - 2x)$

d)  $(2x + 1)^2 - 9(x - 1)^2 = 4 - x$

e)  $(x - 1)^2 + 2(x - 3)^2 = 18 - 10x$

f)  $(2x + 5)^2 - (2x - 5)^2 = 3x^2 + 41x - 4$

3.120. Rozwiąż równanie:

a)  $8x - 2x(3x - 1) = 2x^2 + 3$

c)  $(2x - 4)(2x + 4) = (3x - 1)^2 - 16$

e)  $(x^2 - 3x + 1)(x + 2) = x^3 - 2x - 1$

b)  $x^2 - 5x + 9 = 63 - (x - 3)(x + 3)$

d)  $6 - (1 - x)^2 = (2x - 3)^2 - (3x + 2)^2$

f)  $(2x - 3)(3x + 5) = (3 - 2x)(x + 3)$

3.121. Rozwiąż równanie:

a)  $(2x + 5)^2 - x(x + 20) = 0$

b)  $x(4 - x) = (2x + 3)(x - 2) + 8$

c)  $8x(7 - 3x) + 1 = 4(2 - x)(x + 2)$

d)  $(4 - x)^2 - (2 + x)^2 = x^2 + 12$

e)  $(2x - 1)(2x + 1) + 2 = 9x - 5x(x + 3)$

f)  $(x - 6)(6 + x) = (4x + 3)^2 - (2 - x)^2$

3.122. Rozwiąż równanie:

a)  $\frac{(x-2)(2-x)}{2} - \frac{x^2-3x}{4} = -2+3x-x^2$

b)  $\frac{(3-x)(x+3)}{3} - \frac{(x+2)^2-4}{6} = \frac{5\frac{1}{3}-x}{2}$

c)  $\frac{(2x-3)(x+1)}{5} - \frac{(x-1)(x+1)}{2} = x+3$

d)  $\frac{(3x-1)^2-4}{3} - \frac{10}{3}x^2 - \frac{5+(2-x)(x+2)}{2} = -x-7$

3.123. Rozwiązaniem danego równania z niewiadomą  $x$  jest liczba podana obok tego równania. Oblicz  $a$ .

a)  $5 + (a^2 - 18)x + 6x^2 = 0$ ;  $2\frac{1}{2}$

b)  $15x^2 + (a^2 + 2a - 2)x = 6$ ;  $-\frac{2}{3}$

3.124. Rozwiąż graficznie równanie:

a)  $x^2 + x = 6$

b)  $x = (2 - x)^2$

c)  $\frac{1}{2}x^2 + 2 = -\frac{1}{2}(x - 2)^2 + 4$

d)  $x^2 + 5x + 6 = 4\frac{1}{4} - \left(x + 2\frac{1}{2}\right)^2$

## Równania prowadzące do równań kwadratowych

3.125. Rozwiąż równanie:

a)  $x^4 = 16x^2$

b)  $x^4 - 10x^2 + 25 = 0$

c)  $x^4 = 3 - 2x^2$

d)  $x^4 + 12x^2 + 35 = 0$

e)  $4x^4 + 9 = 37x^2$

f)  $x^4 + 2x^2 = 24$

3.126. Rozwiąż równanie:

a)  $x^4 = 5x^2 - 4$

b)  $x^4 + 5x^2 = 14$

c)  $x^4 - 25x^2 + 144 = 0$

d)  $x^4 - 25x^2 = 0$

e)  $x^2(x^2 + 8) + 15 = 0$

f)  $4x^4 + 3(3x^2 - 1) = -2x^2$

**3.127.** Rozwiąż równanie:

a)  $4x^2(x^2 - 2) - 2 = 5(x - 1)(x + 1)$     b)  $(x^2 + 1)^2 = 3 + x^2 - 5x^4$   
 c)  $x^2(2x - 1)(2x + 1) = 2 - x^2(x^2 + 10)$     d)  $(x^2 - x + 3)(x^2 + 2x) = x(6 + x^2)$   
 e)  $(x^2 - 3)^2 - 24 = 2x^4 - 14x^2$     f)  $3(x^4 + 3) = (x^2 - 1)^2 + 12x^2$

**3.128.** Rozwiąż równanie:

a)  $x^4 - 18x^2 = (x^2 - 9)(2x^2 + 3) + 23$     b)  $(x^2 + 6)(7 - x^2) - 36 = x^4 + 12x^2$   
 c)  $(2x^2 - 1)^2 - (2x^2 + 3)^2 = x^4 + 56$     d)  $(x^2 - 1)^2 - 4(x^2 - 1) + 4 = 0$   
 e)  $(2x^2 + 3)(2x^2 - 3) + 10 = 5x^4$     f)  $(x^2 - 1)^2 - (9x^2 - 4) = 5 - 7x^2$

**3.129.** Rozwiąż równanie:

a)  $(x^2 - 4)^2 = 9(x^2 - 4)$     b)  $(x^2 + 3)^2 - 5(x^2 + 3) + 4 = 0$   
 c)  $(x^2 + 2x)^2 + 9 = 6x^2 + 12x$     d)  $(x^2 - 8x)^2 + 5 = 2(x^2 - 8x)$   
 e)  $(x^2 - x)^2 = 20x^2 - 20x$     f)  $(x^2 + 3x - 1)^2 + 7(x^2 + 3x - 1) = -12$

## Nierówności kwadratowe

**3.130.** Rozwiąż nierówność:

a)  $2x^2 + 1 > 0$     b)  $\frac{x^2}{4} \leq 0$     c)  $-3x^2 + 2x \geq 0$   
 d)  $x^2 - 25 > 0$     e)  $-x^2 - 4 > 0$     f)  $x^2 \geq x$

**3.131.** Rozwiąż nierówność:

a)  $-3(x - 2)(x + 4) > 0$     b)  $9x^2 + 1 > 6x$     c)  $x < 6x^2$   
 d)  $(2x - 1)(2x - 1) \geq 0$     e)  $x^2 + 4 > x$     f)  $(5 - x)(x + 2) \geq 0$

**3.132.** Rozwiąż nierówność:

a)  $(x - 3)^2 - 4 > 0$     b)  $4x^2 - 2x \geq 5x^2$     c)  $(1 + x)(3 - 2x) \leq 0$   
 d)  $x(x + 6) \geq 6x - 8$     e)  $x^2 - 3(x - 3) < 9 - 3x$     f)  $4x(x - 1) \leq -1$

**3.133.** Rozwiąż nierówność:

a)  $-4x^2 < 1$     b)  $-2x(5 - x) \leq 0$     c)  $28x \geq 4x^2 + 49$   
 d)  $x^2 < 2 - x$     e)  $3x^2 + 1 > 2,5x$     f)  $x - 7 \geq 5x^2$

**3.134.** Rozwiąż nierówność:

a)  $\frac{1}{2}x^2 - x \geq 1$     b)  $(2x - 1)^2 > 16$     c)  $9 + 25x^2 \leq 30x$   
 d)  $(5x + 1)^2 + 4 < 0$     e)  $9x^2 + 4(3x + 1) > 0$     f)  $9 - (2x - 1)^2 \geq 0$

**3.135.** Rozwiąż nierówność:

a)  $8x - 1 > 16x^2$     b)  $2x^2 + 4 \geq 3x$     c)  $(2 - x)(x + 3) \leq 0$   
 d)  $(2x - 5)^2 \leq 0$     e)  $-1 < -(1 - x)^2$     f)  $25x^2 > 4(5x - 1)$

**3.136.** Rozwiąż nierówność:

a)  $(x - 3)(2x + 5) \leq (2x - 6)(2x - 1)$     b)  $(2 - 8x)(x + 1) > (1 - 4x)(x + 2)$   
 c)  $(3 - 5x)(2x + 1) < (2x + 1)(3x + 2)$     d)  $(2 - 6x)(3x + 9) \geq x^2 - 9$   
 e)  $(x + 5)^2 \geq (2x + 10)^2$     f)  $(2x - 3)^2 < (x - 1,5)^2$

**3.137.** Rozwiąż nierówność:

a)  $x(x + 6) \leq 3(4x - 3)$     b)  $-2x^2 + 5(x + 1) < 2(x + 2) - 3x(x - 1)$   
 c)  $2x(x - 2) - 7 > -4(x + 3)$     d)  $8(x - 2) - x(x - 2) \geq -16$   
 e)  $9(1 - x) \geq x^2 - 10x + 3$     f)  $1 - 2x(x - 3) < x(5 - 4x)$

**3.138.** Rozwiąż nierówność:

a)  $(3 - 2x)(2x + 3) > 1 - 2x(x + 3)$     b)  $(2x - 3)^2 > (x + 2)^2$   
 c)  $x^2 + 6x + 9 \geq (2x - 1)^2$     d)  $(2x - 1)(5x + 3) + 13 \leq (3x - 1)^2 + x$   
 e)  $(-x - 5)(5 + x) + 9x \leq 2(x - 1)^2$     f)  $2(x - 4)(x + 4) > 3x(2x + 3)$

**3.139.** Rozwiąż nierówność:

a)  $\frac{(x-1)^2 - 2}{5} - \frac{x+3}{2} > \frac{(x+2)^2 - 43}{10}$   
 b)  $\frac{(x+3)(2x-1) - (x+2)^2}{3} \leq \frac{x-1}{2} - \frac{3x+2}{3}$   
 c)  $\frac{x - \frac{x^2-4}{2}}{5} \geq \frac{3 - \frac{(x+2)^2}{4}}{2} + \frac{1}{8}$   
 d)  $\frac{x^2 - 2x + 3}{3} - \frac{x^2 + 4}{24} < \frac{(x-1)^2 - \frac{x-4}{2}}{3}$

**3.140.** Rozwiąż graficznie nierówność:

a)  $x^2 - 6x + 9 \leq -x + 5$     b)  $-x^2 - 1 < -x - 3$     c)  $x^2 + 2x - 3 \geq -2x - 3$   
 d)  $x - 8 < x^2 + x - 6$     e)  $x^2 + 2x - 3 \leq \frac{1}{5}(x - 1)^2$     f)  $\frac{1}{9}x(6 - x) < (x - 3)^2 + 1$

**3.141.** Podaj przykład nierówności kwadratowej:

- a) sprzecznej  
 b) której zbiorem rozwiązań jest suma przedziałów  $(-\infty, -1) \cup (4, +\infty)$   
 c) której zbiorem rozwiązań jest zbiór  $\mathbf{R}$   
 d) której zbiór rozwiązań jest jednoelementowy  
 e) której zbiorem rozwiązań jest przedział liczbowy  $(2, 7)$   
 f) której zbiorem rozwiązań jest zbiór  $\mathbf{R} - \{-5\}$ .

**3.142.** Dana jest nierówność kwadratowa  $(3x - 4)(2x + a) < 0$  z niewiadomą  $x$ . Wyznacz liczbę  $a$ , dla której zbiorem rozwiązań tej nierówności jest przedział  $(\frac{1}{3}, 4)$ .

**3.143.** Dana jest nierówność kwadratowa  $(5a - 4x)(x - 1) \geq 0$  z niewiadomą  $x$ . Wyznacz liczbę  $a$ , dla której zbiorem rozwiązań tej nierówności jest przedział  $(-3, 1)$ .

**3.144.** Dana jest nierówność kwadratowa  $(2x - 3)(6x + 5a) \leq 0$  z niewiadomą  $x$ . Wyznacz liczbę  $a$ , dla której jedynym rozwiązaniem nierówności jest liczba  $\frac{1}{2}$ .

**3.145.** Wyznacz zbiory  $A, B, A \cap B, A \cup B$  oraz  $B - A$ , jeśli:  
 $A$  - zbiór tych argumentów, dla których funkcja kwadratowa  $f(x) = x^2 - 6x + 5$  przyjmuje wartości nieujemne  
 $B$  - zbiór tych argumentów, dla których funkcja kwadratowa  $g(x) = x^2 + 3x$  przyjmuje wartości większe od 4.

**3.146.** Dane są zbiory:

$A = \{x: x \in \mathbf{R} \wedge x^2 \leq 4x\}$ ;  $B = \{x: x \in \mathbf{Z} \wedge x^2 - 7x + 4 \geq 3x^2 - 5x\}$ .  
 Wyznacz zbiory:  $A, B, A \cup B, A \cap B$ .

**3.147.** Wyznacz dziedzinę funkcji  $f$  określonej wzorem:

- a)  $f(x) = \sqrt{2x^2 + x + 8}$       b)  $f(x) = \sqrt{4x - 2x^2}$   
 c)  $f(x) = \sqrt{3x^2 + 9x - 12}$       d)  $f(x) = \sqrt{-4x^2 + 4x - 1}$   
 e)  $f(x) = \frac{5x + 7}{\sqrt{4 - (x + 1)^2}}$       f)  $f(x) = \frac{2x^2 - 3}{\sqrt{25x^2 - 40x + 16}}$ .

**3.148.** Wyznacz wszystkie wartości  $m, m \in \mathbf{R}$ , dla których liczba  $x$  należy do podanego przedziału liczbowego, jeśli:

- a)  $x = m^2 - 4m, x \in (5, +\infty)$       b)  $x = 5 + 2m - 2m^2, x \in (-\infty, -7)$   
 c)  $x = m^2 - 3m, x \in (-2, 4)$       d)  $x = m^2 + 5m + 1, x \in (-5, -3)$ .

**3.149.** Wyznacz wszystkie wartości parametru  $m, m \in \mathbf{R}$ , dla których dziedziną funkcji  $f$  jest zbiór liczb rzeczywistych, jeśli:

- a)  $f(x) = \sqrt{2x^2 - mx + 2}$       b)  $f(x) = \sqrt{3x^2 + mx - m - 3}$   
 c)  $f(x) = \frac{x - 3}{\sqrt{x^2 + (m - 1)x + 4}}$       d)  $f(x) = \frac{x^2 + 1}{\sqrt{x^2 + (m + 2)x + m^2}}$ .

## Zadania prowadzące do równań i nierówności kwadratowych

**3.150.** Suma kwadratów dwóch liczb różniących się o 4 jest równa 400. Wyznacz te liczby.

**3.151.** Suma kwadratów trzech kolejnych liczb parzystych jest równa 308. Wyznacz te liczby.

**3.152.** Suma kwadratów trzech kolejnych liczb nieparzystych wynosi 155. Wyznacz te liczby.

**3.153.** W liczbie trzycyfrowej cyfra dziesiątek jest o 2 większa od cyfry setek, zaś cyfra jedności o 1 mniejsza od cyfry dziesiątek. Kwadrat cyfry dziesiątek jest równy sumie kwadratów pozostałych cyfr. Wyznacz tę liczbę.

**3.154.** Suma cyfr pewnej liczby dwucyfrowej jest równa 5. Jeśli tę liczbę pomnożymy przez liczbę dwucyfrową o takich samych cyfrach, ale zapisanych w odwrotnej kolejności, to otrzymamy 736. Wyznacz tę liczbę.

**3.155.** W trzycyfrowej liczbie naturalnej cyfra setek jest taka sama jak cyfra jedności, zaś cyfra dziesiątek jest o 3 większa od cyfry jedności. Jeżeli tę liczbę zmniejszymy o kwadrat sumy jej cyfr, to otrzymamy 105. Wyznacz tę liczbę trzycyfrową.

**3.156.** Ile boków ma wielokąt wypukły, w którym liczba przekątnych jest o 117 większa od liczby jego boków?

**3.157.** Na płaszczyźnie zaznaczono  $n$  punktów, z których dowolne trzy nie są współliniowe. Następnie połączono te punkty odcinkami. Ile jest tych punktów, jeśli wyznaczyły one 15 odcinków?

**3.158.** Do turnieju siatkówki zgłosiły się reprezentacje klas pierwszych pewnego liceum. Klasy rozegrały każda z każdą po jednym meczu. Wszystkich meczów rozegrano 10. Ile klas brało udział w tym turnieju?

**3.159.** Na jednym z osiedli mieszkaniowych znajduje się rabata kwiatowa w kształcie trójkąta prostokątnego, którego przyprostokątne różnią się o 7 m. Powierzchnia rabaty wynosi  $30 \text{ m}^2$ . Ile metrów płotka potrzeba na ogrodzenie tej rabaty?

**3.160.** Robotnik przeciął blachę w kształcie trójkąta prostokątnego wzdłuż wysokości poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego na przeciwprostokątną, dzieląc ją na dwa trójkąty prostokątne. Wspólna przyprostokątna powstałych trójkątów ma długość 1,2 m, zaś drugie przyprostokątne różnią się o 70 cm. Oblicz powierzchnię kawałków blach po rozcięciu.

**3.161.** Prostokątny obraz bez ramy ma wymiary  $82 \text{ cm} \times 36 \text{ cm}$ , a wraz z ramą zajmuje powierzchnię  $3567 \text{ cm}^2$ . Oblicz, jaką szerokość ma rama tego obrazu.

**3.162.** Park miejski ma kształt rombu, którego obwód wynosi 2 km. Dwie główne alejki spacerowe wyznaczone są przez przekątne rombu, a jedna z nich jest o 200 m dłuższa od drugiej. Oblicz długości tych alejek.

**3.163.** W pewnym prostokącie jeden z boków skrócono, a drugi wydłużono o  $p\%$  tak, że pole prostokąta zmniejszyło się o 9%. Oblicz  $p$ .

**3.164.** Drut długości 64 cm podzielono na dwa kawałki. Z jednego kawałka wykonano kwadratową ramkę, a z drugiego ramkę prostokątną, której stosunek długości boków jest równy  $3 : 1$ . Oblicz długości kawałków drutu, wiedząc, że suma powierzchni wyznaczonych przez obie ramki wynosi  $112 \text{ cm}^2$ .

**3.165.** Kupiec ma dwie beczki wina dwóch różnych szczepów. Stosunek liczby litrów wina z pierwszej beczki do liczby litrów wina z drugiej beczki jest równy  $3 : 2$ . Litr wina z pierwszej beczki kosztuje tyle złotych, ile jest równe 25% liczby litrów wina, znajdującego się w drugiej beczce. Litr wina z drugiej beczki jest o 10 zł droższy od litra wina z pierwszej beczki. Wiedząc, że łączna wartość win w obu beczkach jest równa 4800 zł, oblicz:

- ile litrów wina jest w każdej beczce
- cenę jednego litra każdego z tych win.

**3.166.** Pewna osoba zapytana, ile ma lat, odpowiedziała: „Jeżeli całkowitą liczbę moich lat pomnożymy przez liczbę o 50 mniejszą i do otrzymanego iloczynu dodamy ta osoba?


**3.167.** Jak dobrać wymiary prostokąta, aby jego pole było nie mniejsze niż 5 nie większe niż 12, a długości boków były liczbami naturalnymi, różniącymi się o 4? Podaj wszystkie możliwości.

**3.168.** Proste o równaniach

$$y = \frac{1}{2}x + a + 1 \text{ oraz } x = a, \text{ gdzie } a \text{ jest}$$

liczbą rzeczywistą dodatnią, przecinają się w punkcie  $M$  i wraz z osiami układu współrzędnych ograniczają trapez prostokątny (zobacz rysunek obok).


- Napisz wzór funkcji  $P$  – określającej pole tego trapezu w zależności od  $a$ , gdzie  $a \in (0, +\infty)$ .
- Wyznacz liczbę  $a$ , dla której pole trapezu jest równe 3.
- Wyznacz wszystkie wartości  $a$ , dla których pole trapezu jest większe od 24 i jednocześnie nie większe od 51.




**3.169.** Wyznacz wszystkie dwucyfrowe liczby naturalne o sumie cyfr równej 9, które spełniają warunek: iloczyn liczby i jej cyfry jedności jest większy od 144.

**3.170.** Ile jest wielokątów wypukłych, w których liczba przekątnych jest mniejsza od potrojonej liczby jego boków?

**3.171.** Przez działkę w kształcie prostokąta o wymiarach  $20 \text{ m} \times 40 \text{ m}$  ma przebiegać ścieżka w sposób pokazany na rysunku. Powierzchnia ścieżki może stanowić co najwyżej 9,75% całej powierzchni działki. Jaką największą wartość może przyjąć  $x$ ?



3.172. W kwadrat  $ABCD$  o boku 7 cm wpisano kwadrat  $MNPR$  tak, że punkty  $M, N, P, R$  należą odpowiednio do boków  $AB, BC, DC$  oraz  $AD$ . Wiedząc, że pole kwadratu  $MNPR$  jest równe  $25 \text{ cm}^2$ , oblicz długości odcinków, na jakie punkty  $M, N, P, R$  podzieliły boki kwadratu  $ABCD$ .



3.173. Obwód trójkąta prostokątnego jest równy 30, a suma kwadratów długości wszystkich boków trójkąta wynosi 338. Wyznacz wysokość poprowadzoną na przeciwprostokątną.

### Test sprawdzający do rozdziału 3.

- Wykresem funkcji kwadratowej  $y = 2x^2 - 3$  jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych:
  - $(2, -3)$
  - $(-3, 0)$
  - $(1, -3)$
  - $(0, -3)$
- Ośią symetrii wykresu funkcji kwadratowej  $y = -\frac{1}{4}x^2 + 3x - 8$  jest prosta o równaniu:
  - $x = 6$
  - $y = -6$
  - $x = 1,5$
  - $y = 6$
- Funkcja kwadratowa  $y = -2x(x - 8)$  jest rosnąca w przedziale:
  - $\langle 4, +\infty \rangle$
  - $(-\infty, 8)$
  - $(-\infty, 4)$
  - $\langle 8, +\infty \rangle$
- Wykres funkcji  $y = 9 - 2(x + 1)^2$  przecina oś  $OY$  w punkcie o rzędnej:
  - 11
  - 10
  - 7
  - 2
- Wskaż zbiór rozwiązań nierówności  $(3 - x)(x + 2) \geq x + 2$ .
  - $(-\infty, 2)$
  - $\langle -2, 2 \rangle$
  - $\langle -2, +\infty \rangle$
  - $\langle -2, 3 \rangle$
- Suma miejsc zerowych funkcji  $y = (x - 1)^2 - 16$  jest równa:
  - 2
  - 8
  - 2
  - 8

- Najmniejsza wartość funkcji kwadratowej  $y = 3(x - 2)(x + 6)$  jest równa:
  - 48
  - 36
  - 30
  - 12
- Funkcja kwadratowa  $f$  ma dwa miejsca zerowe:  $\sqrt{2}$  oraz  $-2\sqrt{2}$ . Wówczas iloraz  $\frac{f(1)}{f(2)}$  jest równy:
  - $\frac{1}{2} - 3\sqrt{2}$
  - $\frac{\sqrt{2}}{4}$
  - $\frac{3\sqrt{2}}{4}$
  - $\frac{1}{2} - \frac{3}{4}\sqrt{2}$
- Średnia arytmetyczna miejsc zerowych funkcji kwadratowej  $y = 2x^2 + bx + c$  jest równa 1, a zbiorem wartości tej funkcji jest przedział  $\langle 10, +\infty \rangle$ . Zatem:
  - $b + c = 8$
  - $b + c = -8$
  - $b + c = 16$
  - $b + c = -16$
- Wykres funkcji  $y = -x^2 - 5x$  przesunięto równolegle wzdłuż osi  $OX$  o 2 jednostki w prawo i otrzymano wykres funkcji  $f$ . Zatem funkcję  $f$  opisuje wzór:
  - $f(x) = -x^2 - x + 6$
  - $f(x) = -x^2 - x - 14$
  - $f(x) = -x^2 - 9x - 14$
  - $f(x) = -x^2 - x - 4$
- Wyróżnik funkcji kwadratowej jest równy 16, a współrzędne wierzchołka wykresu tej funkcji wynoszą  $(-1, 4)$ . Wskaż miejsca zerowe tej funkcji.
  - $-1$  i  $4$
  - $1$  i  $-3$
  - $-1$  i  $3$
  - $1$  i  $-4$
- Jedynym miejscem zerowym funkcji kwadratowej  $f(x) = ax^2 + bx + c$  jest liczba 2, a do wykresu tej funkcji należy punkt  $P(-1, 18)$ . Zatem współczynnik  $a$  we wzorze funkcji  $f$  jest równy:
  - $-\frac{1}{2}$
  - 2
  - 2
  - $\frac{1}{2}$

### Zadania powtórzeniowe do rozdziału 3.

13. Rozwiąż równania:

- $-2(x + 10)^2 = 0$
- $\frac{x \cdot (x - 1)}{2} = \frac{x + 3}{5}$
- $(2x^2 - 3)(2x^2 + 3) = 5x^2$
- $(x^2 - 3x)^2 = 4(x^2 - 3x)$

14. Rozwiąż nierówność:

a)  $7 - 2(x - 2)^2 \geq 5x$

c)  $3x(3x - 4) < 4(4 - 3x)$

b)  $2x^2 + 9 \leq 6\sqrt{2}x$

d)  $\frac{x - \frac{x^2 + 2x}{3}}{2} < x + 2$

15. Wyznacz najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej  $y = 2x^2 - 4x + 5$  w przedziale  $(-2, 3)$ .

16. Dany jest wzór funkcji kwadratowej  $f(x) = -0,5x^2 + x + 4$ .

a) Napisz wzór funkcji  $f$  w postaci kanonicznej.

b) Wyznacz miejsca zerowe funkcji  $f$ .

c) Rozwiąż graficznie równanie  $f(x) = x + 2$ .

17. Wykresem funkcji kwadratowej  $f(x) = ax^2 - 6x + c$  jest parabola, której wierzchołek ma współrzędne  $(-1, 0)$ .

a) Oblicz  $a$  i  $c$ .

b) Podaj zbiór wartości funkcji, opisanej wzorem  $y = 8 - f(x)$ .

c) Wyznacz zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja  $f$  przyjmuje wartości większe, niż funkcja  $g(x) = -2x - 2$ .

18. Funkcja kwadratowa  $f$  ma dwa miejsca zerowe:  $-3$  i  $1$ . Wykres funkcji  $f$  przecina oś  $OY$  w punkcie o rzędnej  $-\frac{1}{2}$ .

a) Wyznacz wzór funkcji  $f$  w postaci iloczynowej.

b) Podaj maksymalne przedziały monotoniczności funkcji  $f$ .

c) Jakie miejsca zerowe ma funkcja  $y = f(-x) + 1\frac{1}{2}$ ?

19. Funkcja kwadratowa  $f(x) = ax^2 + bx + c$ , gdzie  $a \neq 0$ , przyjmuje wartości ujemne wtedy i tylko wtedy, gdy  $x \in (-\infty, -6) \cup (-2, +\infty)$ . Największa wartość funkcji  $f$  jest równa  $1$ .

a) Podaj równanie osi symetrii wykresu funkcji  $f$ .

b) Oblicz  $a$ ,  $b$ ,  $c$ .

c) Napisz w postaci ogólnej wzór funkcji  $g$ , której wykres otrzymamy, przesuując równolegle wykres funkcji  $f$  o  $3$  jednostki w lewo i  $4$  jednostki do góry.

20. Ojciec i córka mają razem 100 lat. 15 lat temu iloczyn liczby lat córki i ojca był równy 1029. Ile lat ma obecnie ojciec, a ile córka?

21. Suma cyfr liczby trzycyfrowej wynosi 8, zaś suma kwadratów jej cyfr jest równa 30. Jeśli w liczbie zamienimy cyfry skrajne, to otrzymana liczba będzie o 396 większa od początkowej. Wyznacz tę liczbę trzycyfrową.

22. Na spotkaniu towarzyskim każdy uczestnik spotkania przywitał się z każdym z pozostałych uczestników uściskiem dłoni. Ile co najmniej osób brało udział w tym spotkaniu, jeżeli wymieniono więcej niż 45 uścisków dłoni?

23. Długości przekątnych rombu wyrażają się liczbami pierwszymi, różniącymi się o 2. Wiedząc, że pole tego rombu jest mniejsze od  $17\frac{1}{2}$ , oblicz jego obwód.

24. W małym zakładzie krawieckim są szyte koszulki, które sprzedaje się do hurtowni po 86 zł za sztukę. Związek między kosztem produkcji  $K(x)$ , a liczbą  $x$  uszytych koszulek w ciągu dnia wyraża wzór  $K(x) = 4x^2 - 2x + 84$ . Zakład może uszyć dziennie maksymalnie 18 koszulek.

a) Oblicz, ile co najmniej koszulek dziennie powinien szyć ten zakład, aby osiągnąć zysk z ich sprzedaży.

b) Oblicz, ile koszulek dziennie powinien szyć ten zakład, aby jego dzienny zysk był największy. Jaka jest wartość największego dziennego zysku?

25. Druć długości 2 m trzeba podzielić na dwa kawałki: z jednego powstanie ramka kwadratowa, a z drugiego ramka prostokątna, której długości boków pozostają w stosunku 2 : 3. Jaką długość powinien mieć każdy z tych kawałków drutu, aby suma pól kwadratu i prostokąta była najmniejsza?

D 26. Wykaż, że jeśli wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji  $y = -\frac{1}{2}x^2 + 2bx - 8$  znajduje się w układzie współrzędnych pod osią  $OX$ , to  $b \in (-2, 2)$ .

D 27. Wykaż, że jeśli zbiór wartości funkcji kwadratowej  $y = -x^2 + 2kx - 3$  jest przedziałem  $(-\infty, 1)$ , to  $k = -2$  lub  $k = 2$ .

D 28. Wykaż, że jeśli  $a - 2b = 3$ , to  $a^2 + b^2 \geq \frac{9}{5}$ .

D 29. Wykaż, że równanie  $2x^2 - (k + 1)x + 2 = 0$  ma rozwiązanie tylko wtedy, gdy  $k \in (-\infty, -5) \cup (3, +\infty)$ .

D 30. Wykaż, że nierówność  $2x^2 + (k + 3)x + 8 > 0$  jest spełniona przez każdą liczbę rzeczywistą  $x$  tylko wtedy, gdy  $k \in (-11, 5)$ .

# 4. Geometria płaska - okręgi i kąta


## Powtórzenie wiadomości z geometrii z klasy 1.

4.1. Wyznacz miary dwóch kątów przyległych, jeśli jeden z nich jest cztery razy większy od drugiego.


4.2. Punkt  $O$  jest punktem przecięcia dwusiecznych kątów  $CAB$  i  $ABC$  w trójkącie  $ABC$ . Wyznacz miarę kąta wklęsłego  $AOB$ , jeśli:

a)  $|\angle BAC| + |\angle ABC| = 130^\circ$       b)  $|\angle ACB| = 100^\circ$ .



4.3. W trójkącie  $ABC$  poprowadzono dwusieczne kątów przy wierzchołkach  $A$  i  $B$ . Kąt rozwarty przecięcia się tych dwusiecznych jest równy  $137^\circ$ . Oblicz miarę kąta  $ACB$ .



4.4. Na rysunku obok zaznaczone są kąty zewnętrzne trójkąta  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ . Wiedząc że  $\alpha + \gamma = 217^\circ$ , oblicz  $\beta$ .





4.5. Dany jest trójkąt  $ABC$  oraz prosta  $k$ , równoległa do podstawy  $AB$  i przechodząca przez wierzchołek  $C$ . Na podstawie danych na rysunku poniżej, wyznacz kąty trójkąta  $ABC$ .









4.6. Dany jest kąt ostry  $BAC$ ,  $|\angle BAC| = 39^\circ$ , oraz punkt  $P$ , leżący na zewnątrz tego kąta. Z punktu  $P$  poprowadzono dwie proste: jedną równoległą do ramienia  $AB$ , a drugą prostą do ramienia  $AC$ . Oblicz miarę kąta ostrego przecięcia się tych prostych.

D 4.7. Wykaż, że w dowolnym trapezie dwusieczne kątów przy tym samym ramieniu są do siebie prostopadłe.


D 4.8. Korzystając z danych na rysunku poniżej wykaż, że czworokąt  $ABCD$  jest trapezem.



4.9. Na rysunkach poniżej proste  $a$  i  $b$  są równoległe. Oblicz  $x$ .







4.10. Proste  $AB$  i  $A_1B_1$  przecinają się w punkcie  $O$ . Proste te przecięto prostymi równoległymi  $AA_1$ ,  $BB_1$  i  $CC_1$  - jak na rysunku obok.



- Oblicz:
- $|CC_1|$ , jeśli  $|C_1O| = 4$  cm,  $|OA| = 3$  cm,  $|AA_1| = 2$  cm
  - $|OC_1|$ , jeśli  $|OA_1| = 1,8$  dm,  $|AC_1| = 11,2$  dm,  $|OC| = 5,4$  dm
  - $|OB|$ , jeśli  $|CC_1| = 4$  dm,  $|BB_1| = 56$  cm,  $|C_1B| = 12$  dm
  - $|CA_1|$ , jeśli  $|AA_1| = 2$  cm,  $|BB_1| = 5$  cm,  $|A_1B_1| = 4,5$  cm,  $|CC_1| = 4$  cm.

4.11. Czy na rysunku poniżej proste  $a$  i  $b$  są równoległe? Odpowiedź uzasadnij.



4.12. Wyznacz wszystkie liczby  $a$ ,  $a > 0$ , dla których istnieje trójkąt o bokach mających długość:

a)  $a, 4, 8 - a$

b)  $a, a + 3, a + 6$



c)  $2a, 7, 11 - a$

4.13. Dwa boki trójkąta mają długość 4 i 9. Długość  $c$  trzeciego boku wyraża się liczbą pierwszą.

a) Oblicz  $c$ . Podaj wszystkie możliwe rozwiązania.


b) Wykaż, że dla każdej liczby  $c$ , znalezionej w punkcie a) trójkąt jest rozwartokątny.

4.14. Na podstawie danych na rysunku poniżej, oblicz długość podstawy  $AB$  trójkąta  $ABC$ .




4.15. Długości boków trójkąta  $ABC$  pozostają w stosunku 2 : 3 : 4. Środki boków tego trójkąta wyznaczają trójkąt, którego obwód jest równy 13,5 cm. Oblicz długości boków trójkąta  $ABC$ .


4.16. Punkty  $D, E, F$  dzielą bok  $AC$  trójkąta  $ABC$  na cztery odcinki równej długości. Przez punkty  $D, E, F$  poprowadzono odcinki równoległe do boku  $AB$ , których drugi koniec należy do boku  $BC$ . Wiedząc, że najkrótszy z tych odcinków jest krótszy od kolejnego odcinka o 7 cm, oblicz długość boku  $AB$  i długości równoległych odcinków.



4.17. W trójkącie równoramiennym  $ABC$  kąt  $ACB$  jest równy  $68^\circ$ . Na prostej  $AB$  zaznaczono punkty  $D$  i  $E$  w taki sposób, że  $|DA| = |AC|$  oraz  $|BC| = |BE|$ . Oblicz kąty trójkąta  $CDE$ .



4.18. Punkt  $D$  leży na przedłużeniu boku  $AB$  trójkąta  $ABC$  poza punkt  $B$ . Z punktu  $D$  poprowadzono prostą prostopadłą do boku  $AC$ , która przecięła bok  $BC$  w punkcie  $E$ . Wykaż, że jeśli  $|BD| = |BE|$ , to trójkąt  $ABC$  jest równoramienny.



4.19. Wysokość trójkąta równobocznego jest o 2 krótsza od boku.

a) Oblicz długość boku tego trójkąta. Wynik przedstaw w postaci  $a + b\sqrt{c}$ , gdzie  $a, b, c \in \mathbb{N}_+$ .

b) Jaki obwód ma trójkąt, którego wierzchołkami są środki boków danego trójkąta?

4.20. W trójkącie prostokątnym równoramiennym najkrótsza wysokość ma długość 2 cm.

a) Oblicz długości boków tego trójkąta.

b) Punkt  $M$  należy do przeciwprostokątnej tego trójkąta i dzieli ją w stosunku 1 : 3. Oblicz odległości punktu  $M$  od przyprostokątnych.

4.21. Kąty  $\alpha, \beta, \gamma$  trójkąta różnią się kolejno o  $30^\circ$ .

a) Wykaż, że trójkąt jest prostokątny.

b) Oblicz obwód tego trójkąta wiedząc, że różnica długości najdłuższego i najkrótszego boku tego trójkąta jest równa 4 cm. Wynik zaokrąglij do pierwszego miejsca po przecinku.

- 4.22. Boki trójkąta mają długość: 20 cm, 16 cm, 12 cm.
- ▷ a) Wykaż, że trójkąt jest prostokątny.  
b) Oblicz sumę długości wszystkich wysokości tego trójkąta.
- 4.23. Stosunek długości krótszych boków trójkąta prostokątnego jest równy 3 : 4. Wiedząc, że obwód tego trójkąta wynosi 36 cm, oblicz:  
a) długości boków tego trójkąta,  
b) długość środkowej trójkąta, poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego.
- 4.24. Boki trójkąta mają długość 21 cm, 17 cm, 10 cm.  
a) Sprawdź, czy trójkąt jest ostrokątny, prostokątny czy rozwartokątny.  
b) Oblicz długości trzech wysokości tego trójkąta.
- 4.25. W trójkącie  $ABC$  boki mają długość:  $|AB| = 18$  cm,  $|BC| = |AC| = 15$  cm. Oblicz:  
a) wysokość  $CD$  tego trójkąta,  
b) długość środkowej  $AE$ ,  
c) długość odcinka  $DE$ .
- 4.26. Oblicz długości odcinków, na jakie środek ciężkości trójkąta dzieli środkową tego trójkąta poprowadzoną na podstawę, jeśli:  
a) trójkąt jest równoboczny, a jego obwód jest równy 18,  
b) trójkąt jest prostokątny równoramienny, a jego ramiona mają długość 3.
- 4.27. Boki trójkąta mają długość: 9 cm, 12 cm, 15 cm. Oblicz odległość środka ciężkości tego trójkąta:  
a) od dwóch jego krótszych boków,  
b) od wierzchołków tego trójkąta.
- 4.28. Oblicz długości środkowych trójkąta, którego boki mają długość: 16 cm, 17 cm, 17 cm.
- ▷ 4.29. W trójkącie  $ABC$  poprowadzono środkową  $AD$ . Punkt  $E$  jest środkiem odcinka  $AD$ . Półprosta  $CE \rightarrow$  przecina bok  $AB$  w punkcie  $P$ . Wykaż, że  $|PB| = 2|AP|$ .
- ▷ 4.30. W trójkącie  $ABC$  poprowadzono środkową  $AD$ . Wykaż, że jeśli suma miar kątów  $DAC$  i  $ACB$  jest równa mierze kąta  $ADC$ , to trójkąt  $DBP$  jest równoramienny.

- ▷ 4.31. Trójkąt  $ABC$  jest równoboczny, a jego bok ma długość  $a$ ,  $a > 1$ . Punkt  $D$  należy do boku  $AC$  oraz  $|AD| = 1$ . Na przedłużeniu boku  $BC$  poza punkt  $C$  leży punkt  $P$ . Wykaż, że jeśli  $|CP| = 1$ , to trójkąt  $DBP$  jest równoramienny.
- 4.32. Boki trójkąta  $ABC$  mają długość: 8 cm, 10 cm, 12 cm. Trójkąt  $A_1B_1C_1$  jest podobny do trójkąta  $ABC$  w skali  $\frac{1}{3}$ . Oblicz obwód trójkąta  $A_1B_1C_1$ .
- 4.33. Trójkąt  $A_1B_1C_1$  jest podobny do trójkąta  $ABC$  w skali 1,25. O ile procent obwód trójkąta  $ABC$  jest mniejszy od obwodu trójkąta  $A_1B_1C_1$ ?
- 4.34. Boki trójkąta  $ABC$  mają długość:  $|BC| = a$ ,  $|AC| = b$ ,  $|AB| = c$ . Trójkąt  $A_1B_1C_1$  jest podobny do trójkąta  $ABC$ , a jego boki mają odpowiednio długość:  $|B_1C_1| = a + 4$ ,  $|A_1C_1| = b + 6$ ,  $|A_1B_1| = c + 8$ .
- ▷ a) Wykaż, że  $a : b : c = 2 : 3 : 4$ .  
b) Wiedząc dodatkowo, że obwód trójkąta  $ABC$  jest równy 27 cm, oblicz skalę podobieństwa trójkąta  $A_1B_1C_1$  do trójkąta  $ABC$ .
- 4.35. Boki trapezu  $ABCD$ ,  $AB \parallel DC$ , mają długość:  $|AB| = 21$  cm,  $|BC| = 8$  cm,  $|DC| = 14$  cm,  $|AD| = 5$  cm. Proste  $AD$  i  $BC$  przecinają się w punkcie  $P$ . Oblicz obwód trójkąta  $ABP$ .
- 4.36. Podstawy trapezu mają długość 4 cm i 12 cm, a jego przekątne mają długość 10 cm oraz 8 cm. Oblicz długości odcinków, na jakie punkt przecięcia przekątnych dzieli te przekątne.
- 4.37. W trójkącie równoramiennym boki mają długość: 18 cm, 15 cm, 15 cm.  
a) Oblicz odległości środka wysokości poprowadzonej na podstawę od boków tego trójkąta.  
b) Jaka jest odległość spodka tej wysokości od ramion trójkąta?
- 4.38. Najkrótsza wysokość trójkąta prostokątnego jest równa 8 cm, a najdłuższa wynosi  $13\frac{1}{3}$  cm. Oblicz obwód tego trójkąta.
- 4.39. Wysokość trójkąta prostokątnego poprowadzona na przeciwprostokątną dzieli ją na odcinki, których długości pozostają w stosunku 9 : 16. Wiedząc, że obwód trójkąta jest równy 30 cm, oblicz długości przyprostokątnych.

4.40. W trójkącie  $ABC$ , w którym  $\sphericalangle ACB = 90^\circ$  oraz  $|AC| < |BC|$ , zaznaczono środek ciężkości  $S$  i spodek  $D$  wysokości  $CD$ .

- D a) Wykaż, że jeśli  $|AD| = 3$  oraz  $|BD| = 6$ , to odcinek  $DS$  jest równoległy do boku  $AC$ , a jego długość jest równa  $\sqrt{3}$ .  
b) Czy odcinek  $DS$  byłby równoległy do boku  $AC$ , gdyby  $|AD| = 1$  oraz  $|DB| = 4$ ? Odpowiedz uzasadnij.

## Okrąg. Położenie prostej i okręgu

4.41. Naskicuj okrąg i zaznacz na nim punkty  $A$ ,  $B$  i  $C$ .

- a) Ile cięciw i ile łuków wyznaczają te punkty? Wskaż te cięciwy i łuki.  
b) Ile cięciw i ile łuków wyznaczają cztery punkty położone na okręgu?

4.42. W kole poprowadzono średnicę  $AB$  i cięciwę  $AC$ . Wiedząc, że  $BC \perp AC$  i  $|BC| = 7$  cm, oblicz odległość cięciwy  $AC$  od środka koła.

4.43. Odcinek  $AB$  jest cięciwą okręgu o promieniu 25 cm. Wiedząc, że  $|AB| = 48$  cm, oblicz odległość tej cięciwy od środka okręgu.

4.44. Promień okręgu jest równy 17 cm. Oblicz długość cięciwy tego okręgu, która znajduje się w odległości 8 cm od środka okręgu.

4.45. Cięciwa  $CD$  okręgu jest równoległa do średnicy  $AB$ , a odległość między nimi jest równa 5 cm. Wiedząc że różnica długości tych cięciw jest równa 2 cm, oblicz długość tego okręgu.

4.46. Cięciwa  $CD$  okręgu jest prostopadła do średnicy  $AB$  i przecina ją w punkcie  $P$  w stosunku 9 : 1. Wiedząc, że odległość punktu  $P$  od środka okręgu jest równa 4 cm, oblicz:

- a) długość okręgu                      b) długość cięciwy  $CD$ .


4.47. Wyraż w procentach (z dokładnością do 1%), jaką część okręgu stanowi łuk okręgu o promieniu  $r$ , jeśli długość łuku jest równa  $d$ .

- a)  $r = 3$  cm,  $d = \pi$  cm                      b)  $r = 5$  cm,  $d = 20$  cm  
c)  $r = \pi$  cm,  $d = \pi^2$  cm                      d)  $r = 0,25\pi$  dm,  $d = 6$  cm  
e)  $r = \sqrt{3}$  dm,  $d = \sqrt{12}\pi$  dm                      f)  $r = 0,4$  m,  $d = \sqrt{5}\pi$  dm


4.48. Dany jest promień  $r$  okręgu  $o$  i odległość  $d$  środka okręgu  $o$  od prostej  $k$ . Ustal położenie prostej  $k$  oraz okręgu  $o$ .

- a)  $r = 3$ ,  $d = 2\sqrt{3}$                       b)  $r = \pi$ ,  $d = 9^{0,5}$   
c)  $r = 7$ ,  $d = \sqrt{4^2 + 3^2}$                       d)  $r = \log_2 8$ ,  $d = 3$


4.49. Wskaż na rysunku obok trzy pary odcinków równej długości wiedząc, że proste  $AC$ ,  $EC$ ,  $BD$  są styczne do okręgu odpowiednio w punktach  $A$ ,  $E$ ,  $F$ .



4.50. Proste  $AE$ ,  $AD$  i  $BC$  są styczne do okręgu. Wiedząc, że  $|AD| = 17$  cm, oblicz obwód trójkąta  $ABC$ .



4.51. Okrąg na rysunku obok jest styczny do wszystkich boków trójkąta  $ABC$ , w którym  $|AC| = |BC|$ , odpowiednio w punktach  $D$ ,  $E$ ,  $F$ . Wiedząc, że  $|AB| = 15$  cm oraz  $|BC| = 19,5$  cm, oblicz długość odcinka  $FC$ .



4.52. Miara kąta utworzonego przez dwa promienie okręgu jest równa  $\alpha$ . Pod jakim kątem widać ten okrąg z punktu przecięcia stycznych do okręgu, poprowadzonych z końców tych promieni, jeśli:

- a)  $\alpha = 45^\circ$                       b)  $\alpha = 60^\circ$                       c)  $\alpha = 100^\circ$                       d)  $\alpha = 141^\circ$ ?

4.53. Z punktu  $A$  poprowadzono dwie styczne do okręgu o środku  $O$  i promieniu 3 cm. Odcinek  $AO$  ma długość 9 cm i przecina okrąg w punkcie  $P$ . Oblicz odległość punktu  $P$  od tych stycznych.

**4.54.** Z punktu  $A$  poprowadzono dwie styczne do okręgu o środku  $O$  i promieniu  $r$ . Półprosta  $AO$  przecina okrąg w dwóch punktach  $P$  i  $Q$ . Wykaż, że jeśli odległość punktu  $Q$  od poprowadzonych stycznych jest dwa razy większa niż odległość punktu  $P$  od tych stycznych, to  $r = \frac{1}{2}|AP|$ .

**4.55.** Do danego okręgu poprowadzono styczną tak, że końce  $A$ ,  $B$  średnicy tego okręgu są odległe od stycznej o 25 cm i o 15 cm. Oblicz promień tego okręgu.

**4.56.** Dany jest okrąg o promieniu  $r$  i prosta  $k$ , której odległość od środka okręgu jest równa  $d$ . Zbadaj położenie prostej  $k$  i okręgu  $o$  w zależności od  $a$ .

a)  $r = 4$ ,  $d = a - 3$

b)  $r = a$ ,  $d = 8 - a$

c)  $r = -a$ ,  $d = 6 + a$

d)  $r = a - 1$ ,  $d = a + 1$

## Wzajemne położenie dwóch okręgów

**4.57.** Określ wzajemne położenie okręgów  $o(A, r_1)$  i  $o(B, r_2)$ , jeśli  $|AB| = 8$  oraz:

a)  $r_1 = 1$ ,  $r_2 = 9$

b)  $r_1 = 3$ ,  $r_2 = 5$

c)  $r_1 = \sqrt{5}$ ,  $r_2 = 3\sqrt{5}$

d)  $r_1 = 5$ ,  $r_2 = 13$

e)  $r_1 = \sqrt{8}$ ,  $r_2 = 11$

f)  $r_1 = 4 - \sqrt{5}$ ,  $r_2 = 4 + \sqrt{2}$

**4.58.** Dwa okręgi są styczne zewnętrznie. Odległość między ich środkami wynosi 12 cm. Wyznacz promienie tych okręgów, wiedząc, że:

a) jeden z nich jest o 2 cm dłuższy od drugiego,

b) jeden z nich jest trzy razy krótszy od drugiego.

**4.59.** Dwa okręgi są styczne wewnętrznie. Odległość między ich środkami jest równa 3 cm. Wyznacz promienie tych okręgów, jeśli:

a) jeden z nich jest dwa razy krótszy od drugiego,

b) suma długości promieni jest równa 17 cm.

**4.60.** Wyznacz promienie okręgów wiedząc że, gdyby te okręgi były styczne zewnętrznie, to odległość między ich środkami byłaby równa 15 cm; a gdyby te okręgi były styczne wewnętrznie, to odległość między ich środkami byłaby równa 3 cm. Wyznacz promienie tych okręgów.

**4.61.** Trzy okręgi o promieniu  $r$  są styczne zewnętrznie, każdy do dwóch pozostałych. Wyznacz długości boków i miary kątów trójkąta, utworzonego przez punkty styczności.

**4.62.** Dwa okręgi  $o(A, r_1)$  i  $o(B, r_2)$  są styczne zewnętrznie do siebie i oba są styczne wewnętrznie do okręgu  $o(C, r_3)$ . Obwód trójkąta  $ABC$  wynosi 25 cm. Oblicz  $r_3$ .

**4.63.** Dane są dwa okręgi współśrodkowe. Cięciwa większego okręgu jest styczna do mniejszego okręgu, a jej długość jest równa 30 cm. Oblicz promienie tych okręgów wiedząc, że różnią się o 9 cm.

**4.64.** Dane są dwa okręgi  $o(A, r_1)$ ,  $o(B, r_2)$  takie, że:

a)  $r_1 = 2$ ,  $r_2 = 3$ ,  $|AB| = k$

b)  $r_1 = k$ ,  $r_2 = k - 1$ ,  $|AB| = 5$

c)  $r_1 = 3$ ,  $r_2 = 2k$ ,  $|AB| = 4$

d)  $r_1 = 5 - k$ ,  $r_2 = k + 1$ ,  $|AB| = 2$ .

Określ położenie okręgów w zależności od wartości parametru  $k$ .

**4.65.** Dane są dwa okręgi  $o(A, 3)$  oraz  $o(B, m - 4)$ . Odległość między ich środkami jest równa 7. Wyznacz wszystkie wartości  $m$ , dla których te okręgi mają:

a) jeden punkt wspólny


b) dwa punkty wspólne.

**4.66.** Odległość między środkami dwóch okręgów jest równa 9, a promienie tych okręgów są równe:  $5 - a$  oraz  $2a$ . Wyznacz wszystkie wartości  $a$ , dla których oba okręgi mają co najmniej jeden punkt wspólny.


## Koła i kąty


**4.67.** Dany jest okrąg o środku w punkcie  $O$ . Korzystając z danych na rysunku, wyznacz miarę kąta  $\alpha$ .

a)




b)







**4.68.** Dany jest okrąg o środku w punkcie  $O$  i prosta  $k$  styczna do tego okręgu. Korzystając z danych na rysunku, wyznacz miarę kąta  $\alpha$ .



**4.69.** Dany jest okrąg o środku w punkcie  $O$ . Korzystając z danych na rysunku, wyznacz miary kątów trójkąta  $ABC$ .



**4.70.** Dany jest okrąg o środku w punkcie  $O$ . Korzystając z danych na rysunku, oblicz  $\alpha$ .



**4.71.** Oblicz miarę kąta środkowego, opartego na łuku okręgu o promieniu  $r$ , jeśli długość tego łuku jest równa  $d$ .


- a)  $r = 2, d = \pi$       b)  $r = 3, d = 2\pi$       c)  $r = 4, d = 5\pi$   
 d)  $r = 5, d = 3\pi$       e)  $r = 6, d = 6$       f)  $r = 8, d = 40$

**4.72.** Dany jest okrąg o środku w punkcie  $O$  i promieniu  $r$ . Oblicz długość łuku, na którym jest oparty kąt środkowy  $\alpha$  w tym okręgu, jeśli:

- a)  $r = 15, \alpha = 72^\circ$       b)  $r = 10, \alpha = 216^\circ$       c)  $r = 4, \alpha = 135^\circ$   
 d)  $r = 28, \alpha = 30^\circ$       e)  $r = 13, \alpha = 270^\circ$

**4.73.** Punkty  $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7, P_8, P_9$  należą do okręgu i dzielą okrąg w danej kolejności na dziewięć łuków równej długości. Oblicz:

- a)  $|\angle P_6 P_3 P_5|$       b)  $|\angle P_8 P_5 P_3|$   
 c)  $|\angle P_7 P_9 P_1|$       d)  $|\angle P_2 P_3 P_4|$



**4.74.** W okręgu o promieniu  $r$  kreślimy średnicę  $AB$  oraz taką cięciwę  $AC$ , że  $|AC| = r$ . Jaką częścią okręgu jest łuk  $CAB$ ?

Wiedząc, że kąty trójkąta  $ABC$  są równe:

4.75. Punkty  $A, B, C$  należą do okręgu. Wiedząc, że kąty trójkąta  $ABC$  są równe:  $|\sphericalangle A| = 30^\circ$ ,  $|\sphericalangle B| = 45^\circ$ ,  $|\sphericalangle C| = 105^\circ$ , oblicz stosunek długości łuków, na jakie punkty  $A, B, C$  podzieliły okrąg.

4.76. Punkty  $A, B, C$  dzielą okrąg na trzy łuki, których stosunek długości wynosi  $5 : 6 : 7$ . Oblicz miary kątów trójkąta  $ABC$ .


4.77. Cięciwy  $AB$  i  $CD$  są różnymi średnicami jednego okręgu. Wykaż, że czworokąt  $ABCD$  jest prostokątem.

4.78. Wewnątrz równoległoboku narysowano dwa półokręgi: średnicą jednego jest krótszy bok, a średnicą drugiego – dłuższy bok równoległoboku. Wykaż, że punkt przecięcia tych półokręgów różny od wierzchołka równoległoboku należy do jednej z przekątnych tego równoległoboku.

4.79. Dwa okręgi przecinają się w punktach  $P$  i  $Q$ . Poprowadzono średnicę  $PA$  w pierwszym okręgu oraz średnicę  $PB$  w drugim okręgu. Wykaż, że punkty  $A, Q, B$  są współliniowe.


4.80. Cięciwa  $CD$  okręgu jest równoległa do średnicy  $AB$ . Wykaż, że różnica miar kątów  $ACD$  i  $CDA$  jest równa  $90^\circ$ .

4.81. Na rysunku obok dany jest okrąg o środku w punkcie  $O$  oraz kąty środkowe:  $\alpha$  i  $\beta$ . Wykaż, że jeśli  $\alpha = 80^\circ$  i  $\beta = 50^\circ$ , to  $OC \parallel AB$ .



## Twierdzenie o stycznej i siecznej

4.82. Z punktu  $P$  poprowadzono styczną do okręgu w punkcie  $A$  oraz sieczną, przecinającą okrąg w punktach  $B$  i  $C$ , jak na rysunku obok. Wiedząc, że  $|PB| = 1$  cm oraz  $|BC| = 8$  cm, oblicz  $|PA|$ .



4.83. Przez punkt  $P$  poprowadzono styczną do okręgu w punkcie  $A$  i sieczną, przecinającą ten okrąg kolejno w punktach  $B$  i  $C$ . Wiedząc, że  $|PA| = 8$  cm oraz  $|PB| = 4$  cm, oblicz długość cięciwy  $BC$ .

4.84. Przez punkt  $P$  leżący w odległości 11 cm od środka okręgu, poprowadzono sieczną, która przecięła ten okrąg kolejno w punktach  $A$  i  $B$ . Wiedząc, że  $|PA| = |AB| = 6$  cm, oblicz promień tego okręgu.

4.85. W okręgu poprowadzono dwie cięciwy  $AB$  i  $CD$ , które przecięły się w punkcie  $P$ . Wiedząc, że  $|AP| = 10$  cm,  $|BP| = 4$  cm oraz  $|PD| = 2,5$  cm, oblicz  $|CP|$ .

4.86. Punkt  $P$  przecięcia cięciw  $AB$  i  $CD$  okręgu dzieli cięciwę  $AB$  na odcinki długości 8 cm i 3 cm. Wiedząc, że  $|CP| : |PD| = 3 : 2$ , oblicz długość cięciwy  $CD$ .


4.87. Z punktu  $P$  poprowadzono styczną do okręgu w punkcie  $A$  i dwie sieczne: jedna zawiera średnicę okręgu i przecina okrąg kolejno w punktach  $B$  i  $C$ ; druga przecina okrąg kolejno w punktach  $D$  i  $E$ . Wiedząc, że  $|AP| = 24$ ,  $|PB| = 18$  oraz  $|PD| : |DE| = 3 : 1$ , oblicz:

- promień okręgu,
- długość odcinka  $PE$ .

4.88. Punkty  $A, B, C$  należą do okręgu. Styczna do okręgu w punkcie  $A$  przecina półprostą  $CB^{\rightarrow}$  w punkcie  $P$ . Wykaż, że jeśli  $|PB| : |BC| = 1 : 3$ , to  $|PA| : |PC| = 1 : 2$ .


4.89. Punkty  $A, B, C$  należą do okręgu. Styczna do okręgu w punkcie  $A$  przecina półprostą  $CB^{\rightarrow}$  w punkcie  $P$ . Wykaż, że jeśli  $|PA| : |PC| = 3 : 5$ , to  $|PB| : |BC| = 9 : 16$ .

4.90. Na rysunku obok punkty  $A, B, C$  należą do okręgu oraz  $|AB| = |AC|$ . Średnica  $AD$  zawiera wysokość  $AE$  trójkąta  $ABC$ . Wiedząc, że  $|AE| = 12$  cm oraz  $|ED| = 3$  cm, oblicz długości boków tego trójkąta.



4.91. Na rysunku obok boki  $AB$  i  $BC$  trójkąta  $ABC$  są styczne do okręgu o środku w punkcie  $O$ , odpowiednio w punktach  $D$  i  $E$ . Odległość punktu  $C$  od punktu  $O$  jest równa 5. Okrąg przecina bok  $AC$  kolejno w punktach  $P$  i  $Q$ . Wiedząc, że  $|PQ| = |PC| = 2\sqrt{2}$ , oblicz:

- promień okręgu,
- długości odcinków, na jakie punkt  $E$  dzieli bok  $BC$ .



## Symetralne boków trójkąta. Okrąg opisany na trójkącie

**4.92.** W trójkącie  $ABC$ , w którym  $|AC| > |BC|$ , spodek wysokości dzieli bok  $AB$  na odcinki  $AD$  i  $DB$  w taki sposób, że  $|AD| : |DB| = 3 : 1$ . Symetralna boku  $AB$  przecina bok  $AB$  w punkcie  $E$ , a bok  $AC$  w punkcie  $F$ . Wiedząc, że  $|EF| = 2,1$  cm, oblicz  $|CD|$ .

**4.93.** W trójkącie  $ABC$  bok  $AB$  ma długość 16 cm. Punkt  $D$  jest spodkiem wysokości poprowadzonej z wierzchołka  $C$ . Symetralna boku  $AB$  przecina bok  $CB$  w punkcie  $P$  w taki sposób, że  $|CP| : |PB| = 1 : 2$ . Wiedząc, że odcinek tej symetralnej zawarty w trójkącie ma długość 6 cm, oblicz:

- wysokość  $CD$ ,
- obwód trójkąta  $ABC$ ,
- odległość punktu  $D$  od wierzchołka  $B$ ,
- odległość punktu  $D$  od boku  $AC$ .

**4.94.** Symetralne boków trójkąta prostokątnego przecinają się w punkcie odległym od wierzchołka kąta prostego o 5 cm. Wiedząc, że długości przyprostokątnych pozostają w stosunku 3 : 4, oblicz obwód tego trójkąta.

**4.95.** W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długość 2 cm i 6 cm. Oblicz stosunek długości odcinków, na jakie symetralna przeciwprostokątnej dzieli dłuższą przyprostokątną.

**4.96.** W trójkącie prostokątnym  $ABC$ , w którym  $|\sphericalangle CAB| = 90^\circ$ , symetralna boku  $AB$  przecina ten bok w punkcie  $D$ , zaś bok  $BC$  w punkcie  $E$ . Wiedząc, że  $|AB| = 42$  cm oraz  $|DE| = 28$  cm, oblicz obwód trójkąta  $ABC$ .

**4.97.** W trójkącie równoramiennym  $ABC$  kąt przy wierzchołku  $C$  jest równy  $120^\circ$ . Symetralne boków trójkąta przecinają się w punkcie  $P$ . Wiedząc, że  $|CP| = 4$  cm, oblicz długości boków trójkąta  $ABC$ .

**D 4.98.** Na trójkącie ostrokątnym  $ABC$  opisano okrąg o środku  $S$ . Wykaż, że:

- jeśli punkt  $S$  należy do jednej z wysokości trójkąta, to ten trójkąt jest równoramienny,
- jeśli punkt  $S$  dzieli wysokość trójkąta w stosunku 2 : 1, licząc od wierzchołka trójkąta, to ten trójkąt jest równoboczny.

**4.99.** Dane są długości boków  $a, b, c$  trójkąta. Jak jest położony względem tego trójkąta środek okręgu opisanego na tym trójkącie, jeśli:

- $a = 13, b = 12, c = 5$
- $a = 6, b = 24, c = 25$
- $a = 5, b = 6, c = 8$
- $a = 5, b = 6, c = 7?$

**4.100.** Oblicz promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym, którego boki mają długość 6 cm.

**4.101.** Wysokość trójkąta równobocznego jest o 3 cm dłuższa od promienia okręgu opisanego na tym trójkącie. Oblicz długość boku trójkąta.

**4.102.** Oblicz promień okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym, którego przyprostokątne mają długość:

- 2 cm i 2 cm
- 24 cm i 7 cm
- 60 cm i 11 cm.

**4.103.** Promień okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym jest równy 6 cm. Oblicz odległość środka ciężkości tego trójkąta od wierzchołka kąta prostego.

**4.104.** W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych ma długość 65 cm, a wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta prostego jest równa 60 cm. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

**4.105.** W trójkącie prostokątnym wysokość poprowadzona na przeciwprostokątną jest równa 4 cm. Spodek tej wysokości leży w odległości  $1\frac{1}{6}$  cm od środka przeciwprostokątnej. Oblicz:

- promień okręgu opisanego na tym trójkącie,
- długości boków tego trójkąta.

**4.106.** Na trójkącie prostokątnym opisano okrąg o promieniu 10 cm. Wiedząc, że wysokość tego trójkąta poprowadzona na przeciwprostokątną jest równa 8, oblicz długości boków tego trójkąta.

**4.107.** W pewnym trójkącie kąt przy wierzchołku  $A$  jest dwa razy większy od kąta przy wierzchołku  $B$ . Wyznacz stosunek długości boków tego trójkąta, jeśli środek okręgu opisanego na trójkącie  $ABC$ :

- należy do boku  $AB$
- należy do boku  $BC$ .

**4.108.** Na trójkącie prostokątnym opisano okrąg o środku w punkcie  $O$ . Przeciwprostokątna tego trójkąta ma długość  $c$ ,  $c > 0$ .

- D** a) Wykaż, że odległość punktu  $O$  od punktu  $S$ , będącego środkiem ciężkości tego trójkąta, jest równa  $\frac{c}{6}$ .
- b) Wyznacz promień tego okręgu wiedząc, że odcinek  $OS$  jest o 10 cm krótszy od przeciwprostokątnej.

**4.109.** W trójkącie równoramiennym  $ABC$  podstawa  $AB$  ma długość 18 cm, a ramiona  $BC$  i  $AC$  – 15 cm. Sprawdź, czy trójkąt jest ostrokątny, czy rozwartokątny. Oblicz wysokość  $CD$  tego trójkąta. Następnie wyznacz promień okręgu opisanego na tym trójkącie na dwa sposoby:

- a) korzystając tylko z twierdzenia Pitagorasa,  
b) korzystając z podobieństwa odpowiednich trójkątów prostokątnych.

**4.110.** W trójkącie równoramiennym  $ABC$  podstawa  $AB$  ma długość 16 cm, a ramiona  $BC$  i  $AC$  – 10 cm. Sprawdź, czy trójkąt jest ostrokątny, czy rozwartokątny. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie na dwa sposoby, jak w zadaniu 4.129.

**4.111.** Dane są długości boków trójkąta równoramiennego. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

- a) 25 cm, 25 cm, 14 cm                      b) 61 cm, 61 cm, 120 cm

**4.112.** W trójkącie ostrokątnym  $ABC$  boki  $AC$  i  $BC$  są równe i mają długość  $4\sqrt{5}$ . Wiedząc, że promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 5, oblicz  $|AB|$ .

**4.113.** Symetralne boków trójkąta równoramiennego przecinają się w odległości 12,5 cm od wierzchołka przy podstawie i w odległości 10 cm od ramion trójkąta. Oblicz długości boków tego trójkąta.

### Dwusieczne kątów trójkąta. Okrąg wpisany w trójkąt

**4.114.** W trójkącie równoramiennym  $ABC$ ,  $|AC| = |BC|$ , dwusieczna kąta  $BAC$  tworzy z bokiem  $BC$  kąt  $120^\circ$ . Wyznacz kąty trójkąta  $ABC$ . Rozważ dwa przypadki.

**4.115.** W trójkącie  $ABC$  odcinek  $AD$  dwusiecznej kąta  $BAC$  ma długość taką, jak bok  $AB$ . Wiedząc, że  $|\sphericalangle BAC| = 108^\circ$ , oblicz miary pozostałych kątów trójkąta  $ABC$ .

**4.116.** W trójkącie kąty są równe:  $20^\circ$ ,  $60^\circ$ ,  $100^\circ$ . Poprowadzono dwusieczne kątów tego trójkąta. Oblicz miary kątów powstałych w ten sposób sześciu trójkątów.

**4.117.** W trójkąt równoramienny  $ABC$  wpisano okrąg o środku  $O$ . Wiedząc, że  $|\sphericalangle AOB| = 130^\circ$ , oblicz miary kątów tego trójkąta.

**4.118.** Kąty trójkąta  $ABC$  są równe:  $50^\circ$ ,  $60^\circ$ ,  $70^\circ$ . W trójkąt  $ABC$  wpisano okrąg. Punkty styczności wyznaczają wierzchołki trójkąta  $KLM$ . Wyznacz kąty trójkąta  $KLM$ .

**4.119.** Kąty trójkąta  $ABC$  są równe:  $50^\circ$ ,  $60^\circ$ ,  $70^\circ$ . Na trójkącie  $ABC$  opisano okrąg. Przez punkty  $A$ ,  $B$ ,  $C$  poprowadzono styczne do okręgu, które przecięły się kolejno w punktach  $K$ ,  $L$ ,  $M$ . Wyznacz kąty trójkąta  $KLM$ .

**4.120.** W trójkąt  $ABC$  wpisano okrąg. Punkty  $D$ ,  $E$ ,  $F$  są punktami styczności tego okręgu odpowiednio z bokami  $AB$ ,  $BC$  i  $AC$ . Wiedząc, że  $|AD| = 5$  cm,  $|DB| = 4$  cm oraz  $|FC| = 3$  cm, oblicz obwód trójkąta  $ABC$ .

**4.121.** W trójkąt równoramienny  $ABC$  wpisano okrąg. Wiedząc, że  $|AC| = |BC| = 16$  cm oraz  $|AB| = 12$  cm, oblicz długości odcinków, na jakie punkt styczności podzielił bok  $AC$ .

**4.122.** Wyznacz promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny, jeśli:  
a) boki trójkąta mają długość 10 cm,

b) wysokości trójkąta przecinają się w punkcie, którego odległość od wierzchołków jest równa 5 cm.

**4.123.** Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym jest o 4 cm dłuższy od promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt. Oblicz obwód tego trójkąta.

**4.124.** Wyznacz promień  $r$  okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny równoramienny, jeśli:

- a) promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 3,  
b) różnica długości przyprostokątnej i  $r$  jest równa  $1 + \sqrt{2}$ .

**4.125.** W trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 3 cm i 4 cm wpisano okrąg. Oblicz długości odcinków, na jakie punkty styczności podzieliły boki tego trójkąta.

- 4.126. Oblicz promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny, którego przyprostokątne mają długość:
- a) 6 cm i 8 cm  
b) 8 cm i 15 cm  
c) 12 cm i 5 cm  
d)  $2\sqrt{5}$  cm i 4 cm.
- 4.127. Oblicz promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny równoramienny, jeśli:
- a) przeciwprostokątna tego trójkąta jest równa 4 cm,  
b) odległość środka okręgu od wierzchołka kąta prostego jest o 1 cm dłuższa od tego promienia.
- ▮ 4.128. Wykaż, że suma promienia okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym i promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równa średniej arytmetycznej długości przyprostokątnych tego trójkąta.
- 4.129. Oblicz promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny wiedząc, że obwód tego trójkąta wynosi 30 cm, a promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 6,5 cm.
- 4.130. Obwód trójkąta prostokątnego jest równy 56 cm. Na trójkącie opisano okrąg i w trójkąt wpisano okrąg. Oblicz promienie tych okręgów wiedząc, że ich różnica wynosi 9,5 cm.
- 4.131. Dane są długości boków trójkąta równoramiennego. Wyznacz wysokość tego trójkąta poprowadzoną na podstawę. Następnie oblicz promień okręgu wpisanego w ten trójkąt, korzystając z twierdzenia o odcinkach stycznych i z twierdzenia Pitagorasa.
- a) 5 cm, 5 cm, 6 cm  
b) 13 cm, 13 cm, 24 cm
- 4.132. Dane są długości boków trójkąta równoramiennego. Wyznacz wysokość tego trójkąta poprowadzoną na podstawę. Następnie oblicz promień okręgu wpisanego w ten trójkąt, korzystając z podobieństwa odpowiednich trójkątów.
- a) 5 cm, 5 cm, 8 cm  
b) 25 cm, 25 cm, 14 cm
- 4.133. W trójkącie równoramiennym  $ABC$ , w którym  $|AC| = |BC|$ , wysokość  $CD$  jest równa 18 cm. Wiedząc, że promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy 8 cm, oblicz długości boków tego trójkąta.
- 4.134. Podstawa  $AB$  trójkąta równoramiennego  $ABC$  ma długość 12 cm. Promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy 3 cm. Oblicz długość ramienia tego trójkąta.

- 4.135. Boki trójkąta mają długość 4 cm, 5 cm, 6 cm. Oblicz długości odcinków, na jakie dwusieczna największego kąta trójkąta dzieli bok, leżący naprzeciw tego kąta.
- 4.136. Różnica długości dwóch boków trójkąta jest równa 6 cm. Dwusieczna kąta leżącego między tymi bokami przecina trzeci bok trójkąta w stosunku 3 : 1. Oblicz długości tych dwóch boków.
- 4.137. W trójkącie równoramiennym poprowadzono dwusieczną kąta przy podstawie, która podzieliła ramię na dwa odcinki mające długość: 4 cm i 6 cm. Oblicz długość podstawy tego trójkąta. Rozważ dwa przypadki.
- 4.138. W trójkącie równoramiennym  $ABC$ , w którym  $|AC| = |BC|$ , poprowadzono dwusieczną kąta  $BAC$ , która przecięła bok  $BC$  w punkcie  $D$  oraz  $|CD| = 4\frac{4}{7}$  i  $|BD| = 3\frac{3}{7}$ .
- a) Oblicz długość podstawy  $AB$ .  
b) Wiedząc dodatkowo, że odcinek  $DE$  jest wysokością trójkąta  $ABD$ , oblicz  $|AE|$  i  $|BE|$ .
- 4.139. W trójkącie równoramiennym boki mają długość 12 cm, 10 cm, 10 cm. W trójkąt wpisano okrąg. Oblicz długości odcinków:
- a) na jakie punkt styczności okręgu z ramieniem dzieli to ramię,  
b) na jakie dwusieczna kąta przy podstawie dzieli przeciwległe temu kątowi ramię.
- 4.140. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długość: 12 cm i 9 cm. W trójkąt wpisano okrąg. Oblicz długości odcinków:
- a) na jakie dwusieczna kąta prostego dzieli przeciwprostokątną,  
b) na jakie punkt styczności okręgu z przeciwprostokątną dzieli tę przeciwprostokątną.
- 4.141. W trójkącie prostokątnym  $ABC$  kąty ostre są równe:  $|\sphericalangle B| = 30^\circ$   $|\sphericalangle C| = 60^\circ$ . Dwusieczna kąta  $ACB$  przecina bok  $AB$  w punkcie  $D$ . Wiedząc, że  $|AC| = 3$ , oblicz:
- a) długość odcinka  $CD$ ,  
b) promień okręgu opisanego na tym trójkącie,  
c) promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.
- 4.142. Boki trójkąta mają długość: 15, 20, 25. Oblicz długość odcinka dwusiecznej tego trójkąta poprowadzonej z wierzchołka:
- a) największego kąta  
b) najmniejszego kąta.

4.143. W trójkącie prostokątnym dwusieczna kąta prostego podzieliła przeciwprostokątną na odcinki długości 3 cm i 4 cm. Oblicz:

- a) długości przyprostokątnych tego trójkąta,  
b) długość odcinka tej dwusiecznej, zawartego w trójkącie.


4.144. W trójkącie równoramiennym  $ABC$  podstawa  $AB$  ma długość 12. Dwusieczna na kąt  $BAC$  przecina bok  $BC$  w punkcie  $D$ , którego odległość od podstawy  $AB$  jest równa  $4\frac{4}{11}$ . Wiedząc, że promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy 3, oblicz:

- a) długość odcinka  $AD$   
b) wysokość  $CE$ .

### Test sprawdzający do rozdziału 4.

1. W trójkącie  $ABC$  na rysunku obok kąt przy wierzchołku  $A$  jest równy  $60^\circ$ . Dwusieczna kąta  $ACB$  przecina bok  $AB$  w punkcie  $D$ . Jeżeli  $|CD| = |DB|$ , to kąt  $ACB$  ma miarę:

- A.  $90^\circ$       B.  $80^\circ$   
C.  $70^\circ$       D.  $60^\circ$




2. Kąt środkowy ma miarę  $72^\circ$  i jest oparty na łuku okręgu, mającym długość  $4\pi$ . Promień tego okręgu jest równy:

- A. 2      B. 4      C. 5      D. 10

3. Na rysunku obok dany jest okrąg o środku  $O$ , dwa kąty środkowe i kąt wpisany  $\alpha$ . Wówczas:

- A.  $\alpha = 110^\circ$       B.  $\alpha = 120^\circ$   
C.  $\alpha = 125^\circ$       D.  $\alpha = 130^\circ$




4. Średnica  $AB$  okręgu ma długość 2. Jeśli długość cięciwy  $BC$  jest równa 1, to:

- A.  $|AC| = 2$       B.  $|AC| = \sqrt{3}$       C.  $|AC| = \sqrt{2}$       D.  $|AC| = 1$

5. Dwa okręgi o promieniach  $R$  i  $r$  są współśrodkowe,  $R > r$ . Cięciwa  $AB$  większego okręgu jest styczna do mniejszego okręgu. Jeśli  $R^2 - r^2 = 9$ , to:

- A.  $|AB| = 6$       B.  $|AB| = 9$   
C.  $|AB| = 12$       D.  $|AB| = 18$




6. Odległość między środkami dwóch okręgów jest równa 6. Jeśli promienie tych okręgów są równe  $\pi$  oraz  $2\pi$ , to okręgi te:

- A. są rozłączne wewnętrznie      B. są styczne wewnętrznie  
C. są rozłączne zewnętrznie      D. się przecinają

7. Na rysunku obok dany jest okrąg o środku  $O$  i kąt  $\alpha$  dopisany do okręgu. Z danych na rysunku wynika, że:

- A.  $\alpha = 50^\circ$       B.  $\alpha = 55^\circ$   
C.  $\alpha = 60^\circ$       D.  $\alpha = 65^\circ$



8. Bok trójkąta równobocznego ma długość  $a$ , zaś promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy  $R$ . Wówczas:


- A.  $a = 2R$       B.  $a = R\sqrt{3}$       C.  $a\sqrt{3} = 4R$       D.  $a\sqrt{3} = 2R$

9. Boki trójkąta mają długość: 6 cm, 8 cm, 10 cm. Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy:

- A. 2 cm      B. 3 cm      C. 4 cm      D. 5 cm

10. Na rysunku obok trójkąty  $ABC$  i  $ADC$  są wpisane w okrąg o środku w punkcie  $O$ . Odcinek  $CD$  jest średnicą okręgu. Jeśli  $|AC| = 2$  oraz  $|\sphericalangle ABC| = 45^\circ$ , to średnica tego okręgu ma długość:

- A.  $\sqrt{2}$       B. 2  
C.  $2\sqrt{2}$       D. 4



11. Bok  $AB$  trójkąta  $ABC$  ma długość 24 cm. Punkt przecięcia symetralnych boków  $BC$  i  $AC$  leży w odległości 5 cm od boku  $AB$ . Zatem promień okręgu opisanego na trójkącie  $ABC$  jest równy:

- A. 13 cm      B. 12 cm      C. 11 cm      D. 10 cm

12. W okręgu poprowadzono dwie cięciwy. Punkt przecięcia tych cięciw dzieli jedną z nich na odcinki długości 8 cm i 2 cm, a drugą na odcinki równej długości. Długość drugiej cięciwy jest równa:

- A. 6 cm      B. 8 cm      C. 10 cm      D. 12 cm

13. W trójkącie równoramiennym  $ABC$  podstawa  $AB$  ma długość 2 cm. W trójkąt wpisano okrąg. Punkt  $D$  jest punktem styczności tego okręgu z ramieniem  $AC$ . Jeśli  $|AD| : |DC| = 2 : 3$ , to obwód trójkąta  $ABC$  jest równy:


- A. 12 cm      B. 9 cm      C. 8 cm      D. 7 cm

14. W trójkącie  $ABC$ , w którym  $|AC| = |BC| = 36$  cm, poprowadzono dwusieczną kąta  $CBA$ , która przecięła ramię  $AC$  w punkcie  $D$ . Jeśli  $|CD| : |AD| = 4 : 5$ , to:  
A.  $|AB| = 28,8$  cm    B.  $|AB| = 40$  cm    C.  $|AB| = 45$  cm    D.  $|AB| = 54$  cm



15. Promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny jest równy 3 cm, a promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 8,5 cm. Suma długości przyprostokątnych tego trójkąta wynosi:  
A. 17,5 cm    B. 20 cm    C. 23 cm    D. 26 cm

## Zadania powtórzeniowe do rozdziału 4.

16. Na rysunku obok proste  $AB$ ,  $BC$ ,  $CA$  są stycznymi do danego okręgu odpowiednio w punktach  $L$ ,  $M$ ,  $K$ , przy czym  $|CM| = x$ ,  $|MB| = y$ ,  $|KA| = z$ . Wiadomo, że  $x + y + z = 10$  cm oraz  $3x = 2(y + z)$ .  
Oblicz długość boku  $AB$ .




17. Dany jest okrąg o środku w punkcie  $O$  i styczna do tego okręgu w punkcie  $P$ . Korzystając z danych na rysunku, oblicz  $\alpha$ .




18. Punkty  $A$ ,  $B$ ,  $C$  należą do okręgu oraz  $|\angle CBA| = |\angle ACB|$ . Przez punkty  $B$  i  $C$  poprowadzono styczne do okręgu, które przecięły się w punkcie  $D$ . Wiedząc, że  $2|\angle CDB| = |\angle CBA|$ , oblicz miarę kąta między ramionami trójkąta  $ABC$ .

19. Na rysunku obok punkty  $A$ ,  $B$ ,  $C$  należą do okręgu o środku w punkcie  $O$  oraz dane są kąty środkowe  $\alpha$  i  $\beta$ .



- D a) Wykaż, że jeśli  $\alpha = 54^\circ$  i  $\beta = 72^\circ$ , to  $OA \parallel BC$ .  
b) Oblicz miary kątów trójkąta  $ABC$  w przypadku, gdy  $\alpha = 50^\circ$ ,  $\beta = 78^\circ$ .

D 20. Punkty  $A$ ,  $B$ ,  $D$  należą do okręgu o środku w punkcie  $O$ . Sieczna  $AB$  i  $DO$  przecinają się w punkcie  $C$ , jak na rysunku obok. Wykaż, że jeśli  $|BC| = |BO|$ , to  $|\angle DOA| = 3|\angle COB|$ .



21. Dwa okręgi  $o(O_1, r)$  i  $o(O_2, R)$ , gdzie  $r < R$ , są styczne wewnętrznie w punkcie  $A$  oraz  $|O_1O_2| = 4$  cm.


- a) Wyznacz promienie tych okręgów wiedząc, że ich suma jest równa 10 cm.  
D b) Przez punkt  $A$  poprowadzono prostą, która przecięła mniejszy okrąg w punkcie  $B$ , a większy w punkcie  $C$ . Wykaż, że  $O_1B \parallel O_2C$ . Wiedząc dodatkowo, że  $|BC| = 6$  cm, oblicz  $|AB|$ .

22. Promienie dwóch okręgów są równe:  $r_1 = 2m - 1$  oraz  $r_2 = 3m$ . Odległość między środkami tych okręgów jest równa 14.

- a) Wyznacz liczbę  $m$ , dla której te okręgi mają jeden punkt wspólny. Dla wyznaczonej liczby  $m$  podaj promienie tych okręgów.  
b) Dla jakich wartości  $m$  okręgi te mają dwa punkty wspólne?

23. Z punktu  $P$ , którego odległość od środka  $O$  okręgu jest równa 15 cm, poprowadzono sieczną, przecinającą okrąg w punktach  $A$  i  $B$ . Wiedząc, że promień okręgu jest równy 9 cm oraz  $|PA| : |AB| = 1 : 3$ , oblicz długość cięciwy  $AB$ .

D 24. W trójkącie prostokątnym  $ABC$  na rysunku obok punkt  $O$  jest środkiem dłuższej przyprostokątnej  $AB$ . Półokrąg o średnicy  $AB$  przecina przeciwprostokątną  $BC$  w punkcie  $D$ . Wykaż, że jeśli  $|AD| = |DO|$ , to:



- a)  $|AC| = 2|CD|$   
b)  $4 \cdot |CD| \cdot |DB| = 3 \cdot |AC|^2$

25. W trójkącie  $ABC$ , w którym  $|AC| < |BC|$ , wysokość  $CD$  jest równa  $4,5$  cm. Symetralna boku  $AB$  przecina bok  $AB$  w punkcie  $E$ , a bok  $BC$  w punkcie  $F$ . Wiedząc, że  $|EF| = 3$  cm, oblicz  $|AD| : |DB|$ .

26. W trójkącie prostokątnym  $ABC$  przyprostokątne mają długość:  $|AB| = 8$  cm,  $|AC| = 6$  cm. Oblicz:

- długość odcinka  $DE$  symetralnej boku  $BC$ , zawartej w trójkącie  $ABC$ ,
- długość odcinka  $CF$  dwusiecznej kąta  $ACB$ .

27. W trójkąt  $ABC$  wpisano okrąg. Wiedząc, że  $|AB| = 20$  cm,  $|AC| = 16$  cm oraz  $|BC| = 12$  cm, oblicz długości odcinków:

- na jakie punkty styczności podzieliły bok  $AB$ ,
- na jakie dwusieczna kąta  $ACB$  podzieliła bok  $AB$ .

28. W trójkącie równoramiennym poprowadzono dwusieczną kąta przy podstawie, która podzieliła przeciwległe ramię na odcinki długości:  $7\frac{8}{23}$  oraz  $5\frac{15}{23}$  – kolejno od wierzchołka między ramionami trójkąta. Oblicz:

- długość podstawy,
- promień okręgu opisanego na tym trójkącie,
- promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.

29. W trójkącie prostokątnym spodek najkrótszej wysokości dzieli przeciwprostokątną w stosunku  $9 : 16$ . Wiedząc, że promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy  $25$  cm, oblicz:

- długości boków tego trójkąta,
- promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.


30. W trójkącie prostokątnym najkrótsza wysokość jest równa  $15$ , a najkrótszy bok ma długość  $17$ . Oblicz:

- długości pozostałych boków trójkąta,
- promień okręgu opisanego na tym trójkącie,
- promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.

## 5. Trygonometria

### Trygonometria kąta ostrego – powtórzenie wiadomości z klasy 1.

5.1. Oblicz obwód trójkąta  $ABC$  na rysunku poniżej z dokładnością do  $0,5$  cm:



5.2. Średnica  $AB$  okręgu ma długość  $10$  cm. Cięciwa  $CD$ , prostopadła do średnicy  $AB$ , jest oddalona od punktu  $A$  o  $9$  cm. Oblicz:

- tangens kąta  $CBA$
- sinus kąta  $CAB$ .

5.3. Oblicz:

- $(\cos 30^\circ - \sin 45^\circ)(\sin 60^\circ + \cos 45^\circ)$
- $(3\operatorname{tg} 30^\circ - \operatorname{ctg} 45^\circ)^2 - 8 \cdot \sin 30^\circ$
- $(\sqrt{2} \cdot \operatorname{ctg} 60^\circ + \sqrt{3} \cdot \cos 45^\circ)(6 \cdot \operatorname{tg} 45^\circ - \sqrt{72} \cdot \operatorname{tg} 60^\circ)$ .

5.4. W prostokącie  $ABCD$  przekątne mają długość  $4$  cm i przecinają się pod kątem:

- $60^\circ$
- $45^\circ$
- $30^\circ$ .

Oblicz odległość punktu  $B$  od przekątnej  $AC$ .

5.5. Wyznacz kąt  $\alpha$ ,  $\alpha \in (0^\circ, 90^\circ)$ , wiedząc, że:

a)  $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{3}$       b)  $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$       c)  $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$       d)  $\operatorname{ctg} \alpha = 1$ .

5.6. W trójkącie  $ABC$  kąty przy podstawie  $AB$  są ostre. Poprowadzono wysokość  $CD$ . Wyznacz kąty trójkąta  $ABC$ , jeśli:

a)  $|AC| = 10$ ,  $|CD| = 5\sqrt{2}$ ,  $|BC| = 10\sqrt{2}$   
 b)  $|AD| = 2$ ,  $|DB| = 6$ ,  $|BC| = \sqrt{48}$ .

5.7. Skonstruuj trójkąt prostokątny, w którym:

a)  $|\sphericalangle A| = 90^\circ$ ,  $\sin |\sphericalangle B| = \frac{1}{3}$       b)  $|\sphericalangle C| = 90^\circ$ ,  $\cos |\sphericalangle A| = \frac{3}{4}$


5.8. Dana jest jedna z funkcji trygonometrycznych kąta ostrego  $\alpha$ . Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych tego kąta.

a)  $\sin \alpha = \frac{7}{25}$       b)  $\cos \alpha = \frac{60}{61}$       c)  $\operatorname{tg} \alpha = 2\frac{2}{5}$       d)  $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{1}{3}$

5.9. Dwa kąty ostre trójkąta mają miary  $\alpha$  i  $\beta$ . Wykaż, że jeśli  $\operatorname{tg} \alpha = 2 \cdot \sin \alpha$  oraz  $\cos \beta = \sqrt{3} \cdot \cos \alpha$ , to ten trójkąt jest prostokątny, a długości jego boków pozostają w stosunku  $1 : \sqrt{3} : 2$ .

5.10. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długość  $a$  i  $b$ , zaś przeciwprostokątna ma długość  $c$ . Wykaż, że jeśli przeciw boku  $a$  leży kąt  $\alpha$  taki, że  $\operatorname{tg} \alpha = 2$ , to

$$\frac{(a^2 - c^2)(b^2 - c^2)}{(a^2 + b^2 + c^2)^2} = \frac{1}{25}.$$



5.11. Wykaż, że jeśli  $\alpha \in (0^\circ, 90^\circ)$  oraz  $\operatorname{ctg} \alpha = 4$ , to  $\frac{32 \cdot \sin \alpha - \sin(90^\circ - \alpha)}{6 \cdot \cos(90^\circ - \alpha) + 2 \cdot \cos \alpha} = 2$ .

5.12. Wykaż, że:

a)  $\operatorname{tg} 5^\circ \cdot \operatorname{tg} 25^\circ \cdot \operatorname{tg} 45^\circ \cdot \operatorname{tg} 65^\circ \cdot \operatorname{tg} 85^\circ = 1$   
 b)  $\cos^2 20^\circ + \cos^2 40^\circ + \cos^2 50^\circ + \cos^2 70^\circ = 2$   
 c)  $\sin^4 20^\circ + \sin^4 70^\circ + 2 \cdot \cos^2 20^\circ \cdot \cos^2 70^\circ = 1$ .

## Sinus, cosinus, tangens i cotangens dowolnego kąta płaskiego

5.13. Na końcowym ramieniu kąta  $\alpha$ , umieszczonego w układzie współrzędnych w położeniu standardowym, znajduje się punkt  $P$ . Wyznacz odległość tego punktu od punktu  $O(0, 0)$ . Następnie oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kąta  $\alpha$  – o ile istnieją.

a)  $P(12, 5)$       b)  $P(-2, 2\sqrt{3})$       c)  $P(-\sqrt{3}, -\sqrt{6})$   
 d)  $P(15, -8)$       e)  $P(0, -3)$       f)  $P(-5, 0)$

5.14. Punkt  $P$  znajduje się na końcowym ramieniu kąta  $\alpha$  w położeniu standardowym. Odległość tego punktu od początku układu współrzędnych jest równa  $r$ . Wyznacz brakującą współrzędną punktu  $P$  i oblicz funkcje trygonometryczne kąta  $\alpha$ , jeśli:

a)  $P(-3, y)$ ,  $r = 5$ ,  $\alpha \in (180^\circ, 270^\circ)$   
 b)  $P(x, 2)$ ,  $r = \sqrt{13}$ ,  $\alpha \in (90^\circ, 180^\circ)$   
 c)  $P(x, 4)$ ,  $r = 8,5$ ,  $\alpha \in (0^\circ, 90^\circ)$   
 d)  $P(4\sqrt{3}, y)$ ,  $r = 7$ ,  $\alpha \in (270^\circ, 360^\circ)$ .

5.15. Kąt  $\alpha$  znajduje się w położeniu standardowym. Punkt  $P(x, y)$  leży na końcowym ramieniu tego kąta, w odległości  $r$  od punktu  $O(0, 0)$ . Oblicz współrzędne punktu  $P$ , jeśli:

a)  $\alpha \in (0^\circ, 90^\circ)$ ,  $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ,  $r = 6$   
 b)  $\alpha \in (90^\circ, 180^\circ)$ ,  $\cos \alpha = -\frac{2}{3}$ ,  $r = 9$   
 c)  $\alpha \in (180^\circ, 270^\circ)$ ,  $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$ ,  $r = 10$   
 d)  $\alpha \in (270^\circ, 360^\circ)$ ,  $\sin \alpha = -\frac{1}{2}$ ,  $r = 2\sqrt{3}$ .

5.16. Kąt  $\alpha$  znajduje się w położeniu standardowym. Punkt  $P(x, y)$  wybrano na końcowym ramieniu tego kąta, w odległości  $r$  od punktu  $O(0, 0)$ . Oblicz współrzędne punktu  $P$ , jeśli:

a)  $\alpha \in (180^\circ, 270^\circ)$ ,  $\operatorname{tg} \alpha = 2$ ,  $r = 2\sqrt{5}$   
 b)  $\alpha \in (90^\circ, 180^\circ)$ ,  $\operatorname{tg} \alpha = -3$ ,  $r = \sqrt{10}$   
 c)  $\alpha \in (270^\circ, 360^\circ)$ ,  $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{-4}{3}$ ,  $r = 15$   
 d)  $\alpha \in (0^\circ, 90^\circ)$ ,  $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{1}{2}$ ,  $r = 5$ .

5.17. Jaką miarę ma kąt  $\alpha$ , jeśli  $\alpha \in (0^\circ, 360^\circ)$  oraz:

a)  $\sin \alpha = 1$

b)  $\operatorname{tg} \alpha = 0$

c)  $\cos \alpha = 0$

Dla wyznaczonej miary  $\alpha$  oblicz pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych tego kąta, o ile istnieją.

5.18. Oblicz – korzystając z definicji – wartości funkcji trygonometrycznych kąta  $\alpha$ , jeśli:

a)  $\alpha = 210^\circ$

b)  $\alpha = 240^\circ$

c)  $\alpha = 135^\circ$

d)  $\alpha = 330^\circ$

5.19. W której ćwiartce układu współrzędnych znajduje się końcowe ramię kąta  $\alpha$  w położeniu standardowym, jeżeli:

a)  $\sin \alpha < 0$  i  $\cos \alpha < 0$

b)  $\sin \alpha < 0$  i  $\operatorname{tg} \alpha < 0$

c)  $\operatorname{tg} \alpha > 0$  i  $\operatorname{ctg} \alpha > 0$

d)  $\cos \alpha < 0$  i  $\operatorname{tg} \alpha < 0$

e)  $\sin \alpha < 0$  i  $\cos \alpha > 0$

f)  $\cos \alpha > 0$  i  $\operatorname{tg} \alpha < 0$

5.20. Kąt  $\alpha$  jest ostry. Jaką wartość: dodatnią czy ujemną, ma poniższe wyrażenie?

a)  $\sin(90^\circ + \alpha) \cdot \cos(180^\circ + \alpha) + \operatorname{tg}(270^\circ + \alpha)$

b)  $\cos(90^\circ - \alpha) \cdot \cos(180^\circ - \alpha) \cdot \sin(360^\circ - \alpha)$

c)  $\operatorname{ctg}(270^\circ + \alpha) + \sin(180^\circ + \alpha)$

d)  $[\cos(180^\circ + \alpha) + \sin(270^\circ + \alpha)] \cdot \operatorname{tg}(180^\circ - \alpha)$

5.21. Kąt  $\alpha$  znajduje się w układzie współrzędnych w położeniu standardowym. Punkt  $P(x, y)$  wybrano na końcowym ramieniu tego kąta w odległości  $r$  od punktu  $O(0, 0)$ . Oblicz współrzędne punktu  $P$ , jeśli:

a)  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{2}{3}$ ,  $\cos \alpha < 0$ ,  $r = \sqrt{13}$

b)  $\operatorname{ctg} \alpha = -3$ ,  $\sin \alpha > 0$ ,  $r = 5$

c)  $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{2}{5}$ ,  $\cos \alpha > 0$ ,  $r = \frac{\sqrt{29}}{5}$

d)  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{4}{5}$ ,  $\sin \alpha > 0$ ,  $r = \frac{\sqrt{41}}{3}$

5.22. Wykaż, że jeśli  $\alpha \in (0^\circ, 360^\circ)$  oraz:

a)  $\sin \alpha = \cos \alpha$ , to  $\alpha \in \{45^\circ, 225^\circ\}$

b)  $\sin \alpha = -\cos \alpha$ , to  $\alpha \in \{135^\circ, 315^\circ\}$

5.23. Skonstruuj w układzie współrzędnych kąt o mierze  $\alpha$ , wiedząc, że:

a)  $\sin \alpha = \frac{1}{4}$

b)  $\cos \alpha = -\frac{2}{5}$

c)  $\operatorname{tg} \alpha = 3\frac{1}{2}$

d)  $\operatorname{ctg} \alpha = -6$

e)  $\sin \alpha = -\frac{3}{4}$

f)  $\cos \alpha = \frac{4}{5}$

Rozważ dwa przypadki.

5.24. Skonstruuj w układzie współrzędnych kąt o takiej mierze  $\alpha$ , że:

a)  $\sin \alpha = \frac{5}{6}$  i  $\operatorname{tg} \alpha < 0$

b)  $\cos \alpha = -\frac{2}{7}$  i  $\operatorname{ctg} \alpha > 0$

c)  $\operatorname{tg} \alpha = 2\frac{1}{3}$  i  $\sin \alpha < 0$

d)  $\operatorname{ctg} \alpha = -\sqrt{2}$  i  $\cos \alpha > 0$

## Podstawowe tożsamości trygonometryczne

5.25. Oblicz pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych kąta  $\alpha$ , jeśli  $\alpha \in (90^\circ, 180^\circ)$  oraz:

a)  $\sin \alpha = 0,8$

b)  $\cos \alpha = -\frac{1}{4}$

c)  $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{1}{3}$

d)  $\operatorname{ctg} \alpha = -7$

5.26. Oblicz pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych, wiedząc, że  $\alpha \in (0^\circ, 180^\circ)$  oraz:

a)  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{2}$

b)  $\cos \alpha = -\frac{24}{25}$

c)  $\sin \alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}$

d)  $\operatorname{ctg} \alpha = -\frac{11}{60}$

5.27. Oblicz pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych kąta  $\alpha$ , jeśli:

a)  $\sin \alpha = -\frac{5}{13}$  i  $\alpha \in (180^\circ, 270^\circ)$

b)  $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{8}{15}$  i  $\alpha \in (180^\circ, 270^\circ)$

c)  $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{12}{5}$  i  $(270^\circ, 360^\circ)$

d)  $\cos \alpha = \frac{2}{3}$  i  $\alpha \in (270^\circ, 360^\circ)$

5.28. Oblicz pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych kąta  $\alpha$ ,  $\alpha \in (0^\circ, 360^\circ)$ , jeśli:

a)  $\cos \alpha = \frac{5}{13}$

b)  $\sin \alpha = -\frac{60}{61}$

c)  $\operatorname{ctg} \alpha = 3$

d)  $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{45}{28}$

5.29. Oblicz wartość wyrażenia:

a)  $\frac{4 \cdot \sin \alpha - 5 \cdot \cos \alpha}{\cos \alpha + 3 \cdot \sin \alpha}$ , jeśli  $\operatorname{tg} \alpha = 5$

b)  $\frac{-3 \cdot \cos \alpha + 6 \cdot \sin \alpha}{8 \cdot \sin \alpha + 3 \cdot \cos \alpha}$ , jeśli  $\operatorname{ctg} \alpha = -2$ .

5.30. Kąt  $\alpha$  jest rozwarty. Oblicz wartość wyrażenia:

a)  $\cos \alpha - \sin^2 \alpha$ , jeśli  $\cos^2 \alpha = 0,81$

b)  $2 \cdot \cos \alpha + \sin \alpha$ , jeśli  $\sin^2 \alpha = 0,25$

c)  $\operatorname{tg} \alpha - 6 \cdot \operatorname{ctg} \alpha$ , jeśli  $\operatorname{tg}^2 \alpha = 144$

d)  $\frac{3 \cdot \sin \alpha + 4 \cdot \cos \alpha}{\sin \alpha - 2 \cdot \cos \alpha}$ , jeśli  $\operatorname{ctg}^2 \alpha = 100$ .

5.31. Oblicz:

a)  $\operatorname{tg} \alpha$ , jeśli  $\alpha \in (0^\circ, 90^\circ)$  oraz  $4 \cdot \sin^2 \alpha = 3 \cdot \cos^2 \alpha$

b)  $\operatorname{ctg} \alpha$ , jeśli  $\alpha \in (90^\circ, 180^\circ)$  oraz  $5 \cdot \cos^2 \alpha = 2 \cdot \sin^2 \alpha$

c)  $\operatorname{tg} \alpha$ , jeśli  $\alpha \in (180^\circ, 270^\circ)$  oraz  $9 \cdot \sin^2 \alpha - 5 \cdot \cos^2 \alpha = 2$

d)  $\operatorname{ctg} \alpha$ , jeśli  $\alpha \in (270^\circ, 360^\circ)$  oraz  $4 \cdot \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 3$ .

5.32. Sprawdź, czy podane równości są tożsamościami trygonometrycznymi, jeśli  $\alpha \in (0^\circ, 90^\circ) \cup (90^\circ, 180^\circ)$ .

a)  $1 - 2 \cdot \sin^2 \alpha = 2 \cdot \cos^2 \alpha - 1$

b)  $\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cdot \cos^2 \alpha - 1$

c)  $\frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\cos \alpha} = 1 + \operatorname{tg} \alpha$

d)  $\frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\sin \alpha} = \operatorname{ctg} \alpha \cdot (1 + \operatorname{tg} \alpha)$

e)  $\frac{\sin \alpha + \operatorname{tg} \alpha}{\sin \alpha} = 1 + \frac{1}{\cos \alpha}$

f)  $\frac{\cos \alpha + \operatorname{ctg} \alpha}{\cos \alpha} = 1 + \frac{1}{\sin \alpha}$

5.33. Sprawdź, czy podane równości są tożsamościami trygonometrycznymi, jeśli  $\alpha \in (0^\circ, 90^\circ) \cup (90^\circ, 180^\circ)$ .

a)  $\cos \alpha \cdot \left( \frac{1}{\cos \alpha} - \cos \alpha \right) = \sin^2 \alpha$

b)  $1 - \sin \alpha = \frac{\operatorname{ctg} \alpha - \cos \alpha}{\operatorname{ctg} \alpha}$

c)  $\frac{2}{\sin^2 \alpha} - 1 = 1 + 2 \cdot \operatorname{ctg}^2 \alpha$

d)  $\frac{1}{1 - \cos \alpha} + \frac{1}{1 + \cos \alpha} = \frac{2}{\sin^2 \alpha}$

e)  $\frac{\operatorname{tg} \alpha \cdot (1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha)}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha} = \operatorname{ctg} \alpha$

f)  $\frac{\operatorname{ctg} \alpha \cdot (1 + \operatorname{tg}^2 \alpha)}{1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha} = \operatorname{tg} \alpha$

5.34. Wiedząc, że  $\alpha$  jest kątem rozwartym oraz  $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{7}{13}$ , oblicz:

a)  $\sin \alpha \cdot \cos \alpha$

b)  $\sin \alpha - \cos \alpha$

c)  $\sin \alpha, \cos \alpha$ .

5.35. Wiedząc, że  $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$ , oblicz:

a)  $\sin \alpha \cdot \cos \alpha$

b)  $(\cos \alpha - \sin \alpha)^2$

c)  $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha$ .

5.36. Wiedząc, że  $\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{ctg} \alpha = 4$ , oblicz:

a)  $\operatorname{tg}^2 \alpha + \operatorname{ctg}^2 \alpha$

b)  $\operatorname{tg}^4 \alpha + \operatorname{ctg}^4 \alpha$

c)  $(\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{ctg} \alpha)^2$ .

5.37. Wykaż, że jeśli  $\alpha \in (0^\circ, 90^\circ)$  oraz  $\sin \alpha \cdot \cos \alpha = \frac{7}{18}$ , to  $\sin \alpha + \cos \alpha = 1\frac{1}{3}$ .

5.38. Wykaż, że jeśli  $\alpha \in (0^\circ, 90^\circ) \cup (180^\circ, 270^\circ)$  oraz  $\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{ctg} \alpha = 2\frac{1}{6}$ , to  $\operatorname{tg}^2 \alpha + \operatorname{ctg}^2 \alpha = 2\frac{25}{36}$ .

5.39. Zbadaj, czy istnieje kąt  $\alpha$ ,  $\alpha \in (0^\circ, 360^\circ)$ , który spełnia następujące warunki:

a)  $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{5}$  i  $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$

b)  $\sin \alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}}$  i  $\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$

c)  $\cos \alpha = -\frac{1}{3}$  i  $\operatorname{tg} \alpha = -2\sqrt{2}$

d)  $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{6}$  i  $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\sqrt{6}}{12}$ .

Jeśli tak, to do której ćwiartki układu współrzędnych należy końcowe ramię kąta  $\alpha$  w położeniu standardowym.

5.40. Czy  $\sin \alpha$  może się równać:

a)  $\frac{\sqrt{5}}{2}$

b)  $\frac{-\sqrt{15}}{4}$

c)  $\frac{-1}{\sin \beta}$  dla pewnego kąta  $\beta$

d)  $\operatorname{tg} \beta + \operatorname{ctg} \beta$  dla pewnego kąta  $\beta$ ?

5.41. Czy  $\cos \alpha$  może się równać:

a)  $-\frac{\sqrt{7}}{2}$

b)  $\frac{3}{\sqrt{10}}$

c)  $\frac{1}{\sin \beta}$  dla pewnego kąta  $\beta$

d)  $\operatorname{tg} \beta$  dla pewnego kąta  $\beta$ ?

## Wybrane wzory redukcyjne

5.42. Oblicz, stosując wzory redukcyjne:

- a)  $\sin 120^\circ \cdot \cos 150^\circ + \operatorname{tg} 135^\circ$   
 b)  $\operatorname{tg} 120^\circ \cdot \operatorname{ctg} 30^\circ + \cos^2 135^\circ$   
 c)  $(\cos 120^\circ - \operatorname{tg} 150^\circ)^2$   
 d)  $(\sin 135^\circ - \operatorname{tg} 120^\circ) \cdot (\cos 135^\circ - \operatorname{ctg} 150^\circ)$

5.43. Dane są liczby:

$$a = \sin 120^\circ + \cos 150^\circ - 2 \cdot \operatorname{tg} 45^\circ$$

$$b = \left( \frac{\sin 60^\circ - 2 \cdot \cos 135^\circ}{\operatorname{tg} 120^\circ} \right)^2$$

$$c = (\cos 150^\circ + \sin 135^\circ)(\cos 30^\circ + \sin 45^\circ)$$

$$d = \operatorname{tg} 150^\circ \cdot \cos 30^\circ + \sin 90^\circ$$

Która z tych liczb jest liczbą wymierną?

5.44. Porównaj liczby  $x$  i  $y$ .

a)  $x = \sin 135^\circ$ ,  $y = \operatorname{tg}^2 150^\circ$

b)  $x = -\sqrt{3} \cdot \cos 120^\circ$ ,  $y = \sin 120^\circ$

c)  $x = \frac{1}{\operatorname{ctg} 120^\circ}$ ,  $y = \frac{1}{\cos 135^\circ}$

d)  $x = 4^{\sin 150^\circ}$ ,  $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{3 \cos 120^\circ}$

5.45. Oblicz bez użycia tablic trygonometrycznych i kalkulatora.

- a)  $4 \cdot \sin 300^\circ \cdot \cos 330^\circ \cdot \operatorname{ctg} 315^\circ$   
 b)  $\cos 240^\circ \cdot \sin 180^\circ + \cos 0^\circ$   
 c)  $\sin^2 217^\circ + \cos^2 127^\circ + 2 \cdot \sin 37^\circ \cdot \cos 127^\circ$   
 d)  $\operatorname{tg} 225^\circ - \operatorname{ctg} 135^\circ - \sin 0^\circ$   
 e)  $\cos 0^\circ + \sin 90^\circ - \sin 270^\circ - \operatorname{tg} 180^\circ$

5.46. Oblicz bez użycia tablic trygonometrycznych i kalkulatora.

- a)  $2 \cdot \cos 120^\circ + 4 \cdot \operatorname{tg} 210^\circ \cdot \sin 120^\circ$     b)  $3 \cdot \operatorname{tg} 225^\circ \cdot \cos 300^\circ + \sin 150^\circ$   
 c)  $\cos 210^\circ \cdot \operatorname{ctg} 210^\circ + \sin 315^\circ \cdot \cos 315^\circ$     d)  $\sin 150^\circ \cdot \operatorname{tg} 225^\circ + \sin^2 300^\circ$   
 e)  $\sin 180^\circ + \cos 90^\circ + \cos 180^\circ + \sin 270^\circ$

5.47. Wiedząc, że  $\alpha \in (0^\circ, 90^\circ) \cup (90^\circ, 180^\circ)$ , doprowadź poniższe wyrażenia do najprostszej postaci.

- a)  $\sin(180^\circ - \alpha) \cdot \cos(90^\circ + \alpha) - \cos^2(180^\circ - \alpha)$   
 b)  $\sin(90^\circ + \alpha) \cdot \operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) + \cos(180^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{ctg}(90^\circ + \alpha)$   
 c)  $\cos(90^\circ - \alpha) \cdot \sin(180^\circ - \alpha) - \sin(90^\circ - \alpha) \cdot \cos(180^\circ - \alpha)$   
 d)  $\operatorname{tg}(90^\circ + \alpha) \cdot \operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) + \operatorname{ctg}(90^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha)$

5.48. Kąty trójkąta mają miary:  $\alpha, \beta, \gamma$ . Oblicz funkcje trygonometryczne kąta  $\alpha + \beta$ , jeśli:

- a)  $\gamma = 60^\circ$     b)  $\gamma = 30^\circ$   
 c)  $\cos \gamma = \frac{-\sqrt{3}}{2}$     d)  $\operatorname{tg} \gamma = -1$

5.49. Wyznacz  $\alpha$ ,  $\alpha \in (0^\circ, 360^\circ)$ , wiedząc, że:

- a)  $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$  i  $\sin \alpha < 0$     b)  $\sin \alpha = 0$  i  $\cos \alpha = -1$   
 c)  $\operatorname{ctg} \alpha = -1$  i  $\sin \alpha > 0$     d)  $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{3}$  i  $\cos \alpha > 0$   
 e)  $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$  i  $\sin \alpha < 0$     f)  $\operatorname{tg} \alpha = -\sqrt{3}$  i  $\sin \alpha > 0$ .

## Test sprawdzający do rozdziału 5.

1. Kąt  $\alpha$  znajduje się w układzie współrzędnych w położeniu standardowym. Punkt  $P(-5, 12)$  należy do drugiego ramienia tego kąta. Zatem:

- A.  $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$     B.  $\sin \alpha = -\frac{12}{13}$     C.  $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{5}{12}$     D.  $\operatorname{ctg} \alpha = -\frac{12}{5}$

2. Punkt  $P$  należy do drugiego ramienia kąta  $\alpha$  w położeniu standardowym i jest punktem przecięcia się prostej  $k: x = -3$  z prostą  $l: y = -4x$ . Zatem:

- A.  $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{3}{4}$     B.  $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{4}{3}$     C.  $\operatorname{tg} \alpha = -4$     D.  $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{1}{4}$

3. O kącie płaskim  $\alpha$  wiadomo, że  $\operatorname{tg} \alpha < 0$  i  $\sin \alpha < 0$ . Zatem:  
 A.  $\alpha \in (0^\circ, 90^\circ)$  B.  $\alpha \in (90^\circ, 180^\circ)$  C.  $\alpha \in (180^\circ, 270^\circ)$  D.  $\alpha \in (270^\circ, 360^\circ)$
4. Jeśli  $\alpha \in (90^\circ, 180^\circ)$  i  $\cos^2 \alpha = \frac{4}{9}$ , to:  
 A.  $\operatorname{tg} \alpha \cdot \sin \alpha = \frac{5}{6}$  B.  $\operatorname{tg} \alpha \cdot \sin \alpha = \frac{6}{5}$  C.  $\operatorname{tg} \alpha \cdot \sin \alpha = -\frac{5}{6}$  D.  $\operatorname{tg} \alpha \cdot \sin \alpha = -\frac{6}{5}$
5. Wartość wyrażenia  $\sin^2(90^\circ + 44^\circ) - \cos^2 44^\circ$  jest równa:  
 A. 0 B.  $-2\cos^2 44^\circ$  C. -1 D.  $-\frac{1}{2}$
6. Wyrażenie  $\cos(180^\circ - \alpha) \cdot \sin(90^\circ - \alpha) + 1$  jest równe:  
 A.  $\sin \alpha \cdot \cos \alpha + 1$  B. 2 C.  $\cos^2 \alpha + 1$  D.  $\sin^2 \alpha$
7. Wyrażenie  $\operatorname{tg} 135^\circ \cdot \cos 120^\circ$  jest równe:  
 A. 1 B.  $\frac{1}{2}$  C.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  D.  $\frac{\sqrt{6}}{2}$
8. Jeśli  $\alpha = 150^\circ$ , to:  
 A.  $\sqrt{3} \cdot \cos \alpha + \sin \alpha = 0$  B.  $(\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = \frac{2 + \sqrt{3}}{2}$   
 C.  $\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \frac{1}{4}$  D.  $\frac{2 \cdot \sin \alpha + 1}{2 \cdot \cos \alpha} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$
9. Jeśli  $\alpha, \beta, \gamma$  są kątami trójkąta oraz  $\alpha = 15^\circ, \beta = 30^\circ$ , to:  
 A.  $\cos \gamma = -\sqrt{2} \cdot \sin \beta$  B.  $\cos \gamma = \sin(\alpha + \beta)$   
 C.  $\cos \gamma = -0,5 \cdot \operatorname{ctg}(\alpha + \beta)$  D.  $\sqrt{3} \cdot \cos \gamma = -\operatorname{tg} 2\beta$
10. Jeśli  $\alpha \in (180^\circ, 270^\circ)$  i  $\operatorname{tg} \alpha = 5$ , to:  
 A.  $\sin \alpha = \frac{-1}{\sqrt{26}}$  B.  $\sin \alpha = \frac{-5}{\sqrt{26}}$  C.  $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{26}}$  D.  $\sin \alpha = \frac{5}{\sqrt{26}}$

## Zadania powtórzeniowe do rozdziału 5.

11. Na drugim ramieniu kąta  $\alpha$  znajdującego się w położeniu standardowym leży punkt  $P\left(-\frac{1}{2}, 4\right)$ . Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych kąta  $\alpha$ .
12. Korzystając z definicji funkcji trygonometrycznych kąta, znajdującego się w układzie współrzędnych w położeniu standardowym, wyznacz wartości funkcji trygonometrycznych kąta równego  $300^\circ$ .
13. Skonstruuj w układzie współrzędnych kąt  $\alpha$ , wiedząc, że:  
 a)  $\cos \alpha = -\frac{5}{8}$  i  $\alpha \in (180^\circ, 270^\circ)$  b)  $\sin \alpha = \frac{3}{7}$
14. Skonstruuj w układzie współrzędnych kąt  $\alpha$ , wiedząc, że:  
 a)  $\operatorname{tg} \alpha = 1,5$  i  $\cos \alpha < 0$  b)  $\operatorname{ctg} \alpha = -3$
15. Porównaj liczby:  $a = \sin 135^\circ$  oraz  $b = \sin^3 150^\circ + \sin 30^\circ \cdot \cos^2 120^\circ$ .
16. Wyznacz miarę kąta  $\alpha, \alpha \in (0^\circ, 360^\circ)$ , wiedząc, że:  
 a)  $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$  i  $\operatorname{tg} \alpha < 0$  b)  $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{1 + \sqrt{3}}{3 + \sqrt{3}}$  i  $\sin \alpha > 0$
17. Kąt  $\alpha$  jest kątem ostrym oraz  $\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{ctg} \alpha = 2,5$ . Oblicz:  
 a)  $\operatorname{tg}^2 \alpha + \operatorname{ctg}^2 \alpha$  b)  $\operatorname{tg}^4 \alpha + \operatorname{ctg}^4 \alpha$ .
18. Kąt  $\alpha$  jest kątem rozwartym oraz  $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{2}{3}$ . Oblicz:  
 a)  $\sin \alpha - \cos \alpha$  b)  $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha$ .
19. Oblicz wartość wyrażenia:  
 a)  $\operatorname{tg} 15^\circ \cdot \operatorname{tg} 75^\circ \cdot \operatorname{tg} 135^\circ$  b)  $\operatorname{tg} 120^\circ \cdot \operatorname{tg} 130^\circ \cdot \operatorname{tg} 140^\circ$
20. Wykaż, że:  
 a)  $(\sin 15^\circ + \cos 165^\circ)^2 + 2 \cdot \sin 75^\circ \cdot \cos 75^\circ = 1$   
 b)  $(\sin 130^\circ + \cos 50^\circ)^2 - 2 \cdot \sin 40^\circ \cdot \cos 40^\circ = 1$

21. Wykaż, że jeśli  $\alpha$  jest kątem ostrym i  $\frac{3(\sin\alpha - 8\cos\alpha)}{4\cos\alpha - 5\sin\alpha} = 7$ , to  $\alpha = 45^\circ$ .

22. Wykaż, że jeśli suma cosinusów wszystkich kątów trójkąta prostokątnego jest równa  $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ , to iloczyn sinusów tych kątów jest równy  $\frac{2}{5}$ .

23. Wykaż, że jeśli  $a = 3\sqrt[4]{9^{\cos 240^\circ}}$  i  $b = (\sqrt{\operatorname{tg} 210^\circ})^3$ , to  $a \cdot b = 1$ .

24. Wykaż, że dana równość jest tożsamością trygonometryczną. Podaj konieczne założenia.

a)  $(1 + \sin\alpha) \cdot \left( \frac{1}{\cos\alpha} - \frac{1}{\operatorname{ctg}\alpha} \right) = \cos\alpha$

b)  $(1 - \cos\alpha) \cdot \left( \frac{1}{\sin\alpha} + \frac{1}{\operatorname{tg}\alpha} \right) = \sin\alpha$

25. Wykaż, że jeśli  $\alpha$  jest kątem ostrym i  $2\cos^2\alpha + 5\sin^2\alpha = 4$ , to  $(\operatorname{tg}\alpha + \operatorname{ctg}\alpha)^2 = 4,5$ .

## 6. Geometria analityczna

### Odcinek w układzie współrzędnych

6.1. Oblicz długość odcinka  $AB$ , jeśli:

- a)  $A(3, 7), B(-8, 7)$                       b)  $A(-5, -2), B(-5, 7)$   
 c)  $A(1, 9), B(-7, -6)$                     d)  $A(10, 6), B(4, 0)$   
 e)  $A(\sqrt{5} + 2, \sqrt{5}), B(1, -1)$         f)  $A\left(3\frac{1}{3}, -5\right), B\left(\frac{2}{3}, -3\right)$ .

6.2. Wyznacz współrzędne środka odcinka  $AB$ , jeśli:

- a)  $A(0, 4), B(-2, 0)$                       b)  $A(-3, 1), B(3, 5)$   
 c)  $A(4, -1), B(-10, 9)$                  d)  $A(\sqrt{2}, -3), B(\sqrt{2}, 7)$ .

6.3. Dane są dwa wierzchołki równoległoboku  $ABCD$  i punkt  $P$  przecięcia się przekątnych. Oblicz współrzędne pozostałych wierzchołków równoległoboku, jeśli:

- a)  $A(-3, 5), B(-2, -1), P(3, 1)$         b)  $B(4, -2), C(2, 7), P(-1, 2)$ .

Narysuj równoległobok  $ABCD$  w układzie współrzędnych.

6.4. Dane są trzy wierzchołki równoległoboku  $ABCD$ . Oblicz współrzędne czwartego wierzchołka oraz współrzędne punktu  $P$  przecięcia przekątnych, jeśli:

- a)  $A(4, 1), B(2, 6), C(-8, 3)$             b)  $A(-5, -2), B(3, 1), D(-2, 5)$ .

Narysuj równoległobok  $ABCD$  w układzie współrzędnych.

6.5. Oblicz długości przekątnych równoległoboku  $ABCD$ , jeśli:

- a)  $A(5, 1), B(8, -3), C(3, 9)$             b)  $A(-4, -5), B(5, -3), D(-3, 3)$ .

6.6. Oblicz długości boków równoległoboku  $ABCD$ , jeśli dane są dwa jego wierzchołki i punkt  $P$  przecięcia się przekątnych.

- a)  $A(4, -6), B(9, -6), P(7, -2)$         b)  $A(-3, -5), P(2, -1), D(-1, 3)$

- 6.7.** Dany jest trójkąt  $ABC$ , gdzie:  $A(-4, -1)$ ,  $B(4, 5)$ ,  $C(2, 9)$ . Oblicz długość środkowej:
- a)  $AD$                       b)  $BE$                       c)  $CF$ .
- 6.8.** Wyznacz współrzędne punktów podziału odcinka  $AB$ :
- a) na cztery odcinki równej długości, jeśli  $A(-5, -7)$ ,  $B(3, 5)$ ,  
 b) na trzy odcinki równej długości, jeśli  $A(2, -3)$ ,  $B(-10, 3)$ ,  
 c) na sześć odcinków równej długości, jeśli  $A(-1, 3)$ ,  $B(5, 15)$ .
- 6.9.** Oblicz współrzędne punktu  $S$  przecięcia środkowych w trójkącie  $ABC$ , jeśli:
- a)  $A(0, 0)$ ,  $B(9, 0)$ ,  $C(0, 6)$   
 b)  $A(-4, 0)$ ,  $B(-2, -5)$ ,  $C(0, 2)$   
 c)  $A(-2, 7)$ ,  $B(1, 2)$ ,  $C(4, 0)$   
 d)  $A(-4, -6)$ ,  $B(2, -11)$ ,  $C(5, 5)$ .
- 6.10.** W trójkącie  $ABC$  dane są wierzchołki:  $A(-5, -2)$ ,  $B(7, 4)$ ,  $C(1, 7)$ . Na bokach  $AB$ ,  $BC$  i  $AC$  tego trójkąta zaznaczono odpowiednio punkty  $D$ ,  $E$ ,  $F$  w taki sposób, że  $|AD| : |DB| = |BE| : |EC| = |CF| : |FA| = 1 : 2$ . Oblicz współrzędne tych punktów.
- 6.11.** Wykaż, że trójkąt o wierzchołkach  $A(0, 2)$ ,  $B(6, -2)$ ,  $C(7, 6)$  jest równoramienny.
- 6.12.** Wykaż, że trójkąt o wierzchołkach  $A(-2, -3)$ ,  $B(4, 1)$ ,  $C(2, 4)$  jest prostokątny.
- 6.13.** Dane są punkty:  $A(-2, 0)$ ,  $B(3, 1)$ ,  $C(4, 6)$ ,  $D(-1, 5)$ . Wykaż, że czworokąt  $ABCD$  jest rombem.
- 6.14.** Korzystając z własności wektorów wykaż, że jeśli  $A(0, -1)$ ,  $B(6, 1)$ ,  $C(3, 5)$ ,  $D(-3, 3)$ , to czworokąt  $ABCD$  jest równoległobokiem.
- 6.15.** Korzystając z własności wektorów wykaż, że jeśli  $A(-3, 4)$ ,  $B(6, 1)$ ,  $C(6, 4)$ ,  $D(3, 5)$ , to czworokąt  $ABCD$  jest trapezem.

## Równanie kierunkowe prostej

- 6.16.** Wyznacz współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez punkty  $A$  i  $B$ .
- a)  $A(2, -3)$ ,  $B(6, 7)$                       b)  $A(-4, 1)$ ,  $B(2, 7)$   
 c)  $A\left(\frac{-3}{4}, -1\right)$ ,  $B\left(\frac{-1}{4}, 8\right)$                       d)  $A\left(\frac{1}{8}, 1\frac{1}{2}\right)$ ,  $B\left(\frac{1}{4}, \frac{-1}{2}\right)$

- 6.17.** Prosta  $k$  przechodzi przez punkt  $A$ , a jej współczynnik kierunkowy jest równy  $a$ . Wyznacz równanie kierunkowe prostej  $k$ .
- a)  $A(5, 6)$ ,  $a = -3$                       b)  $A(-10, 12)$ ,  $a = 2$   
 c)  $A(-1, -9)$ ,  $a = \frac{1}{3}$                       d)  $A(24, -36)$ ,  $a = -\frac{3}{4}$
- 6.18.** Napisz równanie kierunkowe prostej, przechodzącej przez punkty  $A$  i  $B$ .
- a)  $A(-10, 58)$ ,  $B(2, 22)$                       b)  $A(-8, -95)$ ,  $B(4, 25)$   
 c)  $A(-10, 7)$ ,  $B(5, -3)$                       d)  $A(-6, -2)$ ,  $B(24, 4)$
- 6.19.** Dane jest równanie prostej  $k$ . Podaj miarę kąta nachylenia tej prostej do osi  $OX$ .
- a)  $k: y = x - 1$                       b)  $k: y = \sqrt{3}x + \sqrt{2}$                       c)  $k: y = 1 - \sqrt{3}x$   
 d)  $k: y = -x + 2$                       e)  $k: y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{1}{2}$                       f)  $k: y = -\frac{3-2\sqrt{3}x}{6}$
- 6.20.** Dane są punkty  $A$  i  $B$ . Podaj, z dokładnością do jednego stopnia, miarę kąta nachylenia prostej  $AB$  do osi  $OX$ .
- a)  $A(-4, 2)$ ,  $B(1, 8)$                       b)  $A(5, 6)$ ,  $B(9, -4)$   
 c)  $A(12, -3)$ ,  $B(6, 15)$                       d)  $A(2, -3)$ ,  $B(-1, -19)$
- 6.21.** Wyznacz równanie kierunkowe prostej  $k$ , przechodzącej przez punkt  $P$  i nachylonej do osi  $OX$  pod kątem  $\alpha$ .
- a)  $P(0, 0)$ ,  $\alpha = 135^\circ$                       b)  $P(0, 6)$ ,  $\alpha = 30^\circ$   
 c)  $P(4, 0)$ ,  $\alpha = 120^\circ$                       d)  $P(3, -4)$ ,  $\alpha = 45^\circ$   
 e)  $P(-2\sqrt{3}, 5)$ ,  $\alpha = 60^\circ$                       f)  $P(\sqrt{6}, \sqrt{8})$ ,  $\alpha = 150^\circ$
- 6.22.** Dany jest trójkąt o wierzchołkach:  $A(-4, 3)$ ,  $B(4, -5)$  i  $C(8, 1)$ . Wyznacz:
- a) równania kierunkowe prostych, zawierających środkowe  $AD$ ,  $BE$  i  $CF$ ,  
 b) współrzędne punktu przecięcia tych prostych.
- 6.23.** Wyznacz liczbę  $a$  wiedząc, że prosta  $m$  jest równoległa do prostej  $k$ .
- a)  $k: y = (2a - 3)x + 4$ ,                       $m: y = -4x + 7$   
 b)  $k: y = 3x + a$ ,                       $m: y = 4 + (4 + a)x$   
 c)  $k: y = (1 - a)x$ ,                       $m: y = (2a - 5)x - 9$   
 d)  $k: y = 8$ ,                       $m: y = (a - 10)x + 7$

6.24. Dana jest prosta  $m: y = -2x - 1$ .

- a) Napisz równanie prostej  $k$ , równoległej do prostej  $m$  i przechodzącej przez punkt  $(-1, 5)$ .
- b) Naskicuj obydwie proste w układzie współrzędnych.
- c) Sprawdź algebraicznie, że proste  $k$  i  $m$  nie mają punktów wspólnych.

6.25. Napisz równanie kierunkowe prostej  $m$ , równoległej do prostej  $k$  i przechodzącej przez punkt  $A$ .

- a)  $k: y = 2, A(3, -5)$       b)  $k: y = \frac{3}{4}x, A(-8, 3)$
- c)  $k: y = -2x + 5, A(-0,5; 4)$       d)  $k: y = 0,125x - 1, A(16, 20)$

6.26. Wyznacz  $a$  wiedząc, że prosta  $k$  jest prostopadła do prostej  $m$ .

- a)  $k: y = 3x + 6, m: y = ax - 8$
- b)  $k: y = (-0,25a + 3)x + 2, m: y = 4x - 8$
- c)  $k: y = 5 + (4 - 2a)x, m: y = -\frac{2}{3}x + 11$
- d)  $k: y = -x + 3a\sqrt{5}, m: y = (2a - \sqrt{5})x - 19a$

6.27. Dane jest równanie prostej  $m: y = 2x - 2$ .

- a) Napisz równanie prostej  $k$ , która jest prostopadła do prostej  $m$  i przechodzi przez punkt  $(0, 3)$ .
- b) Oblicz współrzędne punktu wspólnego tych prostych.
- c) Naskicuj proste  $k$  i  $m$  w układzie współrzędnych; następnie zaznacz ich wspólny punkt.

6.28. Napisz równanie kierunkowe prostej  $m$ , prostopadłej do prostej  $k$  i przechodzącej przez punkt  $A$ .

- a)  $k: y = -\frac{2}{3}x, A(-4, 1)$
- b)  $k: y = -x + 8, A(2\sqrt{3}, -\sqrt{3})$
- c)  $k: y = 4x - 1, A(2, 9)$
- d)  $k: y = 0,75x + 3, A(6, -4)$

6.29. Dany jest trójkąt o wierzchołkach  $A(-4, -2), B(4, -1), C(-2, 2)$ .

- a) Napisz równania kierunkowe prostych  $AB, BC, AC$ .
- b) Czy trójkąt  $ABC$  jest prostokątny? Odpowiedź uzasadnij.

6.30. Wyznacz równanie symetralnej odcinka o końcach  $A, B$ .

- a)  $A(-4, -1), B(4, -3)$       b)  $A(-4, -3), B(2, 3)$
- c)  $A(0, 3), B(4, -5)$       d)  $A(1, -3), B(7, 1)$

6.31. Wykaż, że prosta  $k: y = -3x + 5$  jest symetralną odcinka o końcach  $A(-1, -2)$  i  $B(5, 0)$ .

6.32. Dane są punkty  $A(-5, -4), B(1, -1), C(-3, 2)$ . Wykaż, że wysokość trójkąta  $ABC$ , poprowadzona z wierzchołka  $C$ , zawiera się w prostej  $k: y = -2x - 4$ .

6.33. Dane są punkty:  $A(-1, 2), B(-6, -1), C(5, 1), D(10, 4)$ . Korzystając z własności prostych, opisanych równaniami kierunkowymi, wykaż, że czworokąt  $ABCD$  jest równoległobokiem.

6.34. Dane są punkty:  $A(-1, -3), B(5, 0), C(3, 4), D(-3, 1)$ . Korzystając z własności prostych, opisanych równaniami kierunkowymi wykaż, że czworokąt  $ABCD$  jest prostokątem.

6.35. Dane są punkty:  $A(-4, 1), B(0, -2), C(3, 2), D(-1, 5)$ . Korzystając z własności prostych, opisanych równaniami kierunkowymi wykaż, że czworokąt  $ABCD$  jest kwadratem.

## Równanie ogólne prostej

6.36. Dane jest równanie prostej  $k$ . Przedstaw to równanie w postaci ogólnej.

- a)  $\frac{x}{3} = \frac{12-x}{3}$       b)  $y = \frac{-x+5}{4}$       c)  $y + \frac{x-1}{2} = \frac{x+2}{3}$

6.37. Punkty  $A$  i  $B$  należą do prostej  $k$ . Wyznacz równanie ogólne prostej  $k$ .

- a)  $A(0, 8), B(2, 4)$       b)  $A(3, -4), B(11, -4)$
- c)  $A(-3, 2), B(4, 9)$       d)  $A(-2, 6), B(\sqrt{2}, -3\sqrt{2})$

**6.38.** Do prostej należą punkty  $P$  i  $Q$ . Korzystając z równania prostej przechodzącej przez dwa dane punkty, wyznacz równanie ogólne tej prostej.

- a)  $P(0, -4), Q(3, 1)$       b)  $P(\sqrt{5}, -3), Q(\sqrt{5}, 8)$   
 c)  $P(2, 2), Q(-1, 0)$       d)  $P(3, 1), Q(-1, -7)$

**6.39.** Dane jest równanie ogólne prostej. Podaj miarę kąta, jaki tworzy ta prosta z osią  $OX$ .

- a)  $x + y - 7 = 0$       b)  $\sqrt{3}x - y + 90 = 0$       c)  $\sqrt{3}x + y + 1 = 0$   
 d)  $\sqrt{3}x - 3y + 15 = 0$       e)  $x - \sqrt{3} = 0$       f)  $3y - \sqrt{3} = 0$

**6.40.** Dane są równania ogólne prostych  $k$  i  $m$ . Czy proste  $k$  i  $m$  są równoległe? Odpowiedź uzasadnij.

- a)  $k: 2x - 3y + 6 = 0,$        $m: -x + 1\frac{1}{2}y - 2 = 0$   
 b)  $k: 3x - 4 = 0,$        $m: 2y + 5 = 0$   
 c)  $k: 7x + 21y - 3 = 0,$        $m: x - 3y - 1 = 0$   
 d)  $k: 2x + 7 = 0,$        $m: 3x - 5 = 0$

**6.41.** Napisz równanie ogólne prostej  $m$  równoległej do prostej:

- a)  $k: 3x - 2y + \sqrt{3} = 0$  i przechodzącej przez punkt  $P(-1, 1)$   
 b)  $k: 4x + 9y = 0$  i przecinającej oś  $OY$  w punkcie  $P(0, 5)$   
 c)  $k: 2x - 11 = 0$  i przecinającej oś  $OX$  w punkcie  $P(-4, 0)$   
 d)  $k: y - 5 = 0$  i przechodzącej przez punkt  $P(7, \sqrt{2})$ .

**6.42.** Dane są równania ogólne prostych  $k$  i  $m$ . Czy proste  $k$  i  $m$  są prostopadłe? Odpowiedź uzasadnij.

- a)  $k: 5x + 3y - 2 = 0$        $m: -15x + 25y + 10 = 0$   
 b)  $k: 5x + 7 = 0$        $m: 3y - 2 = 0$   
 c)  $k: 4x - 20y + 30 = 0$        $m: 15x - 3y - 2 = 0$   
 d)  $k: -\frac{2}{3}x - \frac{3}{4}y + 1 = 0$        $m: 1,5x - 1\frac{1}{3}y + 2\frac{1}{5} = 0$

**6.43.** Napisz równanie ogólne prostej  $m$  prostopadłej do prostej:

- a)  $k: 5x - y + 3 = 0$  i przechodzącej przez punkt  $P(-1, 2)$   
 b)  $k: y + 4 = 0$  i przechodzącej przez punkt  $P(-\sqrt{7}, \sqrt{2})$

- c)  $k: 10x - 7 = 0$  i przechodzącej przez punkt  $P(3, 8)$   
 d)  $k: -3x + 2y = 0$  i przecinającej oś  $OY$  w punkcie  $P(0, -2)$ .

**6.44.** Oblicz brakujące współczynniki w równaniu ogólnym prostej  $m$ , wiedząc, że:

- a) prosta  $m: Ax - 2y + C = 0$  jest równoległa do prostej  $k: 5x + 14y - 1 = 0$  i przechodzi przez punkt  $P(7, 0)$   
 b) prosta  $m: x + By + C = 0$  jest równoległa do prostej  $k: -3x + 4y - 5 = 0$  i przechodzi przez punkt  $P(1, -3)$   
 c) prosta  $m: 3x + By + C = 0$  jest prostopadła do prostej  $k: -20x + 15y - 7 = 0$  i przechodzi przez początek układu współrzędnych  
 d) prosta  $m: Ax + y + C = 0$  jest prostopadła do prostej  $k: 2x + 4y - 13 = 0$  i przechodzi przez punkt  $P(\frac{1}{2}, 7)$ .

**6.45.** Wyznacz równanie ogólne symetralnej odcinka  $AB$ .

- a)  $A(-4, 5), B(6, 1)$       b)  $A(0, 7), B(0, -3)$   
 c)  $A(-1, -2), B(3, 2)$       d)  $A(-1, 8), B(-5, 8)$

## Równanie okręgu

**6.46.** Napisz równanie okręgu o środku w punkcie  $S$  i promieniu  $r$  w postaci kanonicznej.

- a)  $S(0, 0), r = 3$       b)  $S(0, -2), r = \sqrt{5}$       c)  $S(4, 0), r = 2,5$   
 d)  $S(-3, 1), r = \sqrt{2}$       e)  $S(3, -2), r = \frac{1}{3}$       f)  $S(-\sqrt{3}, -\sqrt{2}), r = 4$

**6.47.** Poniższe równania opisują okrąg o środku w punkcie  $S$  i promieniu  $r$ . Podaj współrzędne punktu  $S$  i promień tego okręgu.

- a)  $x^2 + y^2 = 1$       b)  $(x - 1)^2 + y^2 = 2,25$   
 c)  $(1 + x)^2 + (2 - y)^2 = 25$       d)  $(-x - 3)^2 + (-1 - y)^2 = 81$

**6.48.** Wyznacz współrzędne środka i promień okręgu opisanego równaniem:

- a)  $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$       b)  $x^2 + y^2 + 6x + 10y + 33 = 0$   
 c)  $x^2 + y^2 - 8x + 7 = 0$       d)  $x^2 + y^2 - 2\sqrt{3}y - 6 = 0$   
 e)  $x^2 + y^2 - 2x - 6y + 9 = 0$       f)  $x^2 + y^2 + 4y - 5 = 0$

6.49. Wyznacz współrzędne środka i promień okręgu opisanego równaniem:

a)  $x^2 + y^2 - x - 0,5y - \frac{59}{16} = 0$

b)  $x^2 + y^2 - \sqrt{8}y - 6 = 0$

c)  $x^2 + y^2 + x - \frac{1}{2}y - \frac{11}{16} = 0$

d)  $x^2 + y^2 - 3x + y - 1,5 = 0$

6.50. Czy równanie  $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 10 = 0$  opisuje okrąg? Odpowiedź uzasadnij.

6.51. Dane jest równanie okręgu oraz punkty  $A, B, C$ . Sprawdź algebraicznie, które z tych punktów należą do okręgu. Następnie narysuj okrąg w układzie współrzędnych i zaznacz punkty  $A, B, C$ .

a)  $(x+4)^2 + (y-3)^2 = 25$ ,  $A(-1, 7), B(1, 3), C(-2, 6)$

b)  $x^2 + y^2 + 8x + 2y + 16 = 0$ ,  $A(-4, 0), B(-3, -2), C(-5, -1)$

6.52. Punkt  $A$  należy do okręgu o środku w punkcie  $S$ . Napisz równanie tego okręgu.

a)  $S(0, 0)$ ,  $A(3, 4)$

b)  $S(2, 1)$ ,  $A(4, 2)$

c)  $S(-3, 2)$ ,  $A(3, 10)$

d)  $S(-2, 1)$ ,  $A(4, 7)$

6.53. W prostokątnym układzie współrzędnych zilustruj zbiory:

$$A = \{(x, y) : x \in \mathbf{R} \wedge y \in \mathbf{R} \wedge x^2 + y^2 + 6x - 8y + 21 = 0\}$$

$$B = \{(x, y) : x \in \mathbf{R} \wedge y \in \mathbf{R} \wedge x^2 + y^2 + 2x + 2y - 14 = 0\},$$

a następnie wyznacz zbiory:  $A \cup B$ ,  $A - B$ ,  $B - A$ ,  $A \cap B$ .

6.54. Napisz równanie okręgu przechodzącego przez punkty  $A$  i  $B$ , jeśli jego środek należy do prostej  $k$ .

a)  $A(5, 10)$ ,  $B(3, 12)$ ,  $k: y = -2x - 2$

b)  $A(6, 4)$ ,  $B(-1, 3)$ ,  $k: y = \frac{1}{2}x - 1\frac{1}{2}$

c)  $A(3, 0)$ ,  $B(4, 1)$ ,  $k: y = 2x + 4$

d)  $A(7, 4)$ ,  $B(-5, -12)$ ,  $k: y = x - 5$

6.55. Napisz równanie okręgu przechodzącego przez punkty  $A, B, C$ , jeśli:

a)  $A(-1, 0)$ ,  $B(7, 0)$ ,  $C(0, 1)$

b)  $A(1, 3)$ ,  $B(5, 1)$ ,  $C(4, 4)$

c)  $A(1, 5)$ ,  $B(8, -2)$ ,  $C(9, 1)$

d)  $A(-14, -1)$ ,  $B(3, 16)$ ,  $C(11, 4)$

▷ 6.56. Udowodnij, że jeśli  $a \neq b$ , to równanie  $x^2 + y^2 - ax + 2by - 0,75a^2 + 2ab = 0$  opisuje okrąg. Podaj współrzędne środka  $S$  i promień  $r$  okręgu.

## Wyznaczanie w układzie współrzędnych punktów wspólnych prostych, okręgów i parabol

6.57. Rozwiąż algebraicznie układ równań i przedstaw jego interpretację graficzną.

a)  $\begin{cases} x - y = 1 \\ y = x^2 - 6x + 9 \end{cases}$

b)  $\begin{cases} 2x - y = 0 \\ y = -2(x-1)^2 + 6 \end{cases}$

c)  $\begin{cases} y = -0,5x^2 - 2x + 3 \\ -2x + y = 11 \end{cases}$

d)  $\begin{cases} y = \frac{1}{4}x^2 + x \\ -5x + 2y = -4 \end{cases}$

6.58. Rozwiąż algebraicznie układ równań i przedstaw jego interpretację graficzną.

a)  $\begin{cases} (x-1)^2 + (y-3)^2 = 8 \\ x-2 = y \end{cases}$

b)  $\begin{cases} (x-3)^2 + (y+1)^2 = 16 \\ x + y = 6 \end{cases}$

c)  $\begin{cases} (x+3)^2 + (y-2)^2 = 17 \\ 5x + 3y = -26 \end{cases}$

d)  $\begin{cases} (x+3)^2 + (y+2)^2 = 8 \\ 4x + y = -2 \end{cases}$

6.59. Przedstaw interpretację graficzną danego układu równań w układzie współrzędnych. Następnie rozwiąż ten układ algebraicznie.

a)  $\begin{cases} 3x + y = -13 \\ y = x^2 + 6x + 7 \end{cases}$

b)  $\begin{cases} x^2 + y^2 - 6x - 4y + 8 = 0 \\ x + 3y = 4 \end{cases}$

c)  $\begin{cases} x^2 + y^2 - 4x - 2y + 1 = 0 \\ y = 2x - 5 \end{cases}$

d)  $\begin{cases} y + x^2 + 8x = -14 \\ y = 4x + 22 \end{cases}$

6.60. Wyznacz współrzędne punktów wspólnych (o ile istnieją) prostej  $k$  i okręgu  $o$ .

a)  $k: y = \frac{1}{3}x - 1$ ,  $o: x^2 + y^2 = 9$

b)  $k: y = 1$ ,  $o: (x+5)^2 + y^2 = 1$

c)  $k: x + y = -x - 8$ ,  $o: x^2 + y^2 + 6x + 2y = 0$

d)  $k: x + 2y + 4 = 0$ ,  $o: x^2 + y^2 + 8x + 4y + 19 = 0$


Czy prosta  $k$  jest styczna do okręgu, jest rozłączna z okręgiem, czy jest styczna do tego okręgu?

6.61. Wyznacz współrzędne punktów wspólnych (o ile istnieją) prostej  $k$  i paraboli  $p$ .


- a)  $k: x + y = 0$ ,  $p: y = x^2 - 2$   
 b)  $k: y = x + 3$ ,  $p: y = -2x^2 + 8x - 4$   
 c)  $k: x - 2y + 7 = 0$ ,  $p: y = \frac{1}{2}(x+1)^2$   
 d)  $k: 2x - y - 11 = 0$ ,  $p: y = x^2 - 6x + 5$

6.62. Zapisz równania dwóch krzywych znajdujących się na rysunku poniżej. Następnie oblicz współrzędne punktów wspólnych tych krzywych, wiedząc, że rysunek przedstawia:


a) okrąg o środku  $S$  i prostą  $k$




b) okrąg o środku  $S$  i prostą  $k$



c) parabolę  $p$  i prostą  $k$



d) parabolę  $p$  i prostą  $k$



## Zastosowanie układów równań do rozwiązywania zadań z geometrii analitycznej

6.63. Dane są punkty  $A(-6, 3)$  oraz  $B(0, 5)$ . Na prostej  $k: x - 2y + 4 = 0$  wyznacz współrzędne punktu  $C$ , który jest równoodległy od punktów  $A$  i  $B$ .

6.64. Dane są punkty:  $A(0, 2)$ ,  $B(2, 4)$ ,  $C(6, 2)$ . Wyznacz:

- równania symetralnych odcinków  $AB$  i  $BC$ ,
- współrzędne punktu przecięcia się tych symetralnych,
- odległość punktu przecięcia się tych symetralnych od punktów  $A$ ,  $B$ ,  $C$ .

6.65. Boki trójkąta zawierają się w prostych:  $k: x - 3y + 5 = 0$ ,  $l: x + 2y + 5 = 0$ ,  $m: 3x + y - 5 = 0$ .

- Wykaż, że trójkąt jest prostokątny.
- Wyznacz współrzędne wierzchołków tego trójkąta.

6.66. Dane są punkty  $A(-4, -2)$ ,  $B(3, -1)$ ,  $C(2, 4)$ ,  $D(-3, 3)$ . Oblicz współrzędne punktu przecięcia się przekątnych czworokąta  $ABCD$ .

6.67. Prosta  $k: y = -3x + 8$  przecina okrąg o środku w punkcie  $(1, 0)$  i promieniu 5 w punktach  $A$  i  $B$ . Oblicz:

- współrzędne punktów  $A$  i  $B$
- długość cięciwy  $AB$ .

6.68. Prosta  $k: x - y + 1 = 0$  przecina parabolę  $p: y = -0,5x^2 + 5$  w punktach  $A$  i  $B$ . Napisz równanie okręgu, którego średnicą jest odcinek  $AB$ .

6.69. Punkty  $A(-4, 0)$ ,  $B(4, 4)$ ,  $C(-5, 7)$  są wierzchołkami trójkąta. Odcinek  $CD$  jest wysokością tego trójkąta. Oblicz:

- współrzędne punktu  $D$
- długość wysokości  $CD$ .

6.70. Punkty  $A(-4, 3)$ ,  $B(2, 0)$ ,  $C(2, 5)$  są wierzchołkami trójkąta. Wyznacz:

- równania prostych, zawierających wysokości poprowadzone z wierzchołków  $A$  i  $C$ ,
- punkt przecięcia się wysokości trójkąta (ortocentrum).

6.71. Dany jest okrąg  $o: x^2 + y^2 + 2x - 6y + 1 = 0$ .

- Wykaż, że prosta  $k: y - 6 = 0$  jest styczna do okręgu. Oblicz współrzędne punktu styczności.
- Wyznacz na stycznej punkty, których odległość od środka okręgu jest równa 5. Oblicz odległości tych punktów od punktu styczności.

6.72. Dana jest parabola  $p: y = x^2 - 3$ .

- a) Wyznacz współrzędne punktów  $A$  i  $B$ , będących punktami przecięcia się paraboli  $p$  z prostą  $k: x - y + 3 = 0$ .  
 b) Wyznacz współrzędne punktów  $C$  i  $D$ , będących punktami przecięcia się paraboli  $p$  z prostą  $m: y + 2x = 0$ .  
 c) Wykaż, że odcinki  $AB$  i  $CD$  przecinają się w środku odcinka  $CD$ .

6.73. Dany jest okrąg  $o: x^2 + y^2 - 6y = 0$  oraz punkt  $A(0, 6)$ .

- d) Wykaż, że punkt  $A$  należy do okręgu  $o$ .  
 b) Wyznacz równanie prostej  $k$ , nachylonej do osi  $OX$  pod kątem  $60^\circ$  i przechodzącej przez punkt  $A$ .  
 c) Oblicz współrzędne punktu  $B$ , będącego drugim punktem przecięcia prostej  $k$  z danym okręgiem.  
 d) Wyznacz na okręgu punkt  $C$  tak, aby trójkąt  $ABC$  był równoboczny.

6.74. Punkty  $A, B, C$  należą do paraboli  $p: y = \frac{1}{4}(x-4)^2$  i są wierzchołkami trójkąta

równoramiennego. Wiedząc, że punkt  $C$  jest wierzchołkiem paraboli oraz  $|\angle ACB| = 120^\circ$ , wyznacz współrzędne punktów  $A, B, C$ .


### Test sprawdzający do rozdziału 6.

1. Dane są trzy kolejne wierzchołki równoległoboku  $ABCD: A(2, -2), B(4, 2), C(-2, 3)$ . Wówczas wierzchołek  $D$  ma współrzędne:

- A.  $(0, 7)$       B.  $(-4, -1)$       C.  $(8, -3)$       D.  $(-5, 0)$

2. Prostą  $k$  na rysunku poniżej można opisać równaniem kierunkowym  $y = ax + b$ . Wówczas:

- A.  $a = -2$       B.  $a = -1,5$       C.  $a = -1$       D.  $a = 1$



3. Do prostej  $k$  należą punkty:  $(-1, 2)$ , oraz  $(-1, -4)$ . Zatem prostą  $k$  opisuje równanie:

- A.  $y = 2x - 4$       B.  $y + 1 = 0$       C.  $x + 1 = 0$       D.  $-x + 2y - 4 = 0$

4. Wskaż równanie prostej, równoległej do prostej  $k: 2x - y + 4 = 0$ .

- A.  $-4x + 2y = 0$       B.  $2x + y - 4 = 0$       C.  $2x + 4 = 0$       D.  $x + 2y + 4 = 0$

5. Wskaż równanie prostej, prostopadłej do prostej  $k: y = 4x - 1$ .

- A.  $y = 4x + 1$       B.  $y = -4x - 1$       C.  $y = 0,25x + 1$       D.  $y = -0,25x - 1$

6. Równanie  $y^2 = 4 - (x - 3)^2$  opisuje:

- A. okrąg o środku w punkcie  $(-3, 0)$  i promieniu 4  
 B. okrąg o środku w punkcie  $(3, 0)$  i promieniu 2  
 C. parabolę, której wierzchołkiem jest punkt  $(3, 4)$   
 D. sumę dwóch prostych:  $y = -x + 5$  oraz  $y = x - 1$

7. Proste  $k: -2x + y - 3 = 0$  oraz  $m: 3x - y + 2 = 0$  przecinają się w punkcie o współrzędnych:

- A.  $(1, 5)$       B.  $(-2, 3)$       C.  $(5, 13)$       D.  $(-1, 1)$

8. Kąt nachylenia prostej  $k: \sqrt{3}x + 3y - 1 = 0$  do osi  $OX$  jest równy:

- A.  $30^\circ$       B.  $60^\circ$       C.  $120^\circ$       D.  $150^\circ$

9. Wskaż równanie ogólne prostej, której nie można opisać równaniem kierunkowym.

- A.  $y + 5 = 0$       B.  $x - \sqrt{2} + 1 = 0$       C.  $2x + \sqrt{3}y = 0$       D.  $2y - \sqrt{5} + 2 = 0$

10. Dane są punkty  $A(-3, 4), B(6, 7)$ . Punkt  $P$  należy do odcinka  $AB$  oraz  $|AP| : |PB| = 1 : 2$ . Zatem:

- A.  $P(3, 6)$       B.  $P\left(1\frac{1}{2}, 5\frac{1}{2}\right)$       C.  $P(0, 5)$       D.  $P\left(-1, 4\frac{2}{3}\right)$

11. Wskaż równanie prostej, prostopadłej do prostej  $k: x - 2y + 4 = 0$  i przechodzącej przez punkt  $(0, 3)$ .

- A.  $4x + 2y - 6 = 0$       B.  $2x + y + 3 = 0$   
 C.  $x + 2y - 3 = 0$       D.  $0,5x + y - 3 = 0$

12. Dane jest równanie okręgu:  $x^2 + y^2 + 10x - 6y - 2 = 0$ . Promień tego okręgu jest równy:

- A.  $\sqrt{2}$       B. 2      C. 6      D.  $4\sqrt{2}$

13. Odległość punktu  $A(-2, 1)$  od środka okręgu  $o: (x-2)^2 + (y+2)^2 = 9$  jest równa:
- A.  $\sqrt{17}$       B. 3      C.  $2\sqrt{5}$       D. 5

14. Układ równań  $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x + y = \sqrt{2} \end{cases}$ :

- A. ma jedno rozwiązanie  
B. ma dwa rozwiązania  
C. nie ma rozwiązań  
D. ma nieskończenie wiele rozwiązań

15. Prosta  $k: y = 2x + 1$  przecina parabolę  $p: y = (x-1)^2$  w punktach  $A$  i  $B$ . Środek odcinka  $AB$  ma współrzędne:
- A.  $(0, 5)$       B.  $(2, 5)$       C.  $(1, 3)$       D.  $(1, 5)$

### Zadania powtórzeniowe do rozdziału 6.

16. Punkt  $S(2, 1)$  jest środkiem ciężkości trójkąta  $ABC$ , a punkt  $D(1, 3)$  jest środkiem odcinka  $AB$ . Oblicz współrzędne punktu  $C$ .
17. Dane są punkty:  $A(-3, -1)$ ,  $B(1, 4)$ ,  $C(-1, 7)$ ,  $D(-5, 2)$ . Wykaż, że czworokąt  $ABCD$  jest równoległobokiem.
18. Dane są punkty:  $A(-6, 1)$ ,  $B(3, -2)$ ,  $C(4, 1)$ ,  $D(-5, 4)$ . Wykaż, że czworokąt  $ABCD$  jest prostokątem.
19. Dane są punkty:  $A(-6, 1)$ ,  $B(-1, 2)$ ,  $C(-4, 4)$ . Wykaż, że trójkąt  $ABC$  jest trójkątem prostokątnym równoramiennym.
20. Wyznacz równanie:
- a) prostej, równoległej do prostej  $k: 2x - 3y + 1 = 0$  i przechodzącej przez punkt  $P(-17, 2)$ ,  
b) prostej, prostopadłej do prostej  $k: -x + 5y - 7 = 0$  i przechodzącej przez punkt  $P(-3, 11)$ .
21. Wyznacz równanie prostej, nachylonej do osi  $OX$  pod kątem  $\alpha$  i przechodzącej przez punkt  $P$ , jeśli:
- a)  $\alpha = 30^\circ$ ,  $P(\sqrt{3}, -1)$       b)  $\alpha = 120^\circ$ ,  $P(-\sqrt{6}, \sqrt{8})$       c)  $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ ,  $P(9, -1)$

22. Wyznacz równanie ogólne prostej, do której należą punkty:

a)  $A(5, -6)$ ,  $B(-2, 8)$       b)  $A(-3, 9)$ ,  $B(-3, 12)$

23. Wyznacz równanie symetralnej odcinka  $AB$ , jeśli  $A(-2, 0)$ ,  $B(7, 3)$ .

24. Dane są proste  $k: ax + 2y - 4 = 0$  oraz  $m: 8x + ay - 12 = 0$ . Wyznacz liczbę  $a$ , dla której te proste:

- a) są równoległe      b) są prostopadłe.  
Sprawdź, czy dla wyznaczonej liczby  $a$  istnieje postać kierunkowa równania prostej  $k$  i równania prostej  $m$ .

25. Doprowadź równanie okręgu  $o: x^2 + y^2 + 3x - 5y - 0,5 = 0$  do postaci kanonicznej. Podaj współrzędne środka i promień tego okręgu.

26. Dane są punkty:  $A(-4, -5)$ ,  $B(2, -5)$ ,  $C(-2, -1)$ . Wykaż, że środek okręgu opisanego na trójkącie  $ABC$  ma współrzędne  $(-1, -4)$ , a jego promień jest równy  $\sqrt{10}$ .

27. Dane są punkty  $A(-4, 0)$ ,  $B(2, -2)$  oraz prosta  $k: x + y - 6 = 0$ . Wyznacz na prostej  $k$  punkt  $C$  tak, aby  $|AC| = |BC|$ .

28. Dany jest punkt  $C(-4, 4)$  oraz prosta  $k: x - 5y + 11 = 0$ . Wyznacz na prostej  $k$  punkty  $A$  i  $B$  spełniające warunek:  $|AC| = |BC| = \sqrt{13}$ .

29. Dane są punkty:  $A(-2, 6)$ ,  $B(-4, 0)$ . Wyznacz na osi  $OY$  punkt  $C$  taki, że  $|\angle ACB| = 90^\circ$ .

30. Prosta  $k: y = 3 - x$  przecina parabolę  $p: y = x^2 + 6x + 9$  w punktach  $A$  i  $B$ .

- a) Oblicz współrzędne punktów  $A$  i  $B$ .  
b) Wykaż, że oś symetrii paraboli przecina odcinek  $AB$  w punkcie, który dzieli ten odcinek w stosunku  $3 : 2$ .

31. Rozwiąż dany układ algebraicznie. Następnie przedstaw ilustrację graficzną tego układu.

a)  $\begin{cases} y = \frac{1}{2}x - 3 \\ (x-2)^2 + (y-3)^2 = 20 \end{cases}$       b)  $\begin{cases} y = 2x - 4 \\ y = x^2 - 4x + 1 \end{cases}$

## 7. Geometria płaska – rozwiązywanie trójkątów, pole trójkąta, pole koła

### Twierdzenie sinusów

**7.1.** Oblicz promień okręgu opisanego na trójkącie  $ABC$ , jeśli:

- a)  $|AC| = 3$  oraz  $|\sphericalangle CBA| = 60^\circ$   
 b)  $|BC| = 4$  oraz  $|\sphericalangle BAC| = 150^\circ$   
 c)  $|\sphericalangle A| = 72^\circ$ ,  $|\sphericalangle B| = 63^\circ$ ,  $|AB| = \sqrt{8}$   
 d)  $|\sphericalangle B| + |\sphericalangle C| = 150^\circ$ ,  $|BC| = 13$ .

**7.2.** W trójkącie  $ABC$  kąty są odpowiednio równe  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , a promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy  $R$ . Oblicz:

- a) długość boku  $AB$ , jeśli  $\alpha = 28^\circ$ ,  $\beta = 32^\circ$  oraz  $R = 8$  cm,  
 b) długość boku  $AC$ , jeśli  $\alpha = 65^\circ$ ,  $\gamma = 83^\circ$  oraz  $R = 10$  cm.

**7.3.** W trójkącie  $ABC$  kąty są odpowiednio równe  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ . Oblicz:

- a) długość boku  $AC$ , jeśli  $\alpha = 48^\circ$ ,  $\gamma = 70^\circ$ ,  $|BC| = 5$  cm,  
 b) długość boku  $AB$ , jeśli  $\alpha = 17^\circ$ ,  $\gamma = 32^\circ$ ,  $|AC| = 7,55$  cm.

**7.4.** W trójkącie kąty są odpowiednio równe  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , a boki naprzeciw kątów mają odpowiednio długość  $a$ ,  $b$ ,  $c$ . Oblicz:

- a)  $b$ , jeśli:  $\sin \alpha = \frac{1}{5}$  i  $\cos \beta = \frac{3}{5}$  oraz  $a = 8$  cm,  
 b)  $c$ , jeśli:  $\cos \alpha = -0,174$  i  $\cos \gamma = 0,719$  oraz  $a = 19,7$  cm.

**7.5.** W trójkącie  $ABC$  bok  $AB$  ma długość  $c$ , zaś kąty trójkąta przylegające do boku  $AB$  są równe  $\alpha$  i  $\beta$ . Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie, jeśli:

- a)  $c = 8$  cm i  $\sin(\alpha + \beta) = \frac{2}{3}$       b)  $c = 13,5$  cm i  $\sin(\alpha + \beta) = \frac{3}{4}$   
 c)  $c = 20$  cm i  $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{5}{13}$       d)  $c = 15$  cm i  $\cos(\alpha + \beta) = \frac{8}{17}$

**7.6.** Boki trójkąta leżące naprzeciw kątów  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  mają odpowiednio długość  $a$ ,  $b$ ,  $c$ . Na trójkącie opisano okrąg o promieniu  $R$ . Oblicz:

- a)  $R$ , jeśli  $\operatorname{tg} \gamma = \frac{-3}{4}$ ,  $c = 6$  cm,  
 b)  $a$ , jeśli  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{8}{15}$ ,  $\cos \gamma = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ ,  $c = 17$  cm,  
 c)  $c$ , jeśli  $\operatorname{ctg} \alpha = 1$ ,  $\cos \gamma = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $b = 9,66$  cm,  
 d)  $b$ , jeśli  $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{3}$ ,  $\cos \beta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ,  $c = 19,32$  cm.

**7.7.** W trójkącie  $ABC$  mamy dane:  $|AC| = 3\sqrt{3}$ ,  $|BC| = 3$  oraz  $|\sphericalangle A| = 30^\circ$ . Oblicz miary pozostałych kątów trójkąta.

**7.8.** W trójkącie  $ABC$  mamy dane:  $|AB| = 12$ ,  $|BC| = 6\sqrt{2}$  oraz  $|\sphericalangle A| = 30^\circ$ . Oblicz miary pozostałych kątów trójkąta.

**7.9.** W trójkącie równoramiennym rozwartokątnym najdłuższy bok ma długość 6. Wiedząc, że promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy  $2\sqrt{3}$ , oblicz:

- a) miary kątów trójkąta      b) obwód tego trójkąta.

**7.10.** W trójkącie rozwartokątnym  $ABC$  dane są długości boków:  $|AB| = 3\sqrt{2}$ ,  $|BC| = 3 - \sqrt{3}$ ,  $|AC| = 2\sqrt{3}$ . Wyznacz:

- a) miarę kąta  $ACB$ ,  
 b) promień okręgu opisanego na trójkącie  $ABC$ .

**D 7.11.** Wykaż, że jeśli dwa kąty trójkąta mają po  $30^\circ$ , to długość dwóch boków tego trójkąta jest równa promieniowi okręgu opisanego na tym trójkącie.

### Twierdzenie cosinusów

**7.12.** Dane są długości boków  $a$  i  $b$  oraz kąt między tymi bokami równy  $\gamma$ . Oblicz długość trzeciego boku, jeśli:

- a)  $a = 3$ ,  $b = 9$ ,  $\gamma = 120^\circ$       b)  $a = 2\sqrt{2}$ ,  $b = 6$ ,  $\gamma = 45^\circ$ .

7.13. Boki trójkąta  $ABC$  mają długość:  $|AB| = 8$  cm,  $|BC| = 6$  cm,  $|AC| = 5$  cm. Oblicz cosinusy kątów tego trójkąta. Czy trójkąt jest ostrokątny, prostokątny, czy rozwartokątny?

7.14. Dane są długości boków trójkąta. Sprawdź, czy trójkąt jest ostrokątny, prostokątny czy rozwartokątny. Podaj miarę największego kąta tego trójkąta.

- a)  $a = 10$  cm,  $b = 9$  cm,  $c = 5$  cm  
 b)  $a = 4$  cm,  $b = 10$  cm,  $c = 12$  cm  
 c)  $a = 2\sqrt{2}$  cm,  $b = \sqrt{26}$  cm,  $c = 3\sqrt{2}$  cm

7.15. Długości boków trójkąta  $ABC$  są równe:  $|AB| = \sqrt{14}$  cm,  $|AC| = 3\sqrt{2}$  cm oraz  $|BC| = \sqrt{2}$  cm. Wyznacz miarę kąta przy wierzchołku  $C$ .

7.16. Boki trójkąta  $ABC$  mają długość:  $|BC| = 5$ ,  $|AB| = 2\sqrt{2} - 1$  oraz  $|AC| = 2\sqrt{2} + 1$ . Oblicz miarę kąta przy wierzchołku  $A$ .

7.17. Boki równoległoboku mają długości  $a$  i  $b$ , a kąt ostry jest równy  $\gamma$ . Oblicz długość przekątnych tego równoległoboku, jeśli:

- a)  $a = 4$  cm,  $b = 3\sqrt{2}$  cm,  $\gamma = 45^\circ$       b)  $a = 3$  cm,  $b = 5$  cm,  $\gamma = 30^\circ$ .

7.18. Dwa boki trójkąta  $ABC$  mają długość:  $|AB| = 7$  cm,  $|BC| = 8$  cm. Wiedząc, że  $|\sphericalangle C| = 60^\circ$ , oblicz długość boku  $AC$ .

7.19. W trójkącie  $ABC$  dwa boki mają długość:  $|AB| = 2$  cm i  $|AC| = 4$  cm, a sinus kąta  $BAC$  jest równy  $\frac{\sqrt{15}}{4}$ .

- D) a) Wykaż, że jeśli kąt  $BAC$  jest ostry, to trójkąt  $ABC$  jest równoramienny.  
 b) Oblicz długość boku  $BC$  w przypadku, gdy  $|\sphericalangle BAC| \in (90^\circ, 180^\circ)$ .

7.20. W trójkącie  $ABC$  mamy dane:  $|AC| = 6$  cm,  $|BC| = 4$  cm oraz  $\sin|\sphericalangle ACB| = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ . Oblicz obwód trójkąta  $ABC$ .

7.21. W trójkącie  $ABC$  mamy dane:  $|AC| = 4$ ,  $|BC| = |AB| - 2$  oraz  $|\sphericalangle ACB| = 60^\circ$ . Oblicz obwód trójkąta  $ABC$ .

7.22. W trójkącie  $ABC$  bok  $AC$  jest o 6 cm dłuższy od boku  $AB$  oraz  $|BC| = 5\sqrt{2}$  cm. Wiedząc, że  $|\sphericalangle ABC| = 135^\circ$ , oblicz promień okręgu opisanego na trójkącie  $ABC$ .

7.23. W trójkącie  $ABC$  boki mają długość:  $|AB| = 10$  cm,  $|BC| = 2\sqrt{21}$  cm i  $|AC| = 8$  cm. Oblicz długości środkowych  $CD$  i  $BE$ .

7.24. Boki trójkąta  $ABC$  mają długość:  $|AB| = 18$  cm,  $|BC| = 15$  cm oraz  $|AC| = 12$  cm. Oblicz:

- a) długość środkowej  $CD$ ,  
 b) promień okręgu opisanego na trójkącie  $ADC$ .

7.25. Dwa boki trójkąta  $ABC$  mają długość:  $|AC| = 10$  cm,  $|BC| = 6$  cm. Wiedząc, że  $|\sphericalangle ACB| = 60^\circ$ , oblicz długość środkowej  $CD$ .

## Zastosowanie twierdzenia sinusów i twierdzenia cosinusów do rozwiązywania zadań

7.26. Rozwiąż trójkąt  $ABC$ , w którym  $|AC| = |BC|$ ,  $|AB| = 10$ , a promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 8,5.

7.27. Rozwiąż trójkąt  $ABC$ , w którym:

- a)  $|AC| = 72$ ,  $|BC| = 73$ ,  $|\sphericalangle A| = 49^\circ$   
 b)  $|AC| = 72$ ,  $|BC| = 70$ ,  $|\sphericalangle A| = 49^\circ$ .

7.28. Rozwiąż trójkąt  $ABC$ , w którym:


- a)  $|BC| = 178$ ,  $|AC| = 89$ ,  $|\sphericalangle B| = 30^\circ$   
 b)  $|BC| = 160$ ,  $|AC| = 89$ ,  $|\sphericalangle B| = 30^\circ$ .

D) 7.29. Wykaż, że nie istnieje trójkąt  $ABC$ , w którym  $|BC| = 179$ ,  $|AC| = 89$ ,  $|\sphericalangle B| = 30^\circ$ .


7.30. Boki trójkąta mają długość  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , kąty są odpowiednio równe  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , a  $R$  jest promieniem okręgu opisanego na tym trójkącie. Rozwiąż ten trójkąt, jeśli:

- a)  $a = \sqrt{6}$ ,  $b = 2$ ,  $\beta = 45^\circ$       b)  $a = 2$ ,  $b = \sqrt{2}$ ,  $\alpha = 45^\circ$   
 c)  $R = c = 5$ ,  $\alpha = 60^\circ$       d)  $R = 3$ ,  $a = \sqrt{27}$ ,  $\beta = 45^\circ$ ,  $c < b$ .

7.31. Na rysunku obok punkty  $A, B, C, D$  należą do okręgu o środku  $O$  oraz  $|AD| = |DC|$ . Wiedząc, że  $|BC| = 8, |AC| = |AB| + 6$  i  $|\sphericalangle ABC| = 120^\circ$ , oblicz obwód czworokąta  $ABCD$ .



7.32. W trójkącie prostokątnym równoramiennym  $ABC$  przyprostokątne mają długość:  $|AC| = |BC| = \sqrt{2}$ . Punkty  $D, E$  należą do przeciwprostokątnej  $AB$  oraz  $|\sphericalangle ACD| = |\sphericalangle DCE| = |\sphericalangle ECB|$ . Oblicz długości odcinków  $AD, DE, EB$ .




- 7.33. Wykaż, że jeśli  $\alpha, \beta$  są miarami dwóch kątów trójkąta, a  $R$  – promieniem okręgu opisanego na tym trójkącie, to obwód trójkąta jest równy  $2R[\sin\alpha + \sin\beta + \sin(\alpha + \beta)]$ .
- 7.34. Boki trójkąta mają długość  $a, b, c$ , a kąty są odpowiednio równe  $\alpha, \beta, \gamma$ . Wykaż, że jeśli  $a : b : c = 4 : 5 : 6$ , to  $\cos\beta = \cos^2\alpha$ .
- 7.35. W trójkącie  $ABC$  poprowadzono środkową  $CD$ . Wykaż, że jeśli  $|\sphericalangle BDC| = 60^\circ$ , to  $|AC|^2 - |BC|^2 = |AB| \cdot |CD|$ .


## Pole figury płaskiej

7.36. Pole jednej kratki jest równe 1. Oblicz pola poniższych figur.


a)




b)



c)




d)



7.37. Na rysunku obok dane są trzy figury: kwadrat, trójkąt równoboczny i koło, których pola są odpowiednio równe:  $s, t, w$ . Wyraź pola figur umieszczonych poniżej za pomocą pól  $s, t, w$ .




a)




b)



c)




d)






**7.58.** Punkt  $P$  leży dowolnie wewnątrz trójkąta, jak na rysunku obok. Każdy bok tego trójkąta jest podzielony jednym bokiem odpowiedniego zielonego trójkąta na dwa równe odcinki. Wykaż, że suma pól zielonych trójkątów jest równa sumie pól zielonych trójkątów.



**7.59.** Każdy bok czworokąta jest podzielony dwoma punktami na trzy równe odcinki. Punkt  $P$  jest dowolnym punktem leżącym we wnętrzu czworokąta, (zobacz rysunek obok). Wykaż, że suma pól białych czworokątów jest dwa razy większa od sumy pól zielonych trójkątów.




**7.60.** W trójkącie równoramiennym  $ABC$  podstawa  $AB$  ma długość 10 cm, a wysokość  $CD$  jest równa 12 cm. Oblicz pole trójkąta  $ABE$ , jeśli punkt  $E$  należy do boku  $AC$  oraz:

a)  $|AE| = |EC|$                       b)  $|AE| : |EC| = 2 : 1$ .

**7.61.** W trójkącie  $ABC$  wysokość poprowadzona na podstawę dzieli tę podstawę w stosunku 3 : 5. Wiedząc, że pola powstałych trójkątów różnią się o  $4 \text{ cm}^2$ , oblicz pole trójkąta  $ABC$ .

**7.62.** Przekątne czworokąta dzielą ten czworokąt na cztery trójkąty. Dane są pola trzech trójkątów (zobacz rysunek obok). Oblicz:


- a) stosunek długości odcinków, na jakie punkt przecięcia przekątnych dzieli te przekątne,  
b) pole czwartego trójkąta.



**7.63.** W trapezie  $ABCD$ ,  $AB \parallel DC$ , poprowadzono przekątną, które przecięły się w punkcie  $P$ . Wykaż, że pola trójkątów  $BCE$  i  $APD$  są równe.


**7.64.** W trapezie  $ABCD$ ,  $AB \parallel DC$ , poprowadzono przekątną, które przecięły się w punkcie  $E$ . Pola trójkątów  $ABE$  i  $BCE$  są odpowiednio równe 78 i 52. Oblicz pole trójkąta  $CDE$ .

**7.65.** Pole trójkąta  $ABC$  jest równe  $24 \text{ cm}^2$ . Środkowa  $CD$  ma długość 9 cm, a sinus kąta  $BDC$  jest równy  $\frac{2}{3}$ . Oblicz długość boku  $AB$ .



**7.66.** W trójkącie poprowadzono środkowe, które podzieliły dany trójkąt na sześć mniejszych trójkątów. Wykaż, że pola powstałych trójkątów są równe.

**7.67.** Środkowe  $CD$  i  $BE$  trójkąta  $ABC$  przecinają się pod kątem  $45^\circ$ , jak na rysunku obok. Wiedząc, że  $|BE| = 12 \text{ cm}$  oraz  $|CD| = 21 \text{ cm}$ , oblicz pole trójkąta  $ABC$ .



**7.68.** Dwa boki trójkąta mają długość  $a$  i  $b$ . Kąt zawarty między tymi bokami jest równy  $\gamma$ . Oblicz długość odcinka dwusiecznej kąta  $\gamma$ , zawartego w tym trójkącie, jeśli:

a)  $a = 8$ ,  $b = 6$ ,  $\gamma = 90^\circ$                       b)  $a = 4$ ,  $b = 5$ ,  $\gamma = 60^\circ$

**7.69.** Dwa boki trójkąta  $ABC$  mają długość:  $|AC| = 4$ ,  $|BC| = 6$ , a kąt  $ACB$  ma miarę  $150^\circ$ . Przez wierzchołek  $C$  poprowadzono prostą prostopadłą do boku  $BC$ , która przecięła bok  $AB$  w punkcie  $D$ . Oblicz:

- a) długość odcinka  $CD$                       b) pola trójkątów  $ADC$  i  $CDB$ .

**7.70.** Dwa boki trójkąta  $ABC$  mają długość:  $|AC| = 6$ ,  $|BC| = 12$ , a kąt  $ACB$  ma miarę  $120^\circ$ . Przez punkt  $C$  poprowadzono prostą prostopadłą do boku  $AC$ , która przecięła bok  $AB$  w punkcie  $D$ .

- a) Oblicz długość odcinka  $CD$ .  
b) Wykaż, że punkt  $D$  jest środkiem boku  $AB$ .

## Pole trójkąta, cz. 2

**7.71.** Z kawałka trójkątnego materiału o obwodzie 1,12 m i polu  $504 \text{ cm}^2$  wycięto koło styczne do boków tego trójkąta. Oblicz długość promienia wyciętego koła.

**7.72.** Pole trójkąta jest równe  $63 \text{ cm}^2$ . Oblicz jego obwód wiedząc, że promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy 3 cm.

**7.73.** W trójkącie  $ABC$  dane są kąty:  $|\angle A| = 30^\circ$ ,  $|\angle B| = 45^\circ$ . Wysokość  $CD$  jest równa 3 cm.

- a) Oblicz pole trójkąta  $ABC$ .  
b) Wyznacz promień okręgu wpisanego w ten trójkąt. Podaj przybliżenie dziesiętne wyniku z dokładnością do 0,1 cm.

- 7.74.** Pole trójkąta równoramiennego wynosi  $48 \text{ cm}^2$ , a sinus kąta przy podstawie jest równy  $0,8$ . Oblicz:
- obwód trójkąta,
  - promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.
- 7.75.** Pole trójkąta równoramiennego wynosi  $168 \text{ cm}^2$ . Promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy  $5\frac{1}{4} \text{ cm}$ . Wiadomo, że ramię jest dłuższe od podstawy o  $11 \text{ cm}$ .
- Oblicz długości boków tego trójkąta.
- D** b) Wykaż, że kąt  $\alpha$  między ramionami tego trójkąta jest większy od  $30^\circ$  i jednocześnie mniejszy od  $45^\circ$ .
- 7.76.** Pole trójkąta wynosi  $84 \text{ cm}^2$ , a promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy  $4 \text{ cm}$ . Wiedząc, że długości boków trójkąta są kolejnymi liczbami naturalnymi, wyznacz najkrótszą wysokość tego trójkąta.
- 7.77.** Podstawa trójkąta równoramiennego ma długość  $16 \text{ cm}$ , Wiedząc, że pole tego trójkąta jest równe  $120 \text{ cm}^2$ , oblicz:
- długość ramienia,
  - promień okręgu opisanego na tym trójkącie.
- 7.78.** W trójkącie równoramiennym podstawa ma długość  $32 \text{ cm}$ , a cosinus kąta przy podstawie jest równy  $0,8$ . Oblicz:
- pole tego trójkąta,
  - promień okręgu opisanego na tym trójkącie.
- 7.79.** W trójkącie dwa boki mają długość  $15 \text{ cm}$ , a promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy  $12,5 \text{ cm}$ . Wiedząc, że pole trójkąta jest równe  $108 \text{ cm}^2$ , wyznacz:
- długość podstawy tego trójkąta,
  - promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.
- 7.80.** Dwa boki trójkąta mają długość  $42 \text{ cm}$  i  $20 \text{ cm}$ , a promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy  $21\frac{1}{4} \text{ cm}$ . Wiedząc, że pole trójkąta jest równe  $336 \text{ cm}^2$ , wyznacz:
- długość trzeciego boku,
  - promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.

**7.81.** Dwa boki trójkąta ostrokątnego mają długość  $17 \text{ cm}$  i  $25 \text{ cm}$ , a jego pole jest równe  $210 \text{ cm}^2$ . Oblicz:

- sinus kąta między ramionami trójkąta,
- długość trzeciego boku,
- promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

**7.82.** Dwa boki trójkąta ostrokątnego mają długość  $8$  i  $3$ , a jego pole jest równe  $6\sqrt{3}$ . Oblicz:

- miarę kąta między tymi bokami,
- długość trzeciego boku,
- promień okręgu opisanego na tym trójkącie,
- promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.

**7.83.** Promień okręgu opisanego na trójkącie równoramiennym jest równy  $10$ . Wiedząc, że kąt między ramionami jest równy  $150^\circ$ , oblicz pole tego trójkąta.

**7.84.** Promień okręgu opisanego na trójkącie równoramiennym jest równy  $5\sqrt{3}$ . Wiedząc, że kąty przy podstawie są równe  $30^\circ$ , oblicz pole tego trójkąta.

**7.85.** Boki trójkąta mają długość  $21 \text{ cm}$ ,  $17 \text{ cm}$ ,  $10 \text{ cm}$ . Oblicz:

- pole trójkąta,
- promień okręgu wpisanego w ten trójkąt,
- promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

**7.86.** Boki trójkąta mają długość  $25 \text{ cm}$ ,  $39 \text{ cm}$ ,  $56 \text{ cm}$ . Oblicz:

- wysokości tego trójkąta,
- sinus najmniejszego kąta,
- promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

**7.87.** W trójkącie równoramiennym  $ABC$  podstawa  $AB$  ma długość  $8 \text{ cm}$ . W trójkąt ten wpisano okrąg. Punkty  $D$  i  $E$  są punktami styczności okręgu, odpowiednio z ramionami  $AC$  i  $BC$  tego trójkąta, przy czym  $|DC| + |CE| = |DA| + |AB| + |BE|$ . Oblicz:

- pole trójkąta  $ABC$ ,
- promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.

**7.88.** W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długość 8 cm i 6 cm. Przez wierzchołek kąta prostego poprowadzono prostą, która podzieliła ten trójkąt na dwa trójkąty o równych obwodach. Oblicz:





- pola powstałych trójkątów,
- stosunek promieni okręgów wpisanych w te trójkąty.

## Pola trójkątów podobnych

**7.89.** Trójkąt  $ABC$  ma obwód równy 30 cm, a pole 24 cm<sup>2</sup>. Obwód trójkąta  $A_1B_1C_1$  podobnego do trójkąta  $ABC$  wynosi 15 cm. Oblicz pole trójkąta  $A_1B_1C_1$ .

**7.90.** Trójkąt  $ABC$  ma obwód równy 33 cm, a jego pole wynosi 18 cm<sup>2</sup>. Oblicz obwód trójkąta  $A_1B_1C_1$  podobnego do trójkąta  $ABC$  wiedząc, że pole trójkąta  $A_1B_1C_1$  jest równe 2 cm<sup>2</sup>.

**7.91.** Odcinek  $A_1B_1$  jest równoległy do odcinka  $AB$ . Na podstawie danych na rysunku oblicz stosunek pola trójkąta  $A_1B_1C$  do pola trójkąta  $ABC$ .




**7.92.** Podstawa  $AB$  trójkąta  $ABC$  ma długość 24 cm. Na boku  $AC$  zaznaczono punkty  $A_1, A_2$ , a na boku  $BC$  punkty  $B_1, B_2$  w taki sposób, że  $A_1B_1 \parallel AB$  i  $A_2B_2 \parallel AB$ . Wiedząc, że  $|A_1B_1| = 8$  cm,  $|A_2B_2| = 20$  cm, oblicz stosunek pól:

- trójkątów  $A_1B_1C, A_2B_2C$  i  $ABC$
- wielokątów  $A_1B_1C, A_2B_2B_1A_1$  i  $ABB_2A_2$ .


**7.93.** W trójkącie ostrokątnym poprowadzono dwie proste równoległe do podstawy, które podzieliły wysokość trójkąta opuszczoną na tę podstawę na trzy odcinki równej długości. Oblicz stosunek pól powstałych w wyniku tego podziału figur.

**7.94.** Stosunek pól dwóch trójkątów podobnych  $A_1B_1C_1$  i  $ABC$  wynosi  $\frac{4}{9}$ . Wiedząc, że podstawa  $A_1B_1$  trójkąta  $A_1B_1C_1$  jest o 7 cm krótsza od podstawy  $AB$  trójkąta  $ABC$ , oblicz  $|A_1B_1|$  i  $|AB|$ .

**7.95.** Odcinki  $KL$  i  $MN$  są równoległe do podstawy  $AB$  trójkąta  $ABC$ . Stosunek pól figur  $KLC, MNLK$  i  $ABNM$  w podanej kolejności wynosi 1 : 8 : 7. Oblicz  $|KL| : |MN| : |AB|$ .



**7.96.** W trójkącie  $ABC$  na rysunku obok punkt  $E$  należy do boku  $AC$  oraz  $|EC| : |AE| = 1 : 3$ ; natomiast punkt  $F$  jest środkiem odcinka  $BC$ . Proste prostopadłe do podstawy  $AB$  i przechodzące odpowiednio przez punkty  $E$  i  $F$  odcięły dwa trójkąty, których pola są odpowiednio równe 9 i 2. Oblicz pole trójkąta  $ABC$ .




**7.97.** W trójkącie równoramiennym  $ABC$  podstawa  $AB$  ma długość 40 cm. W trójkąt wpisano koło, które jest styczne do ramion trójkąta w punktach  $D$  i  $E$ . Wiedząc, że  $|DE| = 8$  cm, oblicz:

- pole trójkąta  $DEC$
- pole czworokąta  $ABED$ .

**7.98.** W trójkąt równoramienny  $ABC$  o bokach długości 13 cm, 13 cm, 10 cm wpisano koło. Styczna do koła, równoległa do podstawy, odcina od trójkąta  $ABC$  trójkąt  $DEC$ . Oblicz pole trójkąta  $DEC$ .

**7.99.** W trójkącie prostokątnym  $ABC$  przyprostokątne  $AC$  i  $AB$  mają odpowiednio długość 8 cm i 12 cm. Na przyprostokątnej  $AB$  obrano punkt  $D$  tak, że  $|\angle ADC| = |\angle ACB|$ . Oblicz pole trójkąta  $ADC$ .

**7.100.** W trójkącie prostokątnym  $ABC$ ,  $|\sphericalangle A| = 90^\circ$ , przyprostokątna  $AC$  ma długość 12 cm. Odcinek  $DE$ , prostopadły do przeciwprostokątnej  $BC$ , dzieli trójkąt na dwie figury o polach równych  $P_1 = 6 \text{ cm}^2$  i  $P_2 = 90 \text{ cm}^2$ . Oblicz długości boków trójkąta  $DBE$ .



**7.101.** W trójkącie prostokątnym  $ABC$  stosunek przyprostokątnych jest równy  $|AB| : |AC| = 4 : 3$ . Punkt  $D$  dzieli przyprostokątną  $AB$  na odcinki takie, że  $|DB| = 3|AD|$ . Punkt  $E$  należy do przeciwprostokątnej  $BC$  i odcinek  $DE$  jest prostopadły do boku  $BC$ . Oblicz, jakim procentem pola trójkąta  $ABC$  jest pole trójkąta  $DBE$ .


**7.102.** W trójkącie prostokątnym  $ABC$  stosunek przyprostokątnych jest równy  $|AC| : |AB| = 5 : 12$ . Punkt  $D$  należy do przeciwprostokątnej  $BC$  oraz  $|CD| : |DB| = 5 : 8$ . Punkt  $E$  należy do przyprostokątnej  $AB$  i  $ED \perp CB$ . Oblicz stosunek pola czworokąta  $AEDC$  do pola trójkąta  $EBD$ .

**7.103.** W trójkącie ostrokątnym równoramiennym  $ABC$ ,  $|AC| = |BC|$ , poprowadzono wysokości  $CD$  i  $BE$ . Pole trójkąta  $ABE$  jest o 44% większe od pola trójkąta  $ADC$ . Wiedząc, że obwód trójkąta  $ABC$  jest równy 80 cm, oblicz pole trójkąta  $ABC$ .

**7.104.** Cięgiwy  $AB$  i  $CD$  koła przecinają się w punkcie  $E$ . Wiedząc, że  $|\sphericalangle BED| = 30^\circ$ ,  $|AE| = 6 \text{ cm}$ ,  $|ED| = 3 \text{ cm}$  oraz  $|EB| = 2 \text{ cm}$ , oblicz pole trójkąta  $AEC$ .

**7.105.** W kole poprowadzono cięgiwy  $AB$  i  $CD$ , które przecięły się w punkcie  $E$ . Pole trójkąta  $AEC$  jest o  $210 \text{ cm}^2$  większe od pola trójkąta  $EDB$ . Wiedząc, że  $|AE| = 40 \text{ cm}$ ,  $|ED| = 16 \text{ cm}$  oraz  $|BE| = 10 \text{ cm}$ , oblicz:



- długość odcinka  $CE$ ,
- pola trójkątów  $AEC$  i  $EDB$ ,
- miarę kąta przecięcia się cięgiwy  $AB$  z cięgiwą  $CD$ .




## Pole koła, pole wycinka koła

**7.106.** Średnicę  $AB$  koła podzielono na cztery równe odcinki. Oblicz, jaką część pola tego koła stanowi figura zaznaczona kolorem zielonym, jeśli:

- określi wyznaczające tę figurę są styczne wewnętrzne, a ich średnice są zawarte w średnicy  $AB$
- łuk wewnątrz koła jest sumą dwóch półokręgów (patrz rysunek poniżej).



**7.107.** Każde z czterech mniejszych kół ma promień 1. Większe koło ma promień 2. Wykaż, że pole figury zielonej jest równe polu figury szarej.



**7.108.** Promień koła jest równy  $r$ . Kąt wycinka tego koła ma miarę  $\alpha$ . Oblicz pole wycinka, jeśli:


- $r = 9 \text{ cm}$ ,  $\alpha = 20^\circ$
- $r = 12 \text{ cm}$ ,  $\alpha = 150^\circ$
- $r = 5 \text{ cm}$ ,  $\alpha = 54^\circ$ .

**7.109.** Pole wycinka koła jest równe  $P$ , a łuk tego wycinka ma długość  $L$ . Oblicz promień koła, jeśli:

- $P = 10\pi \text{ cm}^2$ ,  $L = 2,5\pi \text{ cm}$
- $P = 30 \text{ cm}^2$ ,  $L = 12 \text{ cm}$
- $P = 210\pi \text{ cm}^2$ ,  $L = 14\pi \text{ cm}$ .

**7.110.** Dane jest koło o środku w punkcie  $O$  i promieniu  $r$ . Oblicz pole odcinka tego koła (zaznaczonego na rysunku obok), wyznaczonego przez łuk długości  $L$ , jeśli:

- $r = 2$ ,  $L = \pi$
- $r = 3$ ,  $L = 2\pi$
- $r = 6$ ,  $L = 5\pi$ .




**7.111.** Stosunek pola trójkąta do pola koła wpisanego w ten trójkąt jest równy  $6 : \pi$ . Wiedząc, że średnica tego koła ma długość 6 cm, oblicz obwód trójkąta.

**7.112.** W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych jest dwa razy krótsza od przeciwprostokątnej. Oblicz stosunek pola koła wpisanego w ten trójkąt do pola koła opisanego na tym trójkącie.


**7.113.** Kąt wpisany w okrąg ma miarę  $45^\circ$  i jest oparty na łuku długości  $3\pi$  cm. Oblicz pole wycinka koła, wyznaczonego przez ten sam łuk.

**7.114.** Wycinek koła jest wyznaczony przez kąt środkowy, zaznaczony na rysunku poniżej. W wycinek wpisano koło o polu  $P$ . Oblicz pole wycinka, jeśli:


a)  $P = 4\pi \text{ cm}^2$



b)  $P = 9\pi \text{ cm}^2$



**7.115.** W wycinek koła o promieniu 6 cm wpisano okrąg o promieniu 2 cm (zobacz rysunek obok). Oblicz pole wycinka koła.



**7.116.** W kole z jednego punktu okręgu poprowadzono dwie cięciwy; każda ma długość 6 cm. Wiedząc, że utworzyły one kąt  $60^\circ$ , oblicz pole części koła zawartej między tymi cięciami.


**7.117.** Odległość środków dwóch kół o jednakowych promieniach  $r$  wynosi  $r$ . Oblicz pole części wspólnej tych kół.

**7.118.** Podstawa trójkąta równobocznego jest średnicą koła o promieniu  $r$ . Oblicz stosunek pola części koła leżącej na zewnątrz trójkąta do pola części koła leżącej wewnątrz tego trójkąta.


**7.119.** W kąt o mierze  $60^\circ$  wpisano dwa koła styczne do ramion kąta i styczne ze sobą wewnątrz siebie. Wyznacz pole większego koła, jeśli pole mniejszego jest równe 5.

## Zastosowanie pojęcia pola w dowodzeniu twierdzeń

**D 7.120.** Trójkąt  $ABC$  jest trójkątem prostokątnym o przeciwprostokątnej  $BC$ . Z punktu  $M$  leżącego na boku  $BC$  poprowadzono odcinki  $MD$  oraz  $MS$  prostopadłe odpowiednio do przyprostokątnych  $AC$  oraz  $AB$ . Wykaż, że  $\frac{|MD|}{|AB|} + \frac{|MS|}{|AC|} = 1$ .



**D 7.121.** W trójkąt prostokątny, którego przyprostokątne mają długość  $a$  i  $b$ , gdzie  $a > b$ , wpisano prostokąt, jak na rysunku obok. Stosunek boków prostokąta jest równy  $1 : 2$ . Wykaż, że długość krótszego boku prostokąta jest równa  $\frac{ab}{2a+b}$  lub  $\frac{ab}{a+2b}$ . W którym przypadku pole prostokąta jest większe?



**D 7.122.** Punkt  $M$  należy do podstawy  $AB$  trójkąta równoramiennego  $ABC$ ,  $M \neq A$  i  $M \neq B$ . Wykaż, że suma odległości punktu  $M$  od ramion trójkąta jest równa długości wysokości trójkąta, poprowadzonej z punktu  $A$ .

**D 7.123.** Boki trójkąta mają długość  $a$ ,  $b$ ,  $c$ . Wysokości opuszczone na te boki są odpowiednio równe  $h_a$ ,  $h_b$ ,  $h_c$ . Wykaż, że jeśli  $h_a + h_b = h_c$ , to  $c = \frac{ab}{a+b}$ .

**D 7.124.** W trójkącie  $ABC$  dane są:  $|\angle ACB| = 135^\circ$  oraz  $|BC| = a$ . Wykaż, że jeśli środkowa  $CD$  tego trójkąta jest prostopadła do boku  $BC$ , to:

a)  $|CD| = \frac{a}{2}$


b)  $|AC| = a\sqrt{2}$ .

**D 7.125.** W trójkącie dwa boki mają długość  $a$  i  $b$ , a kąt zawarty między nimi jest równy  $\alpha$ . Niech  $x$  oznacza długość odcinka dwusiecznej tego kąta, zawartego w tym trójkącie. Wykaż, że:

a) jeśli  $\alpha = 120^\circ$ , to  $x = \frac{ab}{a+b}$

b) jeśli  $\alpha = 90^\circ$ , to  $x = \frac{ab\sqrt{2}}{a+b}$ .

- 7.126.** Punkt  $D$  należy do podstawy  $AB$  trójkąta równoramiennego  $ABC$ . Półprosta  $CD$  dzieli kąt przy wierzchołku  $C$  na kąty  $\alpha$  i  $\beta$ , jak na rysunku obok. Wykaż, że  $\frac{|AD|}{|DB|} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$ .



## Test sprawdzający do rozdziału 7.

1. Trójkąt prostokątny równoramienny ma pole równe  $2 \text{ cm}^2$ . Z tego wynika, że przyprostokątna ma długość:


A.  $\sqrt{2} \text{ cm}$       B.  $2 \text{ cm}$       C.  $2\sqrt{2} \text{ cm}$       D.  $4 \text{ cm}$

2. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długość  $7 \text{ cm}$  i  $24 \text{ cm}$ . Niech  $h$  oznacza odległość wierzchołka kąta prostego od przeciwprostokątnej tego trójkąta. Wówczas:

A.  $h = 3\frac{9}{25} \text{ cm}$       B.  $h = 12,5 \text{ cm}$       C.  $h = 6,72 \text{ cm}$       D.  $h = 5\frac{23}{25} \text{ cm}$

3. Pole jednej kratki wynosi  $1$ . Pole figury na rysunku obok jest równe:

A.  $8$       B.  $8,5$   
C.  $9$       D.  $9,5$



4. Trójkąt  $A_1B_1C_1$  o polu  $36 \text{ cm}^2$  jest podobny do trójkąta  $ABC$  o polu  $4 \text{ cm}^2$ . Skala podobieństwa trójkąta  $A_1B_1C_1$  do trójkąta  $ABC$  jest równa:


A.  $3$       B.  $9$       C.  $12$       D.  $\frac{1}{9}$

5. Wysokość trójkąta prostokątnego poprowadzona na przeciwprostokątną dzieli ją na dwa odcinki, długości  $2 \text{ cm}$  i  $8 \text{ cm}$ . Pole tego trójkąta jest równe:

A.  $16 \text{ cm}^2$       B.  $20 \text{ cm}^2$       C.  $24 \text{ cm}^2$       D.  $28 \text{ cm}^2$

6. Na boku  $AC$  trójkąta  $ABC$  zaznaczono punkty  $D, E$  w taki sposób, że  $|AE| = |ED| = |DC|$ . Przez punkty  $E, D$  poprowadzono proste równoległe do boku  $AB$ , które podzieliły trójkąt na trzy rozłączne figury o polach równych odpowiednio  $P_1, P_2, P_3$  (zobacz rysunek obok). Zatem:

A.  $P_2 : P_3 = 1 : 2$       B.  $P_2 : P_3 = 2 : 3$   
C.  $P_2 : P_3 = 4 : 9$       D.  $P_2 : P_3 = 3 : 5$



7. Odcinek  $CD$  jest środkową w trójkącie  $ABC$ . Trójkąt  $DBC$  ma pole równe  $3 \text{ cm}^2$ . Pole trójkąta  $ABC$  wynosi:

A.  $4,5 \text{ cm}^2$       B.  $5 \text{ cm}^2$       C.  $6 \text{ cm}^2$       D.  $7,5 \text{ cm}^2$

8. Boki trójkąta mają długość:  $3, 4, 5$ . Pole koła opisanego na tym trójkącie jest równe:

A.  $5\pi$       B.  $6,25\pi$       C.  $10\pi$       D.  $25\pi$

9. Boki trójkąta mają długość:  $13, 14, 15$ . Pole tego trójkąta jest równe:


A.  $105$       B.  $91$       C.  $84$       D.  $42$

10. W trójkącie dwa boki mają długość  $8 \text{ cm}$  i  $5 \text{ cm}$ , a kąt między tymi bokami jest równy  $150^\circ$ . Pole tego trójkąta jest równe:

A.  $20 \text{ cm}^2$       B.  $10\sqrt{3} \text{ cm}^2$       C.  $10\sqrt{2} \text{ cm}^2$       D.  $10 \text{ cm}^2$

11. Na rysunku obok punkty  $A$  i  $B$  są środkami dwóch sąsiednich boków kwadratu. Jaką część pola kwadratu stanowi pole trójkąta  $ABC$ ?

A.  $\frac{1}{4}$       B.  $\frac{1}{3}$       C.  $\frac{3}{8}$       D.  $\frac{2}{5}$




12. Pole trójkąta wynosi  $48 \text{ cm}^2$ . Promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy  $3 \text{ cm}$ . Obwód tego trójkąta jest równy:

A.  $16 \text{ cm}$       B.  $32 \text{ cm}$       C.  $72 \text{ cm}$       D.  $144 \text{ cm}$

13. Na rysunku obok dany jest wycinek koła, którego kąt jest równy  $45^\circ$ . Jeśli łuk tego wycinka ma długość  $\pi$ , to pole koła jest równe:


A.  $\pi$       B.  $4\pi$   
C.  $8\pi$       D.  $16\pi$



14. Pole wycinka koła o promieniu 12 cm jest równe  $60\pi \text{ cm}^2$ . Kąt środkowy, wyznaczający dany wycinek koła jest równy:  
 A.  $150^\circ$       B.  $135^\circ$       C.  $120^\circ$       D.  $90^\circ$

15. Dane są dwa okręgi współśrodkowe. Cięciwa  $AB$  większego okręgu ma długość 10 cm i jest styczna do mniejszego okręgu. Pole pierścienia kołowego wyznaczonego przez te okręgi jest równe:

- A.  $25\pi \text{ cm}^2$       B.  $100\pi \text{ cm}^2$   
 C.  $50\pi \text{ cm}^2$       D.  $75\pi \text{ cm}^2$



### Zadania powtórzeniowe do rozdziału 7.

16. Boki trójkąta mają długości:  $a = \sqrt{8}$ ,  $b = \sqrt{12}$ ,  $c = \sqrt{6} - \sqrt{2}$ . Oblicz miary kątów tego trójkąta.

17. Boki trójkąta mają długość  $a, b, c$ ; kąty są odpowiednio równe  $\alpha, \beta, \gamma$ ;  $R$  jest promieniem okręgu opisanego na tym trójkącie. Rozwiąż ten trójkąt, jeśli:

- a)  $a = \sqrt{6}$ ,  $b = 2$ ,  $\beta = 45^\circ$       b)  $a = 2$ ,  $b = \sqrt{2}$ ,  $\alpha = 45^\circ$   
 c)  $R = c = 5$ ,  $\alpha = 60^\circ$       d)  $R = 3$ ,  $a = \sqrt{27}$ ,  $\beta = 45^\circ$ ,  $c < b$ .

18. Oblicz długości boków trójkąta równoramiennego, którego pole jest równe  $25\sqrt{2}$ , a kąt między ramionami jest równy  $45^\circ$ .

19. W trójkącie  $ABC$  bok  $BC$  ma długość 16 cm oraz  $\angle ACB = 120^\circ$ . Wiedząc, że promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 16 cm, wyznacz:

- a) pozostałe kąty trójkąta  $ABC$ ,  
 b) wysokość poprowadzoną z wierzchołka  $C$ ,  
 c) długość środkowej  $AD$ .

20. W trójkącie prostokątnym cosinus jednego z kątów ostrych jest równy  $\frac{3}{5}$ . Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 12,5 cm. Oblicz odległość wierzchołka kąta prostego od przeciwprostokątnej.

21. Pole trójkąta prostokątnego wynosi  $240 \text{ cm}^2$ , a tangens jednego z kątów ostrych jest równy  $1\frac{7}{8}$ . Oblicz promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.

22. Boki trójkąta mają długość: 13 cm, 20 cm, 21 cm. Oblicz:  
 a) pole tego trójkąta,  
 b) sinus największego kąta,  
 c) promień okręgu wpisanego w trójkąt,  
 d) promień okręgu opisanego na trójkącie.

23. Dwa boki trójkąta mają długość 8 i 5, a kąt między tymi bokami jest równy:  $\alpha = 60^\circ$ . Oblicz:

- a) długość trzeciego boku trójkąta,  
 b) wysokość poprowadzoną na trzeci bok,  
 c) długość odcinka dwusiecznej kąta  $\alpha$ , zawartego w tym trójkącie,  
 d) długość środkowej poprowadzonej z wierzchołka kąta  $\alpha$ .

24. Dwa boki trójkąta mają długość 28 cm i 25 cm, a promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy  $14\frac{1}{6}$  cm. Wiedząc, że pole trójkąta wynosi  $210 \text{ cm}^2$ , wyznacz:


- a) długość trzeciego boku,  
 b) promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.

25. Dwa boki trójkąta mają długość:  $a = 7$  cm,  $b = 8$  cm. Promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy  $\sqrt{5}$  cm. Wiedząc, że pole trójkąta wynosi  $12\sqrt{5} \text{ cm}^2$ , oblicz:

- a) długość trzeciego boku,  
 b) sinusy kątów tego trójkąta.

26. Punkty  $D, E, F$  są środkami boków trójkąta  $ABC$ . Punkty  $G, H$  należą do odcinka  $DE$ . Wykaż, że:

- a) pola trójkątów  $AFG, FBH$  oraz  $DEC$  są równe,  
 b) suma pól trójkątów zielonych jest równa polu jednego białego trójkąta.



27. W danym trójkącie poprowadzono dwusieczną jednego z kątów. Wykaż, że jeśli pola powstałych dwóch trójkątów są równe, to dany trójkąt jest równoramienny.

28. W trójkącie  $ABC$  dane są:  $|AC| = 20$ ,  $|BC| = 15$  i  $\angle C = 30^\circ$ . Punkt  $D$  należy do boku  $BC$  oraz pole trójkąta  $ADC$  jest dwa razy większe od pola trójkąta  $ABD$ . Oblicz  $|AD|$ .



**8.6.** Podaj przykład wielomianu jednej zmiennej rzeczywistej  $x$ :

- a) stopnia siódmego, który jest uporządkowany rosnąco i ma tylko trzy wyrazy różne od zera,  
 b) stopnia dziewiątego, który jest uporządkowany malejąco i ma tylko pięć wyrazów różnych od zera.

**8.7.** Dany jest wielomian  $W(x)$ . Oblicz jego wartość dla podanych obok wielomianu liczb.

a)  $W(x) = -x^3 + 4x^2 - 7$ ;  $-3, -1, 4, 5$

b)  $W(x) = x^3 - x^2 + 1$ ;  $\sqrt{2} + 1, \sqrt{3} - \sqrt{2}$

**8.8.** Podaj przykład wielomianu  $W(x)$  zmiennej rzeczywistej  $x$ :

- a) stopnia piątego, który ma tylko trzy wyrazy różne od zera oraz dla  $x = -1$  przyjmuje wartość 6,  
 b) stopnia czwartego, który dla  $x = -\sqrt{2}$  przyjmuje wartość 0.

**8.9.** Wyznacz sumę wszystkich współczynników wielomianu  $W(x)$ , jeśli:

a)  $W(x) = 8x^7 - 2x^5 + 4x^3 - 10$

b)  $W(x) = -12x^5 + 6x^3 + 4x + 1$

c)  $W(x) = (3x^{10} - 2x^{11})^{50}$

d)  $W(x) = (-4x^7 + 2x^3)^5$ .

**8.10.** Wyznacz współczynnik  $a$  wielomianu  $W(x) = -x^4 - 2x^3 + ax + 3$ , jeśli  $W(-2) = -1$ .

**8.11.** Wyznacz współczynniki  $a$  i  $b$  wielomianu  $W(x) = -5x^3 + ax + b$  wiedząc, że  $W(-1) = 2$  oraz  $W(2) = -31$ .

**8.12.** Wyznacz współczynniki  $a$  i  $b$  wielomianu  $W(x) = 2x^4 + ax^3 + x + b$  wiedząc, że  $W(1) = -5$  oraz  $W(-1) = -1$ .

**8.13.** Jeden ze współczynników wielomianu  $W(x) = ax^3 + bx^2 + cx$  jest wyznaczony przez warunek  $W(1) + W(-1) = 8$ . Podaj wartość tego współczynnika.

**8.14.** Wyznacz współczynnik  $a$  wielomianu  $W(x) = x^4 + ax - 4$ , wiedząc, że  $W(\sqrt{2} - 1) = W(1 - \sqrt{2})$ .

**8.15.** Suma wszystkich współczynników wielomianu

$W(x) = 3x^3 - (2a + b)x^2 + (a - b)x + 6$  jest równa 8 oraz  $W(-2) = -82$ . Oblicz  $a$  i  $b$ .

**8.16.** Suma wszystkich współczynników wielomianu  $W(x) = 5x^3 + (2a^2 - 3)x^2 + (a + 1)x + 2$  jest równa 11. Oblicz  $a$ .

**8.17.** Suma wszystkich współczynników wielomianu  $W(x) = -2x^4 + (a - a^2)x^3 + b - 4$  jest równa  $-6$  oraz  $W(0) = 8$ . Oblicz  $a$  i  $b$ .

## Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów

**8.18.** Dane są wielomiany  $W(x)$  i  $P(x)$ . Wyznacz wielomian  $W(x) + P(x)$ .

a)  $W(x) = -4x^7 + 2x^5 - 3x^2 + 6$

$P(x) = 4x^7 - 3x^5 + 2x^3 + 4x^2 - 8$

b)  $W(x) = 3x^5 - 8x^4 + 2x^3 - x$

$P(x) = 9x^5 + 9x^4 - 6x^3 + 1$

c)  $W(x) = 3 - 4x^2 + 8x^3 + x^4$

$P(x) = -x^4 - 8x^3 + 2x$

d)  $W(x) = \frac{1}{4}x^6 - \frac{1}{2}x^5 + 6x^3 - \frac{1}{8}$

$P(x) = -0,25x^6 + 0,5x^5 - 8x^3 + 0,125$

**8.19.** Dane są wielomiany  $W(x)$  i  $P(x)$ . Wyznacz wielomian  $W(x) - P(x)$ .

a)  $W(x) = \frac{3}{4}x^7 - \frac{3}{8}x^6 + \frac{1}{8}x^5 + 8$

$P(x) = 0,75x^7 + \frac{5}{8}x^6 + 0,125x^5 + 2$

b)  $W(x) = 4x^3 - 12x^2 + 0,6x + 0,4$

$P(x) = -4x^3 - 12x^2 + 0,5x + 0,4$

c)  $W(x) = 3x^6 - \sqrt{2}x^5 + 2\sqrt{2}x^3 + 8x$

$P(x) = 5x^6 - 2\sqrt{2}x^5 + 4x - 1$

d)  $W(x) = \sqrt{2}x^4 - 3\sqrt{3}x^3 + 4x^2 + 1$

$P(x) = x^4 - x^3 + \sqrt{3}x^2 - \sqrt{2}$

**8.20.** Wykonaj działania:

a)  $(2x^6 - 3x^4 + 2x) - (x^4 + 8x^2 + 4x - 1) + x^6 + 5x^4 + 6x^2$

b)  $(-3x^4 + 5x^3 - 6) - (4x^4 + 2x^3 + 4x) - (-7x^4 + 3x^3 + 8)$

c)  $7x^7 - 6x^5 + 2x - (4x^5 + 3x^2 - 6) - (7x^7 - 10x^5)$

d)  $12x^3 - (x^7 + 4x^3) - (14x^3 - 5x^7)$ .

**8.21.** Dany jest wielomian  $W(x) = -3x^3 + 4x^2 + 2x - 1$ . Wyznacz wielomian  $F(x)$  i uporządkuj go malejąco, jeśli:

a)  $F(x) = 4 \cdot W(x)$

b)  $F(x) = -0,5 \cdot W(x)$

c)  $F(x) = x^2 \cdot W(x)$

d)  $F(x) = (x - 1) \cdot W(x)$

e)  $F(x) = (x^2 + 3x) \cdot W(x)$

f)  $F(x) = (2x^2 - 3) \cdot W(x)$ .

**8.22.** Dane są wielomiany:  $W(x) = -3x^3 + 2x^2 + 5x - 1$ ,  $P(x) = 2x^2 + 3x$  oraz  $G(x) = x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 7$ . Wykonaj działania:

- a)  $P(x) + 2G(x)$   
 b)  $3P(x) - 2W(x)$   
 c)  $W(x) - [P(x) - G(x)]$   
 d)  $W(x) + G(x) - 3P(x)$

**8.23.** Dane są wielomiany:  $W(x) = 3x^2 - 2$ ,  $P(x) = x^3 + 2x - 1$  oraz  $G(x) = 4x^2 - 3x + 1$ . Wykonaj działania:

- a)  $W(x) \cdot P(x)$   
 b)  $P(x) \cdot G(x)$   
 c)  $[W(x)]^2 \cdot G(x)$   
 d)  $[P(x)]^2 \cdot W(x)$

**8.24.** Wykonaj mnożenie:

- a)  $(x^7 - x^6)(x^5 - x^2)$   
 b)  $(x^{12} - 1)(x^3 + x^4)$   
 c)  $(x^7 - x^6 - 1)(x^5 + x^3)$   
 d)  $(x^4 - x^3 - x^2)(x^5 + 1)$

**8.25.** Wykonaj działania:

- a)  $(3x^2 - 4x)(3x^2 + 4x)$   
 b)  $(5x^3 - 6x)^2$   
 c)  $(3x^7 + 2x)^2$   
 d)  $(9x^7 - x^3)(9x^7 + x^3)$

**8.26.** Wykaż, że  $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac$ . Następnie wykonaj działania:

- a)  $(x^2 - x + 1)^2 - (x^2 + x + 1)^2$   
 b)  $(3x^2 - x + 2)^2 - (3x^2 + x + 2)^2$   
 c)  $(x^2 + x)^2 + (3x^2 + 1)^2$   
 d)  $(2x^2 - 3x)^2 + (x^2 + 4x)^2$

**8.27.** Wykonaj działania:

- a)  $(x^3 - 2x + 1)(x^2 + 1) + (x^4 + 3x + 2)(x^3 - 2x)$   
 b)  $(2x^4 - 3x + 5)(x^3 + 4x + 1) + (x^3 + 2x)(x^4 - 4x^2)$   
 c)  $(3x^3 - 2x^2 + 5x + 1)(x + 2) + (x^3 + 4x^2 - 1)(x^2 + 5x)$   
 d)  $(x^3 - 2x^2 + 4x + 5)(x^2 - 1) - (x^3 - 4x^2 + 2x - 3)(x^2 + 2x)$

**8.28.** Określ stopień wielomianu  $W(x)$  oraz podaj wyraz wolny i współczynnik tego wielomianu przy najwyższej potędze zmiennej  $x$  - bez wykonywania działań.

- a)  $W(x) = (-3x^4 + 1)(2x^3 - 5)^3$   
 b)  $W(x) = (4x^2 - 1)(3x^3 + 2)(x^5 - 4)$   
 c)  $W(x) = (3x + 1)^2(2x^4 - 5)$   
 d)  $W(x) = -2x^6(x^3 + 1)^4(2 - 3x)^2$

## Równość wielomianów

**8.29.** Sprawdź, czy wielomiany  $W(x)$  i  $P(x)$  są równe, jeśli:

- a)  $W(x) = (3x - 1)(4 - 2x)(x + 1)$   
 $P(x) = -6x^3 + 8x^2 + 10x - 4$   
 b)  $W(x) = (3 - 5x)^2(x^2 - 1) - 25x^4$   
 $P(x) = -30x^3 - 16x^2 + 30x - 9$   
 c)  $W(x) = (-2x + 1)^3$   
 $P(x) = -8x^3 + 12x^2 - 12x + 1$   
 d)  $W(x) = 3x^5 - (2x^2 + 1)(x^3 - 1)$   
 $P(x) = x^5 - x^3 + 2x^2 + 1$

**8.30.** Sprawdź, czy istnieje liczba  $a$ , dla której wielomiany  $W(x)$  i  $P(x)$  są równe, jeśli:

- a)  $W(x) = (x^2 - ax)(x + 2a) + 8x$   
 $P(x) = x^3 - 2x^2$   
 b)  $W(x) = 2x^4 - 3(a + 1)x^3 + 4a$   
 $P(x) = 2x^4 - 6x^3 + 8$   
 c)  $W(x) = (x^3 - 2a)(x^3 + 2a) - 6x$   
 $P(x) = x^9 + 3ax - 16$   
 d)  $W(x) = (3x - a)^2 \cdot 4x$   
 $P(x) = 36x^3 + 48x^2 + 16x$

**8.31.** Wyznacz liczbę  $a$ , dla której wielomiany  $W(x)$  i  $P(x)$  są równe, jeśli:

- a)  $W(x) = (3x^2 - a)(x + 2a) - (2x - 1)$   
 $P(x) = 3x^3 + 18x^2 - 5x - 17$   
 b)  $W(x) = 8 + ax(ax + 1) - (a^2 + x - 5x^2) \cdot x$   
 $P(x) = 5x^3 + 3x^2 - 2x + 8$   
 c)  $W(x) = -6x^3 - 5ax^2 - \frac{5}{3}ax - 2$   
 $P(x) = (3x^2 - a^2x + 2)(-2x - 1)$   
 d)  $W(x) = (2x^2 - 3)(2x - a^2) - 4$   
 $P(x) = 4x^3 + (a - 3)x^2 - 6x - a$

**8.32.** Sprawdź, czy istnieją liczby  $a$  i  $b$ , dla których wielomiany  $W(x)$  i  $P(x)$  są równe, jeśli:

- a)  $W(x) = 2x^3 + (3a + 1)x^2 + (b + 2)x - 4$   
 $P(x) = 2x^3 + 4x^2 + 5x - 4$   
 b)  $W(x) = (2ax - b)^3$   
 $P(x) = 8x^3 - 10x^2 + 6x - 1$   
 c)  $W(x) = 2ax(2x - b)^2$   
 $P(x) = 16x^3 - 48x^2 + 36x$   
 d)  $W(x) = (x^2 - ax)^2 - (x^2 + bx)^2$   
 $P(x) = -2x^3 - 3x^2$

**8.33.** Wyznacz współczynniki  $a$  i  $b$ , dla których wielomiany  $W(x) - F(x)$  i  $H(x)$  są równe, jeśli:

- a)  $W(x) = x^3 + ax^2 + 3x + 1$ ,  $F(x) = 2x^2 + bx - 4$ ,  $H(x) = x^3 - 7x^2 + 8x + 5$   
 b)  $W(x) = 2x^3 + ax^2 + 5x - 3$ ,  $F(x) = x^3 - 5x^2 + bx + 4$ ,  $H(x) = x^3 + 2x^2 + 4x - 7$

**8.34.** Wyznacz współczynniki  $a$  i  $b$  tak, aby  $W(x) \cdot F(x) \equiv H(x)$ , jeśli:

- a)  $W(x) = x^2 + 3x + 2$ ,  $F(x) = ax + b$ ,  $H(x) = 2x^3 + 3x^2 - 5x - 6$   
 b)  $W(x) = 2x^2 - x + 5$ ,  $F(x) = ax + b$ ,  $H(x) = -2x^3 + 7x^2 - 8x + 15$

**8.35.** Wyznacz współczynniki  $b$  i  $c$  tak, aby wielomian  $W(x) \cdot F(x) - H(x)$  był wielomianem zerowym, jeśli:

$$\begin{aligned} \text{a) } W(x) &= -3x + 5, & F(x) &= x^2 + bx + c, & H(x) &= -3x^3 - x^2 - 2x + 20 \\ \text{b) } W(x) &= 2x - 3, & F(x) &= x^2 + bx + c, & H(x) &= 2x^3 + 7x^2 - 13x - 3. \end{aligned}$$

### Wzory skróconego mnożenia stopnia 3. Wzór na $a^n - b^n$

**8.36.** Zapisz za pomocą sumy algebraicznej wyrażenie:

$$\begin{aligned} \text{a) } (y+z)^3 & & \text{b) } (2+a)^3 & & \text{c) } (1+3x)^3 & & \text{d) } (\sqrt[3]{3}+1)^3 \\ \text{e) } (5-b)^3 & & \text{f) } (x-4)^3 & & \text{g) } (2x-3)^3 & & \text{h) } (1-\sqrt[3]{2})^3. \end{aligned}$$

**8.37.** Oblicz sześcian danej liczby.

$$\begin{aligned} \text{a) } 1-\sqrt{3} & & \text{b) } \sqrt{6}+2 & & \text{c) } 3\sqrt{2}-1 & & \text{d) } 4\sqrt{2}+\sqrt{6} \\ \text{e) } 2+\sqrt[3]{2} & & \text{f) } -\sqrt[3]{3}-\sqrt[3]{9} & & \text{g) } 2\sqrt[3]{2}-\sqrt[3]{4} & & \text{h) } \sqrt[3]{5}+2\sqrt[3]{25} \end{aligned}$$

**8.38.** Zapisz za pomocą sumy algebraicznej wyrażenie:

$$\begin{aligned} \text{a) } (x+a)(x^2-ax+a^2) & & \text{b) } (3+x)(9-3x+x^2) \\ \text{c) } (y+4)(16-4y+y^2) & & \text{d) } (2-y)(4+2y+y^2) \\ \text{e) } (25+5x+x^2)(x-5) & & \text{f) } (\sqrt{2}-z)(z^2+2+\sqrt{2}z). \end{aligned}$$

**8.39.** Oblicz:

$$\begin{aligned} \text{a) } (2-\sqrt[3]{5})(4+2\sqrt[3]{5}+\sqrt[3]{25}) & & \text{b) } (1-2\sqrt[3]{2}+4\sqrt[3]{4})(1+2\sqrt[3]{2}) \\ \text{c) } (\sqrt[3]{3}+\sqrt[3]{2})(\sqrt[3]{9}-\sqrt[3]{6}+\sqrt[3]{4}) & & \text{d) } (4\sqrt[3]{4}+2\sqrt[3]{18}+\sqrt[3]{81})(\sqrt[3]{9}-2\sqrt[3]{2}) \end{aligned}$$

**8.40.** Doprowadź dane wyrażenie do najprostszej postaci.

$$\begin{aligned} \text{a) } (x-1)^3 + (2-x)^3 & & \text{b) } (2+x)^3 + 2(x-1)^3 \\ \text{c) } (x+1)(x^2-x+1) + (1-x)^3 & & \text{d) } 3(x-2)(x^2+2x+4) - (x+3)^3 \\ \text{e) } (x+4)^3 - (4-x)(x^2+4x+16) & & \text{f) } (\sqrt[3]{5+x})^3 - (\sqrt[3]{5-x})^3 - 6\sqrt[3]{25x} \end{aligned}$$

**8.41.** Wykonaj działania i przeprowadź redukcję wyrazów podobnych:

$$\begin{aligned} \text{a) } (x+1)^3 - (2x-3)^2 - (x+3)^2 + 2(x-2)(x+2) \\ \text{b) } (2x-5)^2(x-1) - (3x+1)^2(x+1) - (x-1)(x^2+x+1) \\ \text{c) } (2x-1)^3 - (x+1)^3 + (x+2)^3 - (x+2)(x^2-2x+4) \\ \text{d) } (2x-3y)^2 - (3x-y)(3x+y) + (x-2y)^2 - (8x-7y)(-2y) \\ \text{e) } (x^2-1)^3 - (x-1)(x^2+1)(x+1) + 4x^2(x^2+1) \\ \text{f) } (3x-1)^3 - 3(x+1)(x^2-x+1) + 2(x-2)^3. \end{aligned}$$

**8.42.** Rozwiąż równanie:

$$\begin{aligned} \text{a) } (x-1)^3 + 35 = 4(x+1)^2 - (2-x)(4+2x+x^2) \\ \text{b) } (2+x)^3 + 9x = 10 - (2-x)^3 + (2x-1)^2 \\ \text{c) } 2(3x-5)^2 + 3(x+1)(x^2-x+1) = (x+3)^3 + 2x(x^2-25) + 72 \\ \text{d) } (x-4)^3 - 12(x+2)^2 + 20x(x-4) = -9 - (x^2+3x+9)(3-x). \end{aligned}$$

**8.43.** Rozwiąż nierówność:

$$\begin{aligned} \text{a) } (x-2)^3 + 7x^2 + (2+x)(x^2-2x+4) > 2x^3 + 12x + 25 \\ \text{b) } (x-4)(x^2+4x+16) - 2(x-1)^3 \geq 5(x-4)(x+3) - x^3 \\ \text{c) } x^2(x-5) - (x-2)^3 \leq 3x - 12(x-1) \\ \text{d) } (3+x)^3 + (2x-1)(4x^2+2x+1) - 11(3x+4) < 9x^2(x+1) - (x^2+2). \end{aligned}$$

**8.44.** Zamień na iloczyn wyrażenia:

$$\begin{aligned} \text{a) } x^3 - 3x^2 + 3x - 1 & & \text{b) } x^3 + 18x^2 + 108x + 216 \\ \text{c) } 27 - 27y + 9y^2 - y^3 & & \text{d) } 8x^3 + 36x^2y + 54xy^2 + 27y^3 \\ \text{e) } 1 + 6x + 12x^2 + 8x^3 & & \text{f) } 1 - 15y + 75y^2 - 125y^3. \end{aligned}$$

**8.45.** Zamień na iloczyn wyrażenia:

$$\begin{aligned} \text{a) } y^3 + 8 & & \text{b) } 1 - x^3 & & \text{c) } 27z^3 - 1 & & \text{d) } 8k^3 - 125 \\ \text{e) } 64 + 27y^3 & & \text{f) } 125a^3 + 216 & & \text{g) } 5\sqrt{5} + x^3 & & \text{h) } y^3 - 2\sqrt{2}. \end{aligned}$$

**8.46.** Usuń niewymierność z mianownika ułamka:

$$\begin{aligned} \text{a) } \frac{2}{\sqrt[3]{3}} & & \text{b) } \frac{1}{3\sqrt[3]{2}} & & \text{c) } \frac{2\sqrt[3]{5}}{\sqrt[3]{25}} & & \text{d) } \frac{2}{2-\sqrt[3]{2}} \\ \text{e) } \frac{2}{3+\sqrt[3]{5}} & & \text{f) } \frac{7}{\sqrt[3]{16}-\sqrt[3]{12}+\sqrt[3]{9}} & & \text{g) } \frac{\sqrt[3]{2}}{4\sqrt[3]{16}+2\sqrt[3]{4}+1} & & \text{h) } \frac{\sqrt[3]{3}-2}{\sqrt[3]{3}+\sqrt[3]{9}} \end{aligned}$$

## Zastosowanie wzorów skróconego mnożenia w dowodzeniu

- D 8.47.** Wykaż, że liczba  $207^3 + 148^3$  jest podzielna przez 71.
- D 8.48.** Wykaż, że liczba  $536^3 - 124^3$  jest podzielna przez 103.
- D 8.49.** Wykaż, że jeśli liczba całkowita przy dzieleniu przez 5 daje resztę 3, to sześćcian tej liczby przy dzieleniu przez 5 daje resztę 2.
- D 8.50.** Liczba całkowita  $a$  przy dzieleniu przez 4 daje resztę 3, zaś liczba całkowita  $b$  przy dzieleniu przez 4 daje resztę 1. Wykaż, że suma sześciątów tych liczb jest podzielna przez 4.
- D 8.51.** Liczba całkowita  $c$  przy dzieleniu przez 6 daje resztę 2. Wykaż, że liczba  $4 + c^3$  jest podzielna przez 12.
- D 8.52.** Liczba całkowita  $c$  przy dzieleniu przez 3 daje resztę 1. Wykaż, że reszta z dzielenia liczby  $c^3 - 2$  przez 3 jest równa 2.
- D 8.53.** Wykaż, że jeśli liczba parzysta jest niepodzielna przez 6, to sześćcian tej liczby przy dzieleniu przez 6 daje resztę 2 lub 4.
- D 8.54.** Wykaż, że jeśli  $a - b = 5$  i  $a \cdot b = 7$ , to  $a^3 - b^3 = 230$ .
- D 8.55.** Wykaż, że jeśli  $a + b = 4$  i  $a \cdot b + 9 = 0$ , to  $a^3 + b^3 - 172 = 0$ .
- D 8.56.** Wykaż, że liczba  $(1 - \sqrt{2})^3 (7 + 5\sqrt{2})$  jest liczbą całkowitą.
- D 8.57.** Wykaż, że liczba  $(26 - 15\sqrt{3})(2 + \sqrt{3})^3$  jest liczbą naturalną.
- D 8.58.** Wykaż, że liczba  $\sqrt{\sqrt{2} - 1} \cdot \sqrt[4]{3 + 2\sqrt{2}}$  jest liczbą naturalną.
- D 8.59.** Wykaż, że liczba  $209^{21} - 45^{21}$  jest podzielna przez 164.
- D 8.60.** Wykaż, że liczba  $384^{58} - 120^{58}$  jest podzielna przez 11.
- D 8.61.** Wykaż, że liczba  $26^{24} - 15^{24}$  jest podzielna przez 41.

- D 8.62.** Wykaż, że liczba  $3^{18} - 2^{18}$  jest podzielna przez 19.
- D 8.63.** Wykaż, że liczba  $3^{16} - 2^{16}$  jest podzielna przez 13.
- D 8.64.** Wykaż, że liczba  $8^{15} - 5^5$  jest podzielna przez 13.
- D 8.65.** Wykaż, że liczba  $6^{21} - 9^{14}$  jest podzielna przez 15.
- D 8.66.** Wykaż, że liczba  $2^{35} - 3^{28}$  jest wielokrotnością liczby 7.

## Podzielność wielomianów

- 8.67.** Podaj przykład wielomianu pierwszego stopnia, przez który jest podzielny wielomian  $W(x)$ , jeśli:
- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| a) $W(x) = x^3 - 1$              | b) $W(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ |
| c) $W(x) = 81 - x^4$             | d) $W(x) = 8 + 125x^3$          |
| e) $W(x) = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$ | f) $W(x) = x^5 - 32$            |
| g) $W(x) = 27x^6 - 64$           | h) $W(x) = 4x^4 - 4x^2 + 1$     |
- 8.68.** Wskaż cztery wielomiany pierwszego stopnia, przez które jest podzielny wielomian  $W(x)$ , jeśli  $W(x) = (4x^2 - 9)(x^2 - 4x - 5)$ .
- 8.69.** Wskaż pięć wielomianów pierwszego stopnia, przez które jest podzielny wielomian  $W(x)$ , jeśli  $W(x) = (x^3 + 125)(6x^2 + 13x - 10)(4x^2 - 9)$ .
- 8.70.** Podaj przykład wielomianu drugiego stopnia, przez który jest podzielny wielomian  $W(x)$ , jeśli:
- |                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| a) $W(x) = (x + 1)(x^4 + 8)(x - 3)$ | b) $W(x) = 27x^3 - 1000$              |
| c) $W(x) = 125x^3 + 216$            | d) $W(x) = 8x^3 - 60x^2 + 150x - 125$ |
- 8.71.** Dany jest wielomian  $W(x) = -3x^2(4 - x)(x + 2)$ . Wskaż trzy wielomiany stopnia trzeciego, przez które jest podzielny wielomian  $W(x)$ .
- 8.72.** Dany jest wielomian  $W(x) = (9x^2 - 1)(x^2 - 4x)$ . Podaj przykład wielomianu:
- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| a) stopnia pierwszego | b) stopnia drugiego   |
| c) stopnia trzeciego  | d) stopnia czwartego, |
- przez który jest podzielny wielomian  $W(x)$ .

**8.73.** Podaj przykład wielomianu  $F(x)$  stopnia pierwszego i takiego, że wielomian  $W(x) = (x^2 + 10x + 25) \cdot F(x)$  jest podzielny przez wielomian  $P(x) = x^2 + 4x - 5$ .

**8.74.** Podaj przykład wielomianu  $F(x)$  stopnia pierwszego i takiego, że wielomian  $W(x) = (8x^3 - 1) \cdot F(x)$  jest podzielny przez wielomian  $P(x) = 2x^2 + 5x - 3$ .

**8.75.** Podaj przykład wielomianu  $F(x)$  takiego, że wielomian  $W(x) = (3 - x)(4 + 5x) \cdot F(x)$  jest podzielny przez wielomian  $P(x) = -x^2 + 9x - 18$ .

**8.76.** Podaj przykład wielomianu  $F(x)$  takiego, że wielomian  $W(x) = (x + 2)(x^2 - x - 6) \cdot F(x)$  jest podzielny przez wielomian  $P(x) = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$ .

**8.77.** Wielomian  $W(x)$  jest podzielny przez wielomian  $P(x)$ . Wielomian  $Q(x) = 4 + 3x$  jest ilorzem z dzielenia  $W(x)$  przez  $P(x)$ . Wyznacz  $P(x)$ , jeśli:  
a)  $W(x) = 16 - 9x^2$     b)  $W(x) = 9x^2 + 24x + 16$     c)  $W(x) = -3x^2 - x + 4$ .

**8.78.** Wielomian  $W(x) = -10x^3 + 11x^2 + ax + b$  jest podzielny przez wielomian  $P(x) = 1 - 2x$ . Ilorzem z dzielenia  $W(x)$  przez  $P(x)$  jest wielomian  $Q(x) = 5x^2 - 3x + 2$ . Oblicz  $a$  i  $b$ .

**8.79.** Wielomian  $W(x) = -3x^3 + (3a + b)x^2 - (4a + 9b)x + 30$  jest podzielny przez wielomian  $P(x) = -3x + 5$ . Ilorzem z dzielenia  $W(x)$  przez  $P(x)$  jest wielomian  $Q(x) = x^2 - 4x + 6$ . Oblicz  $a$  i  $b$ .

**8.80.** Wielomian  $W(x) = -6x^4 + (a - b)x^3 - 21x^2 + (2a - 3b)x - 15$  jest podzielny przez wielomian  $P(x) = 3x^2 - 2x + 5$ . Ilorzem z dzielenia  $W(x)$  przez  $P(x)$  jest wielomian  $Q(x) = -2x^2 + x - 3$ . Oblicz  $a$  i  $b$ .

**8.81.** Wielomian  $W(x) = 6x^3 - x^2 + 10x - 8$  jest podzielny przez wielomian  $P(x)$ . Ilorzem z dzielenia wielomianu  $W(x)$  przez  $P(x)$  jest wielomian  $Q(x) = 2x^2 + x + 4$ . Wyznacz  $P(x)$ .

**8.82.** Wielomian  $W(x) = 2x^4 - 7x^3 + 6x^2 + 10x - 15$  jest podzielny przez wielomian  $P(x)$ . Ilorzem z dzielenia wielomianu  $W(x)$  przez  $P(x)$  jest wielomian  $Q(x) = x^3 - 2x^2 + 5$ . Wyznacz  $P(x)$ .

**8.83.** Wielomian  $W(x) = (8x^3 - 27)(2x - 7)$  jest podzielny przez wielomian  $P(x)$ . Ilorzem z dzielenia  $W(x)$  przez  $P(x)$  jest wielomian  $Q(x) = 4x^2 + 6x + 9$ . Wyznacz  $P(x)$ .

**8.84.** Wielomian  $W(x) = (x^3 + 216)(3x + 5)$  jest podzielny przez wielomian  $P(x) = 3x^2 + 23x + 30$ , a ilorzem z dzielenia  $W(x)$  przez  $P(x)$  jest wielomian  $Q(x)$ .

**8.85.** Wielomian  $W(x) = (2x - 3)^2(3x + 1)^2$  jest podzielny przez wielomian  $P(x) = 6x^2 - 7x - 3$ , a ilorzem z dzielenia  $W(x)$  przez  $P(x)$  jest wielomian  $Q(x)$ .

**8.86.** Wielomian  $W(x)$  jest podzielny przez wielomian  $P(x)$ , a ilorzem z dzielenia wielomianu  $W(x)$  przez  $P(x)$  jest wielomian  $Q(x)$ . Wyznacz wielomian  $Q(x)$ , jeśli:

a)  $W(x) = x^6 - 2x^4 + 2x^3 - 2x + 1$ ,  $P(x) = x^3 - 2x + 1$   
b)  $W(x) = x^6 - x^5 + 2x^4 - x^3 - x^2 + 2x - 2$ ,  $P(x) = x^4 + x^2 - 2$

### Dzielenie wielomianu przez dwumian liniowy. Schemat Hornera

**8.87.** Wykonaj dzielenie:

a)  $(x^3 - 6x^2 + 12x - 16) : (x - 4)$     b)  $(x^3 - x^2 - 5x + 21) : (x + 3)$   
c)  $(x^3 - 3x^2 + 3x - 2) : (x - 2)$     d)  $(x^4 + 5x^3 - 12x^2 + 5x + 1) : (x - 1)$ .

**8.88.** Wykonaj dzielenie:

a)  $(100x^3 - 120x^2 + 47x - 6) : \left(x - \frac{2}{5}\right)$     b)  $(38x^3 + 7x^2 - 8x - 1) : \left(x + \frac{1}{2}\right)$   
c)  $(16x^4 + 8x^3 - 7x^2 + 2x + 1) : \left(x + \frac{1}{4}\right)$     d)  $(2x^5 + 3x^4 - 2x - 3) : \left(x + \frac{3}{2}\right)$ .

**8.89.** Wykonaj dzielenie:

a)  $(2x^4 - 15x^3 + 24x^2 - 5x - 6) : (2x - 3)$   
b)  $(12x^4 - 3x^3 + 8x^2 - 6x + 1) : (4x - 1)$   
c)  $(-2x^4 + x^3 - 16x^2 + 4) : (-2x + 1)$   
d)  $(-3x^4 + 2x^3 - 12x + 8) : (-3x + 2)$ .

**8.90.** Wykonaj dzielenie z resztą:

a)  $(3x^2 - 2x + 1) : (x + 2)$     b)  $(-2x^3 + 4x - 3) : (x - 1)$   
c)  $(4x^4 + 3x^2 - 6x + 3) : (x + 1)$     d)  $(-3x^4 + 2x^3 + 4) : (x - 3)$   
e)  $(x^5 + 4x^3 - 2x^2 + 1) : (x + 3)$     f)  $(x^6 - 3x^4 + 2x^2 + 1) : (x - 2)$ .

**8.91.** Wykonaj dzielenie, stosując schemat Hornera:

- a)  $(x^3 + 2x^2 + x - 4) : (x - 1)$       b)  $(x^3 + 3x^2 + 3x + 2) : (x + 2)$   
 c)  $(3x^3 - 4x^2 - x - 6) : (x - 2)$       d)  $(2x^3 + 7x^2 + 8x + 15) : (x + 3)$

**8.92.** Wykonaj dzielenie, stosując schemat Hornera:

- a)  $(3x^4 + 3x^3 + 2x^2 + 3x + 1) : (x + 1)$   
 b)  $(2x^4 + 3x^3 - 2x^2 + 6x - 3) : (x - 0,5)$   
 c)  $(3x^4 - x^3 + 6x^2 + 7x - 3) : \left(x - \frac{1}{3}\right)$   
 d)  $(5x^4 + 9x^3 - 2x^2 + 5x - 1) : \left(x - \frac{1}{5}\right)$

**8.93.** Wykonaj dzielenie, stosując schemat Hornera:

- a)  $(x^3 - 3x + 2) : (x - 1)$       b)  $(2x^3 + x + 18) : (x + 2)$   
 c)  $(-x^3 + 4x + 3) : (x + 1)$       d)  $(5x^3 - 7x - 26) : (x - 2)$   
 e)  $(2x^4 - 5x + 3) : (x - 1)$       f)  $(-3x^4 + 2x^2 + 1) : (x + 1)$

**8.94.** Wykonaj dzielenie z resztą, stosując schemat Hornera:

- a)  $(3x + 5) : (x + 4)$       b)  $(-4x + 1) : (x - 7)$   
 c)  $(x^3 - 1) : (x + 2)$       d)  $(3x^4 - 2x + 8) : (x - 2)$   
 e)  $(5x^5 + 2x^3 + 7) : (x - 1)$       f)  $(-2x^5 + 4x^3 + 6) : (x + 3)$

**8.95.** Wykonaj dzielenie:

- a)  $(2x^6 + 3x^2 - 15) : (x - 1)$       b)  $(-3x^4 + 2x + 16) : (x - 2)$   
 c)  $(x^5 + 1) : (x + 1)$       d)  $(x^6 - 1) : (x + 1)$   
 e)  $(x^7 + 1) : (x - 1)$       f)  $(x^8 - 1) : (x - 1)$

**8.96.** Oblicz resztę z dzielenia wielomianu  $W(x)$  przez dwumian  $P(x)$ , jeśli:

- a)  $W(x) = -2x^3 + 4x^2 - 5x + 1$ ,       $P(x) = x - 2$   
 b)  $W(x) = x^4 - 2x^3 + 4$ ,       $P(x) = x + 1$   
 c)  $W(x) = -3x^6 + 4x^4 + 9$ ,       $P(x) = x - 1$   
 d)  $W(x) = x^3 + 2x^2 + 3x + 1$ ,       $P(x) = x + 3$

**8.97.** Dany jest wielomian  $W(x) = x^3 + (k^2 + 1)x^2 - 2kx - 15$ .

- a) Dla  $k = 1$  oblicz resztę z dzielenia wielomianu  $W(x)$  przez dwumian  $x + 3$ .  
 b) Uzasadnij, że jeśli  $k = -5$  lub  $k = 3$ , to wielomian  $W(x)$  jest podzielny przez dwumian  $x + 1$ .

**8.98.** Reszta z dzielenia wielomianu  $W(x) = m^2x^8 - 5x^4 - 3m$  przez dwumian  $x - 1$  jest równa  $-1$ . Oblicz  $m$ .

**8.99.** Reszta z dzielenia wielomianu  $W(x) = m^2x^6 - 8x^3 + 5m$  przez dwumian  $x + 1$  jest równa 2. Oblicz  $m$ .

**8.100.** Wyznacz wszystkie wartości parametru  $a$ ,  $a \in \mathbb{R}$ , dla których reszta z dzielenia wielomianu  $W(x) = 2x^4 - 3x^3 + ax^2 + a^2x + 2$  przez dwumian  $x - 1$  jest większa od 3.

**8.101.** Wyznacz wszystkie wartości parametru  $a$ ,  $a \in \mathbb{R}$ , dla których reszta z dzielenia wielomianu  $W(x) = x^4 - 2x^3 - \frac{1}{4}ax^2 + a^2x + 1$  przez dwumian  $x - 2$  jest mniejsza od 4.

## Pierwiastek wielomianu. Twierdzenie Bézouta

**8.102.** Sprawdź, czy podana obok wielomianu  $W(x)$  liczba  $c$  jest jego pierwiastkiem:

- a)  $W(x) = x^3 - 6x^2 + 12x - 7$ ,       $c = 1$   
 b)  $W(x) = 5x^3 - 2x^2 - 6x - 20$ ,       $c = 2$   
 c)  $W(x) = 6x^4 - 3x^2 + 5x + 3$ ,       $c = -1$   
 d)  $W(x) = x^4 + 7x^3 + 16x^2 - 24$ ,       $c = -2$

**8.103.** Dany jest wielomian  $W(x)$  i zbiór  $A$ . Sprawdź, które liczby ze zbioru  $A$  są pierwiastkami wielomianu  $W(x)$ .

- a)  $W(x) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12$ ,       $A = \{-1, \sqrt{2}, 3\}$   
 b)  $W(x) = x^4 - 2x^2 - 3$ ,       $A = \left\{-\sqrt{3}, -\frac{1}{3}, 1, \sqrt{3}\right\}$

**8.104.** Wielomian  $W(x)$  jest zapisany w postaci iloczynu wielomianów pierwszego i drugiego stopnia. Podaj stopień wielomianu  $W(x)$  i wyznacz pierwiastki tego wielomianu.

- a)  $W(x) = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)(5 - 2x)(x^2 + 1)$   
 b)  $W(x) = (81x^2 - 4)(x^2 - x - 6)(3 - x)(x + 5)$   
 c)  $W(x) = 5x(2x^2 + x + 1)(9x^2 - 6x + 1)(4 + x^2)$   
 d)  $W(x) = (x^2 + 3x + 4)(1 - 2x + 8x^2)(x^2 - 9)$

**8.105.** Podaj przykład wielomianu  $W(x)$  szóstego stopnia, zapisanego w postaci iloczynowej i którego pierwiastkami są liczby:

- a) 0, 1, 2, 3, 4, 5  
 b)  $-\sqrt{5}, -\sqrt{3}, 0, \sqrt{3}, \sqrt{5}$   
 c) -1, 1, 3  
 d) -2.

**8.106.** Sprawdź, nie wykonując dzielenia, czy wielomian  $W(x)$  jest podzielny przez dwumian  $P(x)$ , jeśli:

- a)  $W(x) = x^3 - 3x^2 + 4x - 12$        $P(x) = x - 3$   
 b)  $W(x) = 2x^4 + 3x^3 + 2x^2 + x - 14$        $P(x) = x + 2$   
 c)  $W(x) = 5x^5 - 3x^3 - 2x + 9$        $P(x) = x - 1$   
 d)  $W(x) = -3x^7 + 8x^5 + 4x^2 + 1$        $P(x) = x + 1$ .

**8.107.** Wyznacz liczbę  $k$ , dla której wielomian  $W(x)$  jest podzielny przez dwumian  $P(x)$ , jeśli:

- a)  $W(x) = 2x^3 - (3k + 2)x^2 + 6kx - 18$        $P(x) = x + 3$   
 b)  $W(x) = x^3 - (4k + 3)x^2 + (6k - 1)x + 25$        $P(x) = x - 5$   
 c)  $W(x) = 2x^3 + 3k^2x^2 + kx - 20$        $P(x) = x - 2$   
 d)  $W(x) = x^3 + 2x^2 - k^2x + 5k + 7$        $P(x) = x + 3$ .

**8.108.** Wyznacz wszystkie pierwiastki wielomianu  $W(x)$  wiedząc, że wielomian  $W(x)$  jest podzielny przez  $P(x)$ , jeśli:

- a)  $W(x) = 3x^3 + 20x^2 + 11x - 6$        $P(x) = x + 1$   
 b)  $W(x) = 2x^3 - 10x^2 + 10x - 8$        $P(x) = x - 4$   
 c)  $W(x) = 2x^3 - 3x^2 - 20x + 21$        $P(x) = x + 3$   
 d)  $W(x) = 8x^3 - 6x^2 - 18x - 4$        $P(x) = x - 2$   
 e)  $W(x) = x^3 - 4x^2 - 3x + 18$        $P(x) = x - 3$   
 f)  $W(x) = x^3 + 2x - 3$        $P(x) = x - 1$ .

**8.109.** Dany jest wielomian  $W(x)$  i liczba  $c$ . Wykaż, że liczba  $c$  jest pierwiastkiem wielomianu  $W(x)$ . Następnie wyznacz pozostałe pierwiastki wielomianu  $W(x)$ , o ile istnieją.

- a)  $W(x) = x^3 - x^2 - 16x - 20$ ,       $c = -2$   
 b)  $W(x) = x^3 - x^2 - 8x + 8$ ,       $c = 1$   
 c)  $W(x) = 2x^3 + 7x^2 + 2x - 3$        $c = -3$   
 d)  $W(x) = x^3 + 5x^2 + 5x + 25$ ,       $c = -5$

**8.110.** Wykaż, że liczba  $c$  jest pierwiastkiem wielomianu  $W(x)$ . Następnie wyznacz pozostałe pierwiastki wielomianu  $W(x)$ , o ile istnieją.

- a)  $W(x) = x^5 + 2x^4 + 2x^3 + 4x^2 - 3x - 6$ ,       $c = -2$   
 b)  $W(x) = x^5 - x^4 + 3x^3 - 3x^2 + 2x - 2$ ,       $c = 1$   
 c)  $W(x) = 2x^5 + 2x^4 - 20x^3 - 20x^2 + 18x + 18$ ,       $c = -1$   
 d)  $W(x) = x^5 - 2x^4 - 15x^3 + 30x^2 - 16x + 32$ ,       $c = 2$

**8.111.** Wyznacz liczbę  $a$ , dla której liczba  $c$  jest pierwiastkiem wielomianu  $W(x)$ . Dla obliczonej wartości  $a$ , podaj pozostałe pierwiastki tego wielomianu.

- a)  $W(x) = x^3 + 2x^2 - x + a$ ,       $c = 1$   
 b)  $W(x) = 3x^3 - (4a + 5)x^2 + 28x - 4a$ ,       $c = 2$

**8.112.** Wielomian  $W(x)$  jest podzielny przez podany obok wielomianu dwumian. Oblicz  $a$ . Następnie wyznacz wszystkie pierwiastki wielomianu  $W(x)$ .

- a)  $W(x) = 4x^3 + 5x^2 + ax - 2$ ,       $x + \frac{1}{4}$   
 b)  $W(x) = 4x^3 + 6ax^2 + (4a + 2)x - 12$ ,       $x - \frac{1}{2}$

**8.113.** Liczby  $x_1$  i  $x_2$  są pierwiastkami wielomianu  $W(x)$ . Oblicz  $a$  i  $b$ . Następnie znajdź trzeci pierwiastek wielomianu  $W(x)$ .

- a)  $W(x) = x^3 - (a + b)x^2 - (a - b)x + 3$ ,       $x_1 = 1, x_2 = 3$   
 b)  $W(x) = 2x^3 + (a + b)x^2 + (5b + 2a)x - 8$ ,       $x_1 = 4, x_2 = -\frac{1}{2}$

**8.114.** Oblicz wartości współczynników  $a$  i  $b$  wielomianu  $W(x)$  wiedząc, że wielomian ten jest podzielny przez podany obok trójmian kwadratowy  $P(x)$ . Podaj wszystkie pierwiastki wielomianu  $W(x)$ .

- a)  $W(x) = x^3 + ax^2 - bx + 6$        $P(x) = (x - 1)(x - 2)$   
 b)  $W(x) = 3x^3 + ax^2 - 15x + b$        $P(x) = 3x^2 + 11x - 4$

**D 8.115.** Wykaż, że dla dowolnej liczby naturalnej dodatniej  $n$  wielomian  $W(x) = nx^{n+1} - (n-1)x^n - 1$  jest podzielny przez dwumian  $x - 1$ .

**D 8.116.** Wykaż, że dla dowolnej liczby naturalnej dodatniej  $n$  wielomian  $W(x) = x^{2n-1} + (n-1)x^2 + nx + 2$  jest podzielny przez dwumian  $x + 1$ .

## Pierwiastki wymierne wielomianu

**8.117.** Wyznacz całkowite pierwiastki wielomianu  $W(x)$ , jeśli:

- a)  $W(x) = x^3 + 4x^2 + x - 6$       b)  $W(x) = 2x^3 - 2x^2 - 2x - 4$   
 c)  $W(x) = 2x^3 - 5x^2 - 2x + 5$       d)  $W(x) = 3x^3 + 7x^2 - 4$   
 e)  $W(x) = x^4 + x^3 - 11x^2 - 9x + 18$       f)  $W(x) = 5x^4 + 15x^3 - 19x^2 + 3x - 4$ .

**D 8.118.** Wykaż, że wielomian  $W(x) = 4x^4 + 4x^3 + 11x^2 - x - 3$  nie ma pierwiastków całkowitych.

**D 8.119.** Wykaż, że wielomian  $W(x) = x^3 + 6x^2 + 3x - 10$  ma tylko całkowite pierwiastki.

**8.120.** Wyznacz całkowite pierwiastki wielomianu  $W(x)$ .

- a)  $W(x) = \frac{1}{4}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - x + 2$       b)  $W(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{7}{3}x + 2$   
 c)  $W(x) = \frac{1}{2}x^3 + \frac{5}{2}x^2 + 5x + 12$       d)  $W(x) = \frac{1}{2}x^4 + x^3 - \frac{13}{2}x^2 - 7x + 12$

**8.121.** Wyznacz wszystkie pierwiastki wielomianu  $W(x)$  wiedząc, że ten wielomian ma pierwiastek całkowity.

- a)  $W(x) = x^3 + 2x^2 - 3x - 10$       b)  $W(x) = 3x^3 + 8x^2 + 3x - 2$   
 c)  $W(x) = x^3 + 2x^2 - 15x - 36$       d)  $W(x) = -2x^3 + 28x - 16$   
 e)  $W(x) = 2x^3 + 4x - 24$       f)  $W(x) = x^5 - x^4 + 2x^3 - 2x^2 + x - 1$   
 g)  $W(x) = 4x^5 - 8x^4 - 4x^3 + 8x^2 + x - 2$       h)  $W(x) = x^5 - x^4 - x^3 + x^2 - 6x + 6$

**D 8.122.** Wykaż, że jeśli  $a \in \mathbb{Z}$  oraz wielomian  $W(x) = x^4 + 2x^3 - 4x^2 + ax - 2$  ma pierwiastek, będący liczbą pierwszą, to wielomian  $W(x)$  ma dwa pierwiastki całkowite.

**D 8.123.** Wykaż, że jeśli  $a \in \mathbb{Z}$  oraz wielomian  $W(x) = x^3 + ax^2 + x - 12$  ma pierwiastek, który jest nieparzystą liczbą pierwszą, to reszta z dzielenia wielomianu  $W(x)$  przez  $x - 1$  jest równa  $-12$ .

**D 8.124.** Współczynniki  $a$  i  $b$  wielomianu  $W(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 - 5x + 6$  są liczbami całkowitymi, a dwa pierwiastki wielomianu  $W(x)$  są liczbami pierwszymi.

a) Oblicz  $a$  i  $b$ .

b) Wykaż, że wielomian  $W(x)$  ma tylko dwa pierwiastki.

**8.125.** Wielomian  $W(x) = x^3 - ax^2 - x + 5$  ma trzy całkowite pierwiastki. Wiedząc, że  $a$  jest liczbą pierwszą, wyznacz pierwiastki wielomianu  $W(x)$ .

## Rozkładanie wielomianów na czynniki

**8.126.** Rozłóż wielomiany na czynniki, stosując wzory skróconego mnożenia.

- a)  $625x^4 - 1$       b)  $x^4 - 2x^2 + 1$   
 c)  $-4 - 20x^2 - 25x^4$       d)  $81x^4 - 16$   
 e)  $(x - 4)^2 - (2x + 1)^2$       f)  $9x^2 - 6x + 1 - (2x + 5)^2$

**8.127.** Rozłóż wielomiany na czynniki, stosując wzory skróconego mnożenia.

- a)  $-x^3 + 3x^2 - 3x + 1$       b)  $8x^3 + 36x^2 + 54x + 27$   
 c)  $1 + 8x^3$       d)  $216x^3 - 125$   
 e)  $(x - 5)^3 - 8x^3$       f)  $27x^3 - (2x + 1)^3$

**8.128.** Rozłóż dane wielomiany na czynniki, wyłączając wspólny czynnik poza nawias.

- a)  $4x^4 - 4x^3 + x^2$       b)  $(x^2 + 2)(2x - 3) + 5x(x^2 + 2)$   
 c)  $x(3x^2 + 1) - 4(3x^2 + 1)$       d)  $(5x - 1)(x^2 + 1) + (5x - 1)(6 - 2x^2)$   
 e)  $(2x - 5)x^2 - 3x(2x - 5)$       f)  $9(x - 4) + (x - 4)x^2 + 6x(x - 4)$

**8.129** Rozłóż dane wielomiany na czynniki, wyłączając wspólny czynnik poza nawias.

- a)  $5x^2(x - 1) + 7x(1 - x) + 2(x - 1)$       b)  $-2x^2(2 - x) + 3x(x - 2) + 2(2 - x)$   
 c)  $(4x - 1)^2x + (1 - 4x)x^2 - (4x - 1)$       d)  $x(x + 5) - x^2(x + 5) - 2(-x - 5)$   
 e)  $(-1 - x)(x^2 - 1) - (x + 1)^2$       f)  $(x^2 - 9)x - (x - 3)^2$

**8.130.** Zamień sumę algebraiczną na iloczyn, stosując metodę grupowania wyrazów.

- a)  $a(x + y) + bx + by$       b)  $ax + bx - ay - by$   
 c)  $cx - cy - ay + ax$       d)  $x^2 - xy + ax - ay$   
 e)  $y^2 + 2xy - 2x - y$       f)  $3ac - bc - b + 3a$

**8.131.** Rozłóż dane wielomiany na czynniki, stosując grupowanie wyrazów.

- a)  $x^3 + 3x^2 - 4x - 12$       b)  $7x^3 + 2x^2 - 21x - 6$   
 c)  $3x^3 - 6x^2 + 4x - 8$       d)  $x^3 - x^2 + x - 1$   
 e)  $4x^3 + 4x^2 - x - 1$       f)  $-9x^3 - 18x^2 + x + 2$

**8.132.** Rozłóż dane wielomiany na czynniki, stosując grupowanie wyrazów.

- a)  $9x^3 - 4x^2 - 27x + 12$       b)  $5x^3 - 4x^2 - 5x + 4$   
 c)  $16x^3 + 16x^2 - 4x - 4$       d)  $18x^3 + 9x^2 - 18x - 9$   
 e)  $3x^3 - 7x^2 - 27x + 63$       f)  $10x^3 + 15x^2 + 8x + 12$

**8.133.** Rozłóż dane wielomiany na czynniki, stosując grupowanie wyrazów.

- a)  $-3x^3 - 4x^2 + 12x + 16$       b)  $20x^3 + 12x^2 - 45x - 27$   
 c)  $-4x^3 + 2x^2 - 6x + 3$       d)  $-6x^3 - 16x^2 + 3x + 8$   
 e)  $2x^4 + 3x^3 - 2x^2 - 3x$       f)  $3x^4 - x^3 - 15x^2 + 5x$

**8.134.** Rozłóż dane wielomiany na czynniki.

- a)  $x^4 + 2x^3 - x - 2$       b)  $8x^4 + 24x^3 + x + 3$   
 c)  $x^4 - x^3 - 27x + 27$       d)  $125x^4 - 125x^3 - 8x + 8$   
 e)  $8x^4 + 8x^3 - x - 1$       f)  $3x^4 + 2x^3 - 24x - 16$

**8.135.** Rozłóż dane wielomiany na czynniki.

- a)  $(x+2)(x+2) - 4x - 8$       b)  $(x-3)(x+3) - 4x + 12$   
 c)  $2x - 14 + 5(x-7)x^2$       d)  $3x^3 - 4x^2 - (3x-4)^2$   
 e)  $2x + 3 - (4x+6)(2x-3)$       f)  $2 + x + (4+2x)^2$

**8.136.** Rozłóż dane wielomiany na czynniki.

- a)  $x^2 - 1 + (x^2 - 1)(x^2 + 1)$       b)  $3(x+5)^3 - (x^2 + 10x + 25)$   
 c)  $(x^2 + 8x + 16)x^2 - (x+4)^2$       d)  $4 - x^2 - (x-2)(x+2)(x-3)$   
 e)  $x^3 - 8 + (x-2)(x^2 - 3x + 1)$       f)  $(3x+1)(2x^2 + 5) + 27x^3 + 1$

**8.137.** Rozłóż dany wielomian na czynniki wiedząc, że ma on całkowity pierwiastek.

- a)  $2x^3 + x^2 - 5x + 2$       b)  $x^3 + 3x - 4$   
 c)  $3x^3 + 8x^2 + 3x - 2$       d)  $x^3 - 7x^2 + 11x - 5$   
 e)  $2x^3 - x^2 - 7x + 6$       f)  $3x^3 + 11x^2 + 5x - 3$

**8.138.** Rozłóż dane wielomiany na czynniki.

- a)  $x^3 + 4x^2 + x - 6$       b)  $2x^7 - 4x^5 + 2x^3$   
 c)  $27 - (4x+1)^3$       d)  $x^3 + 4x^2 - 3x - 18$   
 e)  $5x^4 + 8x^3 + x^2 - 2x$       f)  $3\sqrt{2}x^3 - x^2 - 27\sqrt{2}x + 9$

**8.139.** Rozłóż dane wielomiany na czynniki.

- a)  $(x+3)^3 + 4(x+3)^2 + 4(x+3)$       b)  $(2x-3)^3 - 2(2x-3)^2 + (2x-3)$   
 c)  $(4x-5)^3 - 9(4x-5)$       d)  $3(x-2)^3 - (x^2-4)(x-2)$   
 e)  $(4x-1)^3 - (3x+2)^3$       f)  $(2x+3)^3 - 8x - 12$

**8.140.** Rozłóż dane wielomiany na czynniki.

- a)  $2x^4 - x^2 - 1$       b)  $-x^4 + 10x^2 - 9$   
 c)  $x^6 - 7x^3 - 8$       d)  $(x^2 - 3x)^2 - 9x^2$   
 e)  $9x^2 - (x^2 + 2)^2$       f)  $(x+1)^4 - 5(x+1)^2 + 4$

## Równania wielomianowe

**8.141.** Rozwiąż równanie:

- a)  $x^3 - 8 = 0$       b)  $x^3 + 64 = 0$       c)  $x^5 + 1 = 0$   
 d)  $81x^4 - 1 = 0$       e)  $x^6 - 64 = 0$       f)  $x^8 + 2x^4 + 1 = 0$

**8.142.** Rozwiąż równanie:

- a)  $(4-x)(x+5)(2x-3) = 0$       b)  $(x^2 - 4x + 1)(x^2 + 5)(8 - x^3) = 0$   
 c)  $(x^2 + 6x + 2)(8x^2 - 4x) = 0$       d)  $(9x^2 - 25)(125x^3 + 216) = 0$   
 e)  $(2x^2 + x + 1)(3x^2 + 12) = 0$       f)  $(x^4 - 256)(3x^2 - 6)(x^3 + 27) = 0$

**8.143.** Rozwiąż równanie:

- a)  $x^2(x^2 - 4) = 3(x^2 - 4)$       b)  $-5(x^2 - 3x) = x^2(3x - x^2)$   
 c)  $x^2(4-x) + 9x - 36 = 0$       d)  $4x^2(3-2x) + 4x^2 = 6x$   
 e)  $(x-1)^2 - 2x(x-1) = 1-x$       f)  $9x^2(x+2) + 6x(x+2) = -x-2$

**8.144.** Rozwiąż równanie:

- a)  $x^5 - x^3 - x^2 + 1 = 0$       b)  $8x^5 - 32x^3 - x^2 + 4 = 0$   
 c)  $2x^5 + 3x^3 - 16x^2 - 24 = 0$       d)  $x^5 - x^3 - 125x^2 + 125 = 0$   
 e)  $8x^5 - 128x^3 + x^2 - 16 = 0$       f)  $-27x^5 + 54x^3 - x^2 + 2 = 0$

**8.145.** Rozwiąż równanie:

- a)  $x^4 - 3x^3 + 4x^2 = 12x$       b)  $3x^5 - 2x^4 + 2 - 3x = 0$   
 c)  $3x^3 - 7x^2 - 7x + 3 = 0$       d)  $x^4 + 4x^3 = 5x^2 + 20x$   
 e)  $x^3 - 8 = (x-2)(x+6)$       f)  $x^5 - 2x^3 = (2-x^2)x^2$

**8.146.** Rozwiąż równanie:

- a)  $x^4 - 12 = x^2$   
 c)  $x^3(x^3 - 7) = 8$   
 e)  $(x^3 + 1)^2 = 81x^6$

- b)  $(x^2 + 1)(x^2 + 5) = 2x^2 + 2$   
 d)  $x^4 + 8 = 9x^2$   
 f)  $10x^6 - 7x^3 + 1 = 0$

**8.147.** Rozwiąż równanie:

- a)  $4x(x^2 - 1) + (x + 1) = 0$   
 c)  $x^3 - 13x - 12 = 0$   
 e)  $4x^3 - 1 = 3x$

- b)  $x - 3 + 2x(x^2 - 9) = 0$   
 d)  $x^3 - 5x + 12 = 0$   
 f)  $x^3 - 5x + 2 = 0$

**8.148.** Rozwiąż równanie:

- a)  $x^3 + 12x^2 + 44x + 48 = 0$   
 c)  $7(x^2 - x^3) = 9 - 5x^3$   
 e)  $4(3x^2 + 5x + 6) = x^2(x^2 - 3x - 2)$

- b)  $x^3 - 9x^2 + 23x = 15$   
 d)  $x(x^2 + 1) - 2(2x^2 - 3) = 0$   
 f)  $2(3x^3 + 5) = 7x(4x + 1) + x^2$

**8.149.** Rozwiąż równanie:

- a)  $(x^2 - 3)^2 = 4x^2$   
 c)  $x^3 - 8(x - 1)^3 = 0$   
 e)  $64x^3 + (x + 5)^3 = 0$

- b)  $(x^3 - 2)^2 = 36$   
 d)  $x^4 - (3x^2 + 2)^2 = 0$   
 f)  $125x^3 = (x + 1)^3$

**8.150.** Rozwiąż równanie:

- a)  $x^3(x^2 - 25) = 200x - 8x^3$   
 c)  $x^6 - 26x^3 = 27$   
 e)  $(2x - 1)(x^2 - 1) = 5,5(x + 1)$

- b)  $2(x^4 + 3) = 13x^2$   
 d)  $(x + 1)(x - 4) = x^3 + 1$   
 f)  $x^3 - 21x + 20 = 0$

**8.151.** Rozwiąż równanie:

- a)  $8\sqrt{3}x^3 - 20x^2 = 2\sqrt{3}x - 5$   
 c)  $(4x - 3)(x^2 - 4) = (3x^2 - 12)(3 + 2x)$   
 e)  $7x^2 = 2x^3 + 9$

- b)  $x^7 - 5x^5 + 4x^3 = 0$   
 d)  $x^2(2x - 1) = (6x - 3)(1 - 2x)$   
 f)  $3x^3 + 5x^2 - 12x - 20 = 0$

**8.152.** Rozwiąż równanie:

- a)  $5x^5 + 4x^4 = 5x + 4$   
 c)  $x^7 - x^5 = 16x^5 - 16x^3$   
 e)  $x^8 + x^4 = 2$

- b)  $2(x^3 + 1) + 7x^2 + 7x = 0$   
 d)  $(3x + 1)(x^2 - 9) = 4(3 - x)$   
 f)  $x^6 = 40 - 3x^3$

**8.153.** Rozwiąż równanie:

- a)  $3x(x + 3) = 2(x^3 + 5)$   
 c)  $2x^2(x^2 - x - 20)(x^3 - 125) = 0$   
 e)  $(5x - 7)x^2 + 4(5x - 7) = 20x^2 - 28x$
- b)  $6x^3 - 13x^2 = 2 - 9x$   
 d)  $4x^3 - 13x^2 - 13x + 4 = 0$   
 f)  $6x^3 - 11x^2 - 12x + 5 = 0$

## Zadania prowadzące do równań wielomianowych

**8.154.** Liczba 1 jest pierwiastkiem wielomianu

$$W(x) = x^3 + (a^3 - 1)x^2 + (2a^2 + 4a + 23)x - 15.$$

- a) Oblicz  $a$ .  
 b) Rozłóż wielomian  $W(x)$  na czynniki możliwie najniższego stopnia.

**8.155.** Liczba  $-2$  jest pierwiastkiem wielomianu

$$W(x) = x^4 + 8x^3 + (4a^2 + 8)x^2 + a^4 - a^2.$$

- a) Oblicz  $a$ .  
 b) Wyznacz pozostałe pierwiastki wielomianu  $W(x)$  i podaj krotność wszystkich pierwiastków.

**D 8.156.** Wykaż, że jeśli suma współczynników wielomianu

$$W(x) = x^3 + (2a^3 - 6a^2)x^2 + 9a - 28$$

jest równa 0, to wielomian  $W(x)$  przyjmuje wartość 0 tylko wtedy, gdy  $x = 1$ .

**8.157.** Wielomian  $W(x) = x^3 + 4a^2(a - 1)x + 3ax - 4$  jest podzielny przez dwumian  $(x - 1)$ .

- a) Oblicz  $a$ .  
 b) Wyznacz iloraz z dzielenia wielomianu  $W(x)$  przez dwumian  $x - 1$ .

**D 8.158.** Wykaż, że istnieją trzy wartości parametru  $a$ , dla których reszta z dzielenia wielomianu  $W(x) = x^3 + x^2 + (a^3 - a^2)x + 6a$  przez dwumian  $x + 3$  jest równa  $-12$ .**8.159.** Iloczyn kwadratu pewnej liczby i kwadratu liczby o 3 od niej większej jest równy 324. Wyznacz te liczby.**8.160.** Iloczyn trzech liczb całkowitych, z których druga jest o 3 większa od pierwszej, a trzecia o 1 mniejsza od drugiej, jest równy  $-30$ . Wyznacz te liczby.

**8.161.** Uczniowie pewnej klasy podzielili się na trzy wieloosobowe grupy. W drugiej grupie jest o 6 osób więcej niż w pierwszej, a w trzeciej grupie jest o 10 osób więcej niż w pierwszej. Iloczyn liczby uczniów grupy drugiej i trzeciej jest o 76 większy od sześciastu liczby uczniów pierwszej grupy. Ilu uczniów liczy ta klasa?

**8.162.** Cyfra dziesiątek pewnej naturalnej liczby trzycyfrowej jest dwa razy większa od cyfry setek, a cyfra jedności tej liczby jest o 1 mniejsza od cyfry setek. Wyznacz tę liczbę trzycyfrową wiedząc, że różnica sześciastu cyfry setek i iloczynu pozostałych cyfr jest równa 4.

**8.163.** Suma objętości trzech sześcianów jest równa  $73 \text{ cm}^3$ . Krawędź drugiego sześcianu jest o 2 cm dłuższa od krawędzi pierwszego sześcianu, a krawędź trzeciego sześcianu jest o 1 cm krótsza od krawędzi pierwszego sześcianu. Oblicz długości krawędzi tych sześcianów.

**8.164.** Śmietana pakowana jest w prostopadłościennie pudełka o pojemności 0,4 l. Podstawa pudełka jest kwadratem. Wysokość pudełka jest o 6 cm krótsza od krawędzi podstawy. Wyznacz wymiary pudełka.

**8.165.** Z prostokątnego kawałka blachy o wymiarach  $0,5 \text{ m} \times 0,4 \text{ m}$  należy wyciąć we wszystkich rogach jednakowe kwadraty tak, żeby po zgięciu odpowiednich krawędzi otrzymać otwarty, prostopadłościenny pojemnik. Jakiej wymiary powinny mieć wycięte kwadraty, aby objętość pojemnika była równa 6 litrów?

**8.166.** Akwarium ma kształt prostopadłościannu. Krawędzie jednego akwarium wychodzące z wierzchołka przy podstawie mają długość 3 m, 5 m, 2 m. Krawędzie drugiego akwarium są odpowiednio dłuższe o stały odcinek od krawędzi pierwszego akwarium. Wyznacz wymiary większego akwarium wiedząc, że jego pojemność jest o  $110 \text{ m}^3$  większa od pojemności pierwszego akwarium.

**8.167.** Iloczyn trzech kolejnych liczb parzystych jest równy 192. Jakie to liczby?

**8.168.** Iloczyn trzech kolejnych liczb nieparzystych jest o 65 większy od różnicy kwadratów największej i najmniejszej z nich. Znajdź te liczby.

## Test sprawdzający do rozdziału 8.

- Wyrażenie  $(-1 - 2x)(4x^2 + 1 - 2x)$  jest równe:  
 A.  $1 + 8x^3$       B.  $-8x^3 - 1$       C.  $8x^3 - 1$       D.  $1 - 8x^3$
- Wielomian  $W(x) = x^3 + a^2x^2 + 4ax + 5$  dla  $x = -1$  przyjmuje wartość 0. Wobec tego:  
 A.  $a = -2$       B.  $a = -1$       C.  $a = 1$       D.  $a = 2$
- Suma wszystkich współczynników wielomianu  $W(x) = (3x^2 - 2x^3 + 1)^7$  jest równa:  
 A.  $-2$       B.  $2$       C.  $128$       D.  $-128$
- Jeśli  $P(x) = x + 3$ , gdzie  $x \in \mathbf{R}$ , to wielomian  $W(x) = P(x) \cdot (x^2 - x - 6)$  ma trzy pierwiastki:  
 A.  $-3, -1, 6$       B.  $-3, -2, 3$       C.  $-6, -3, 1$       D.  $-3, 2, 3$
- Jeśli wielomiany  $W(x) = (x - a)(2x^2 + 3)$  oraz  $P(x) = 2x^3 + 4x^2 + 3x + b$  są równe, to:  
 A.  $a + b = -1$       B.  $a + b = 0$       C.  $a + b = 2$       D.  $a + b = 4$
- Sześcian liczby  $\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}$  jest równy:  
 A. 6      B.  $(\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4})^3 \cdot (\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4})^2$   
 C.  $6 + \sqrt[3]{16}$       D.  $6(1 + \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4})$
- Jeśli  $P(x) = (-x - 3)^3$  oraz  $Q(x) = (x^2 - 3x + 9)(x + 3) + 9x^2$ , to stopień wielomianu  $P(x) + Q(x)$  jest równy:  
 A. 3      B. 2      C. 1      D. 0
- Wielomian  $W(x) = x^3 - 3x^3 - 8$  jest podzielny przez dwumian:  
 A.  $x - 8$       B.  $x + 2$       C.  $x - 2$       D.  $x + 4$
- Wielomian  $W(x) = (2x - 1)(3 - x)(2x + 1)$  nie jest podzielny przez wielomian:  
 A.  $3 + 5x - 2x^2$       B.  $1 - 4x^2$       C.  $-2x^2 + 7x - 3$       D.  $4x^2 - 4x + 1$

10. Reszta z dzielenia wielomianu  $W(x) = 2(x^2 - 3x + 1)^2 - (5 - 2x)^2$  przez dwumian  $x + 1$  jest równa:

- A. 1                      B. -7                      C. 6                      D. -5

11. Ilorazem z podzielenia wielomianu  $2x^3 - 3x^2 - 4$  przez dwumian  $x - 2$  jest wielomian:

- A.  $2x^2 + x - 2$       B.  $2x^2 + x + 2$       C.  $2x^2 + 2$               D.  $2x^2 - x + 2$

12. Wyrażenie  $5x^5 - 5x^2$  po rozłożeniu na czynniki przyjmuje postać:

- A.  $5(x^2 \cdot x^3 - x \cdot x)$                       B.  $5x(x-1)(x+1)(x^2+1)$   
 C.  $x^2(x-1)(5x^2+5x+5)$               D.  $5x^2(x-1)(x+1)^2$

13. Liczba pierwiastków wielomianu  $(3x^2 - 4)(2x^2 + x + 1)(8x^3 + 125)$  jest równa:

- A. 3                      B. 4                      C. 5                      D. 7

14. Iloczyn rozwiązań równania  $2x(x-4) = (x-4)(x^2-3)$  wynosi:

- A. 0                      B. -3                      C. 12                      D. -12

15. Które z podanych równań jest sprzeczne?

- A.  $(x-3)^3 = 5 \cdot (x-3)^3$                       B.  $x^4 + 3 = -4x^2$   
 C.  $(2x-1)^4 - 1 = 0$                       D.  $(x^3-1)^3 = -27$

## Zadania powtórzeniowe do rozdziału 8.

16. Dane są wielomiany  $W(x) = (x^2 + 2x + 4)(2-x)$  oraz  $G(x) = (x-1)^3$ . Zapisz wielomian  $F(x) = W(x) \cdot (x-4) - (1-x) \cdot G(x)$  w postaci uporządkowanej. Ile pierwiastków ma wielomian  $F(x)$ ?

17. Sprawdź, czy istnieją liczby  $a$  i  $b$ , dla których wielomiany  $W(x) = x^3 + a^2x^2 - 3x + a$  oraz  $F(x) = x^3 + 4x^2 + (a+b)x + b - 1$  są równe.

18. Usuń niewymierność z mianownika ułamka:

- a)  $\frac{1}{2\sqrt[3]{5}-1}$                       b)  $\frac{1}{\sqrt[3]{4-3\sqrt[3]{2}+9}}$

19. Wielomian  $W(x)$  rozłóż na czynniki możliwie najniższego stopnia. Następnie podaj jego pierwiastki.

- a)  $W(x) = -x^5 + 25x^3 + x^2 - 25$                       b)  $W(x) = x^4 - 31x^2 + 30x$

20. Wielomian  $W(x) = a(x^2 - 1)(x + 3)$ , gdzie  $a \neq 0$ , dla liczby 3 przyjmuje wartość 96.

- a) Oblicz  $a$ .  
 b) Wyznacz pierwiastki wielomianu  $F(x) = W(x) - 10(x + 1)$ .

21. Reszta z dzielenia wielomianu  $W(x) = x^3 + (a^3 - 2)x^2 + 2a^2x - a + 5$  przez dwumian  $x - 1$  jest równa 6. Oblicz  $a$ .

22. Wielomian  $W(x) = 2x^3 + (b-a)x^2 - (3a-b)x + a + 2b$  jest podzielny przez dwumian  $x - 3$ , natomiast reszta z dzielenia wielomianu  $W(x)$  przez dwumian  $x + 1$  jest równa 12.

- a) Oblicz  $a$  i  $b$ .  
 b) Wyznacz całkowite pierwiastki wielomianu  $W(x)$ .

23. Rozwiąż równanie:

- a)  $(2x - 5)^3 - 8 = 0$                       b)  $4x^4 + 35x^2 - 9 = 0$   
 c)  $x^4 + 3x^3 - 2x - 6 = 0$                       d)  $3x^3 - 10x^2 + 9x = 2$ .

24. W trzycyfrowej liczbie nieparzystej podzielnej przez 5, cyfra dziesiątek jest o 2 mniejsza od cyfry setek. Wyznacz tę liczbę wiedząc, że sześćdziesiąt cyfry dziesiątek jest o 12 mniejszy od iloczynu pozostałych cyfr.

25. Wielomian  $W(x)$  jest trzeciego stopnia i ma trzy całkowite pierwiastki, z których jeden jest równy  $-2$ , a drugi 4. Reszta z dzielenia tego wielomianu przez dwumian  $x + 1$  jest równa  $-10$ . Wiedząc, że suma wszystkich współczynników tego wielomianu wynosi 0, wyznacz wzór wielomianu  $W(x)$ :

- a) w postaci iloczynu dwumianów stopnia pierwszego,  
 b) w postaci uporządkowanej malejąco.

D 26. Wykaż, że wielomian  $W(x) = (2x^{10} + 3x)^{15} + 1$  jest podzielny przez dwumian  $(x + 1)$  i nie jest podzielny przez dwumian  $(x - 1)$ .

D 27. Wykaż, że jeśli  $x - y = 5$  oraz  $x \cdot y = 1$ , to  $x^3 - y^3 = 140$ .

D 28. Wykaż, że liczba:

- a)  $5^{18} - 7^{12}$  jest podzielna przez 19  
 b)  $5^{51} - 3^{17}$  jest podzielna przez 61.

D 29. Wykaż, że dla dowolnej liczby całkowitej nieparzystej  $x$  liczba  $3x^3 + 9x^2 - x - 3$  jest podzielna przez 4.

- D 30.** Wykaż, że suma sześcianów trzech kolejnych liczb naturalnych niepodzielnych przez 4 jest podzielna przez 4.
- D 31.** Wykaż, że  $a^4 \leq \frac{1+4a^8}{4}$ .
- D 32.** Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej  $a$  różnej od zera, wartość wyrażenia  $(a-1)^2(a+1)^2 - a(1-2a)^3 - 12a^3 - a$  jest ujemna.
- D 33.** Wykaż, że  $(x+3)^3 - (x-1)^3 \geq 16$  dla dowolnej liczby rzeczywistej  $x$ .

## Odpowiedzi do zadań

### 1. Przekształcenia wykresów funkcji

**Wektor w układzie współrzędnych – podstawowe informacje**

- 1.2.  $\vec{u} = [3, 0]$ ,  $\vec{v} = [-4, 0]$ ,  $\vec{r} = [0, 5]$ ,  $\vec{p} = [0, -4]$ ,  $\vec{k} = [4, 2]$ ,  $\vec{t} = [-4, 3]$ ,  
 $\vec{m} = [-4, -2]$ ,  $\vec{s} = [3, -5]$
- 1.3. a)  $\vec{AB} = [6, -3]$  b)  $\vec{AB} = [2, 3\sqrt{3}]$  c)  $\vec{AB} = \left[\frac{1}{2}, 2\frac{2}{3}\right]$  d)  $\vec{AB} = \left[\frac{9}{2}, -14\right]$
- 1.4.  $\vec{AB} = [3, -1]$ ,  $\vec{CA} = [2, -8]$ ,  $\vec{BC} = [-5, 9]$ ,  $\vec{BA} = [-3, 1]$ ,  $\vec{AC} = [-2, 8]$ ,  
 $\vec{CB} = [5, -9]$
- 1.5. a) 13 b)  $7\frac{1}{2}$  c) 61 d) 3
- 1.6. a)  $|\vec{AB}| = \sqrt{13}$  b)  $|\vec{AB}| = \sqrt{5}$  c)  $|\vec{AB}| = 25$  d)  $|\vec{AB}| = \frac{3\sqrt{13}}{4}$
- 1.7. a)  $B(-3, 9)$  b)  $B(-1, 13)$  c)  $B(4, -9)$  d)  $B(4\sqrt{2}, \sqrt{2})$
- 1.8. a)  $A(-5, 7)$  b)  $A(5, -11)$  c)  $A\left(\frac{1}{4}, 4\frac{1}{6}\right)$  d)  $A(-\sqrt{3}, -5)$
- 1.9. wektory równe:  $\vec{AB}$  i  $\vec{CE}$ ; pary wektorów przeciwnych:  $\vec{AB}$  i  $\vec{AD}$ ,  $\vec{CE}$  i  $\vec{AD}$  oraz  $\vec{AE}$  i  $\vec{CD}$
- 1.10. a)  $P(1, 4)$  b)  $P\left(-1\frac{1}{2}, 2\frac{1}{2}\right)$
- 1.11. a)  $S(-2, 1)$  b)  $S(1, 1)$  c)  $S(-1, 8)$  d)  $S\left(-3\frac{1}{2}, -3\frac{1}{2}\right)$
- 1.12. a)  $B(4, -1)$  b)  $B(12, -4)$  c)  $B(0, -2)$  d)  $B(-8, -3)$
- 1.13. a)  $A(-7, 5)$  b)  $A(4, 6)$
- 1.14. Wektory  $\vec{CA}$  i  $\vec{BD}$  są przeciwnie; *wskazówka*: Wykaż, że trójkąty  $ACB$  i  $CDB$  są przystające.
- 1.15. a)  $\vec{FS}$ ,  $\vec{SC}$ ,  $\vec{ED}$
- 1.16.  $|\vec{AB}| = \sqrt{82}$ ;  $|\vec{AC}| = 5\sqrt{2}$ ;  $|\vec{BC}| = 4\sqrt{2}$ ; trójkąt jest prostokątny
- 1.17. a)  $\sqrt{58} + \sqrt{5} + \sqrt{37}$  b)  $\frac{\sqrt{89}}{2}$
- 1.18. a) tak;  $8\sqrt{5}$  b) nie;  $12\sqrt{2} + 2\sqrt{17}$
- 1.19. a)  $D(-2, 2)$  b)  $S(-0,5; 2)$  c)  $|\vec{AC}| = \sqrt{61}$ ,  $|\vec{BD}| = 3$
- 1.20.  $C(2, 2)$ ,  $D(0, 7)$ ,  $|\vec{AB}| = |\vec{CD}| = \sqrt{29}$ ,  $|\vec{BC}| = |\vec{AD}| = 5$
- 1.21.  $B(3, -4)$ ,  $|\vec{AB}| = 10$

Przesunięcia równoległe. Przesunięcia równoległe wzdłuż osi  $OX$ 

1.22. a)  $A_1(1, 2)$  b)  $A_1(3, 5)$  c)  $A_1(5, 10)$

1.23. a)  $B(6, 2)$  b)  $B(10, -3)$  c)  $B(1, -5)$

1.24. a)  $h(x) = f(x-3)$

x	1	2	3	4	5	6
h(x)	0	1	2	0	1	2

b)  $h(x) = f(x+2)$

x	-4	-3	-2	-1	0	1
h(x)	0	1	2	0	1	2

1.25. a)

x	7	8	9	10	11
g(x)	-10	-5	0	5	10

1.26. a) o 4 jednostki w prawo;  $\vec{u} = [4, 0]$  b) o 6 jednostek w lewo;  $\vec{u} = [-6, 0]$


c) o 5 jednostek w lewo;  $\vec{u} = [-5, 0]$  d) o 10 jednostek w prawo;  $\vec{u} = [10, 0]$

1.27.  $D_f = \langle -6, 3 \rangle$   $D_g = \langle -2, 7 \rangle$   $D_h = \langle -7, 2 \rangle$


1.28. miejsca zerowe: funkcji  $f$ : -3 oraz 2; funkcji  $g$ : -6 oraz -1; funkcji  $h$ : -1 oraz 4

1.29. a) 2 b) -6



1.30. a)  $g(x) = \sqrt{x+3}$ ,  $\vec{u} = [-3, 0]$




b)  $g(x) = (x-2)^2$ ,  $\vec{u} = [2, 0]$




c)  $g(x) = -\frac{1}{2}(x-5) = -\frac{1}{2}x + 2,5$ ,  $\vec{u} = [5, 0]$  d)  $g(x) = |x+1|$ ,  $\vec{u} = [-1, 0]$



e)  $g(x) = (x+1)^3$ ,  $\vec{u} = [-1, 0]$



f)  $g(x) = \frac{1}{x-3}$ ,  $\vec{u} = [3, 0]$



1.31. a)  $\vec{u} = [5, 0]$  b)  $\vec{u} = [-10, 0]$  c)  $\vec{u} = [3, 0]$  d)  $\vec{u} = [-8, 0]$  e)  $\vec{u} = [1, 0]$  f)  $\vec{u} = [4, 0]$

1.32. a)  $g(1) = 4$  b) funkcja  $g$  jest malejąca w przedziale  $(-\infty, 3)$  i rosnąca w przedziale  $(3, +\infty)$

1.33. a)  $D = \langle -2, +\infty \rangle$  b) -2

1.34. a)  $D_g = \mathbb{R} - \{1\}$  b)  $(0, -1)$  c)  $(-\infty, 1), (1, +\infty)$

1.35. a)  $g(x) = (x+2)^3$

1.36. a)  $D_g = (-1, 7)$  b) funkcja  $g$  jest malejąca w przedziale  $(-1, 4)$  i rosnąca w przedziale  $(4, 7)$

1.37. d)  $D_g = \langle -2017, -2002 \rangle$

1.38. miejsca zerowe: -12, -8, -2; zbiór wartości:  $\langle -3, 5 \rangle$

1.39. c)  $(5, 10), (10, 11), (11, 5)$

1.40. a)  $g(x) = x^2 - 10x + 26$  b)  $g(x) = 2x + 5$

c)  $f(x) = x^2 - x - 2$  d)  $g(x) = (x-3)(x-9)$

Przesunięcia równoległe wzdłuż osi  $OY$ 

1.42. a)  $h(x) = f(x) + 2$  b)  $h(x) = f(x) - 7$

x	-2	-1	0	1	2	3
h(x)	6	5	4	2	3	4

x	-2	-1	0	1	2	3
h(x)	-3	-4	-5	-7	-6	-5

1.44. a)  $\vec{u} = [0, 1]$  b)  $\vec{u} = [0, -2]$  c)  $\vec{u} = [0, -6]$  d)  $\vec{u} = [0, 3]$

1.45. a) o 4 jednostki do dołu;  $\vec{u} = [0, -4]$  b) o 2 jednostki do góry;  $\vec{u} = [0, 2]$

c) o 8 jednostek do góry;  $\vec{u} = [0, 8]$  d) o 3 jednostki do dołu;  $\vec{u} = [0, -3]$

1.46. -45

1.47. 8

1.48. dla funkcji  $f$ :  $(0, 2)$ ; miejsce zerowe: 3 dla funkcji  $g$ :  $(0, 4)$ ; brak miejsc zerowych dla funkcji  $h$ :  $(0, -3)$ ; brak miejsc zerowych

1.49. a)  $g(x) = -2x + 6$ ,  $\vec{u} = [0, 5]$  b)  $g(x) = \sqrt{x} - 3$ ,  $\vec{u} = [0, -3]$

c)  $g(x) = 3x^2 - 7$ ,  $\vec{u} = [0, -7]$  d)  $g(x) = |x| + 4$ ,  $\vec{u} = [0, 4]$

e)  $g(x) = \frac{4}{x} - 2$ ,  $\vec{u} = [0, -2]$  f)  $g(x) = \frac{1}{5}x^3 + 3$ ,  $\vec{u} = [0, 3]$

1.51. a) -0,5 b)  $ZW_g = \mathbb{R} - \{2\}$  c) funkcja jest malejąca w przedziałach:  $(-\infty, 0)$ ,  $(0, \infty)$

1.52. a) -1, 1 b)  $ZW_g = \langle -1, +\infty \rangle$  c)  $(-\infty, 0)$

1.53. a) 4 b) 6 c)  $\langle 3, 5 \rangle$

1.54. a)  $g(x) = |x| - 4$  c) najmniejsza wartość funkcji  $f$ : 0; najmniejsza wartość funkcji  $g$ : -4

1.55. a)  $D_g = \langle -1, 2 \rangle$ ,  $ZW_g = \langle -2, 7 \rangle$  b)  $(0, -1)$

1.56. a)  $(-16, -6)$  d)  $\langle 2341, 2351 \rangle$

1.57. c)  $(-3, -9)$ ,  $(2, -9)$

1.58. c)  $g(x) = x^2 + 2x + 3$

1.59. a)  $\vec{v} = [0, 6]$  b) nie

1.60.  $\vec{v} = [-4, 0]$

1.61. a)

$x$	-3	-2	1	6	13	41	101
$g(x)$	-5	-3	0	6	7	30	405

1.62. a)  $\vec{u} = [2, 4]$  b)  $\vec{u} = [-1, 5]$  c)  $\vec{u} = [-5, -3]$  d)  $\vec{u} = [7, -2]$  e)  $\vec{u} = [\sqrt{3}, 10]$







f)  $\vec{u} = [-4, -\sqrt{2}]$

1.63. a)  $g(x) = \sqrt{x-1} + 2$  b)  $g(x) = (x+2)^2 + 3$  c)  $g(x) = |x-4| - 5$  d)  $g(x) = \frac{1}{x-1} - 3$

1.64. a)  $\vec{u} = [1, 8]$  b)  $\vec{u} = [-20, -4]$  c)  $\vec{u} = [-3, -1]$  d)  $\vec{u} = [1, 4]$  e)  $\vec{u} = [-2, 6]$

f)  $\vec{u} = [5, -7]$

1.65.



1.66. a) funkcja  $g$  jest rosnąca w przedziałach:  $\langle -9, -5 \rangle$ ,  $\langle -2, 3 \rangle$  i malejąca w przedziałach  $\langle -5, -2 \rangle$  b) dla  $x = -5$  funkcja  $g$  przyjmuje wartość największą, równą 7; dla  $x = -2$  funkcja  $g$  przyjmuje wartość najmniejszą, równą 1 c) 24

1.67. a)  $D_g = (-\infty, -2)$ ,  $ZW_g = (-2, 3)$  b)  $D_g = \langle 5, 15 \rangle$ ,  $ZW_g = \langle -9, -1 \rangle$  c)  $D_g = \mathbb{R} - \{-1\}$ ,  $ZW_g = (-7, +\infty)$  d)  $D_g = (-5, 4)$ ,  $ZW_g = (-\infty, 10)$

1.68. a)  $g(x) = x^2 + 7x + 10$  b)  $g(x) = \frac{x-3}{x-1} + 1$  c)  $g(x) = -3x^2 - 6x + 4$

d)  $g(x) = 2x^2 + 8x + 13$

### Symetria osiowa. Symetria osiowa względem osi $OX$ i $OY$

1.70. 1) a) dwie b) trzy c) jedną d) cztery e) pięć f) nieskończenie wiele

1.72. a)  $D_g = (-6, 5)$ ,  $ZW_g = \langle -2, 4 \rangle$  b)  $D_g = (-7, 4)$ ,  $ZW_g = \langle -3, 3 \rangle$

c)  $D_g = \langle -3, 6 \rangle$ ,  $ZW_g = \langle -4, 0 \rangle$  d)  $D_g = \langle -5, 5 \rangle$ ,  $ZW_g = \langle -4, -1 \rangle \cup \langle 2, 5 \rangle$

1.73. a)  $g(x) = -3x + 2$  b)  $g(x) = 5x - 8$  c)  $g(x) = -x^3 - 8$  d)  $g(x) = x^2 - 1$

e)  $g(x) = -|x| + 15$  f)  $g(x) = -\sqrt{x} - 7$

1.74. a)  $g(x) = 4$  b)  $g(x) = -x + 3$  c)  $g(x) = -x^2$  d)  $g(x) = -x^3$  e)  $g(x) = -\sqrt{x+2}$  f)  $g(x) = -x^2 + 1$

1.75. a)  $D_g = \langle -4, 3 \rangle$ ,  $ZW_g = \langle -5, 1 \rangle$  b)  $D_g = \mathbb{R} - \{3\}$ ,  $ZW_g = (-\infty, 4)$


1.76. a)

$x$	-7	-2	-1	3	4	6	10
$g(x)$	13	5	2	0	-1	-4	-5


1.77. a)  $D_g = \langle -4, 3 \rangle$ ,  $ZW_g = \langle -2, 4 \rangle$  b)  $D_g = \langle -3, -1 \rangle \cup \langle 0, 5 \rangle$ ,  $ZW_g = \langle -2, 5 \rangle$

c)  $D_g = \langle -4, 3 \rangle$ ,  $ZW_g = \langle 0, 4 \rangle$  d)  $D_g = (-3, 6)$ ,  $ZW_g = \langle -3, 4 \rangle$


178. a)  $h(x) = -x + 2$ , gdzie  $x \in (-2, 4)$



d)  $h(x) = -x^3 - 2$ , gdzie  $x \in (-2, 1)$



f)  $h(x) = (1-x)^2$ , gdzie  $x \in (-1, 3)$



179. a)  $g(x) = -5x - 4$ ,  $D_g = \mathbb{R}$  b)  $g(x) = \sqrt{-x} + 2$ ,  $D_g = (-\infty, 0)$  c)  $g(x) = |3-x|$ ,  $D_g = \mathbb{R}$


d)  $g(x) = \frac{1}{6-x}$ ,  $D_g = \mathbb{R} - \{6\}$  e)  $g(x) = \sqrt{-x-4}$ ,  $D_g = (-\infty, -4)$

f)  $g(x) = \frac{-2x}{1+x}$ ,  $D_g = \mathbb{R} - \{-1\}$


180. a)  $D_g = (-3, 4)$ ,  $ZW_g = (-1, 5)$  b)  $D_g = \mathbb{R} - \{-3\}$ ,  $ZW_g = (-4, +\infty)$

1.81.





a)



b)



c)



182. a)  $g(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (-5, 4)$ ,  $h(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (-6, -4)$  b)  $g$  rosnąca w przedziałach:  $\langle -5, 0 \rangle$ ,  $\langle 2, 6 \rangle$ ;  $h$  rosnąca w przedziałach:  $\langle -6, -2 \rangle$ ,  $\langle 0, 5 \rangle$

183. a)  $-6, -1, 5$ ;  $(0, 4)$  b)  $-5, 1, 6$ ;  $(0, -4)$  c)  $-8, -2, 3$ ;  $(0, 2)$

185. a)  $y = \frac{x-3}{2x}$  b)  $y = -\frac{x+3}{2x}$

Symetria środkowa. Symetria środkowa względem punktu  $(0, 0)$ 

1.88. a)

$x$	-45	-30	-11	-8	0	3	4
$g(x)$	-80	-31	-5	-2	6	8	20

1.89. a)  $D_g = \langle -5, 2 \rangle$ ,  $ZW_g = \{-2\}$



b)  $D_g = (-5, 4)$ ,  $ZW_g = (-5, -1)$

c)  $D_g = (-3, 4)$ ,  $ZW_g = \langle -2, 3 \rangle$


d)  $D_g = (-5, 5)$ ,  $ZW_g = (-3, -1) \cup \langle 1, 3 \rangle$

1.90. a)  $g(x) = x - 4$ ;  $D_g = (0, 3)$

b)  $g(x) = -\sqrt{-x}$ ;  $D_g = (-4, 0)$



d)  $g(x) = \frac{1}{x}$ ;  $D_g = \langle -4, -1 \rangle$



1.91. a)  $ZW_g = \langle -4, 2 \rangle$  b)  $-4$  c)  $12$  d)  $\langle -5, -3 \rangle$ ,  $\langle 1, 3 \rangle$

1.92. a)  $D_g = (-7, 3)$ ,  $ZW_g = \langle -4, 0 \rangle$  b)  $D_g = (-5, 1)$ ,  $ZW_g = \langle -2, 6 \rangle$

c)  $D_g = \langle -9, +\infty \rangle$ ,  $ZW_g = \mathbb{R} - \{8\}$  d)  $D_g = \langle -\sqrt{2}, 4 \rangle$ ,  $ZW_g = (-\infty, 1)$

1.93. a)  $g(x) = -4x - 7$ ;  $\frac{-7}{4}$ ;  $(0, -7)$  e)  $g(x) = 1 - \sqrt{-x}$ ;  $-1$ ;  $(0, 1)$

f)  $g(x) = 3(x+2)(1-x)$ ;  $-2, 1$ ;  $(0, 6)$

### Zastosowanie wykresów funkcji do rozwiązywania równań i nierówności

1.94.  $x \in \{-1, -3\}$

1.95.  $x = -4$

1.96.  $x \in \{1, 3\}$

1.97. a)  $x \in (0, +\infty)$  b)  $x = 4$  c)  $x = -4$

1.98. a)  $x \in \{-2, 1\}$  b)  $x \in \{2, 5\}$  c)  $x \in \{-1, 1\}$

1.99. a)  $x = 1$  b)  $x \in \{-1, 1\}$  c)  $x = 7$

1.100.  $(-\infty, -3) \cup (-2, +\infty)$

1.101.  $\{1, 5\}$

1.102.  $(-\infty, 0) \cup (4, +\infty)$

1.103. a)  $x = -1$  b)  $x \in (-1, 0)$

1.104. a)  $x \in (-1, 0) \cup (1, +\infty)$  b)  $x \in (2, 6)$  c)  $x \in (-\infty, -1)$

1.105. a)  $x \in (-\infty, -6) \cup (2, +\infty)$  b)  $x \in (-2, -1)$  c)  $x \in (-\infty, 3) \cup (4, 5) \cup (5, +\infty)$

### Test sprawdzający do rozdziału 1.

Nr zadania	1	2	3	4	5	6	7	8
Odpowiedź	D	D	B	B	D	A	C	A
Nr zadania	9	10	11	12	13	14	15	
Odpowiedź	B	D	B	C	B	C	C	

### Zadania powtórzeniowe do rozdziału 1.

16. a)  $A(6, -8)$  b)  $C(12, -23)$

17.  $D(-4, 2)$ ,  $|AC| = 6\sqrt{2}$

18.  $D(-7, 11)$


19. **wskazówka** Wykaż, że  $\vec{DC} = 2\vec{AB}$ .

20. a)  $g(x) = -x^2 - 6x + 1$  b)  $a = 9$


21. a)  $g(x) = 3x - 1$  b)  $\vec{u} = [0, 6]$

23. a)  $g(x) = 2x - 3$  b)  $h(x) = 2x + 3$  c)  $k(x) = -2x - 3$


24. a)



b)  $x \in (-4, -1)$



b)  $\langle -3, -2 \rangle$ ,  $\langle 2, 3 \rangle$



b)  $x \in (-3, 1) \cup (1, 5)$

27. a)  $D = \langle -8, 4 \rangle$ ,  $ZW = \langle -1, +\infty \rangle$  b)  $D = \langle -4, 8 \rangle$ ,  $ZW = (-\infty, 1)$   
c)  $D = \langle -7, 5 \rangle$ ,  $ZW = \langle -5, +\infty \rangle$

28. a)  $g(x) = \frac{x}{2} - 1$  b)  $x \in \langle -2, 0 \rangle$

29. a)  $x = -4$  b)  $x \in \{1, 3\}$  c)  $x \in \{-2, 2\}$

30. a)  $x \in (-\infty, -1) \cup \{0\}$  b)  $x \in (-2, 1)$  c)  $x \in \langle -5, -2 \rangle \cup \langle -1, +\infty \rangle$

31. b) przesunięcie równoległe o wektor  $\vec{u} = [-7, 0]$ ,  $f_1(x) = \sqrt{x+7}$ , a następnie symetria względem osi  $OY$ ,  $h(x) = \sqrt{-x+7}$

32. b)  $D_g = \langle -7, 5 \rangle$  c)  $ZW_g = \langle -2, 4 \rangle$  d) 20

## 2. Równania i nierówności z wartością bezwzględną

### Wartość bezwzględna liczby rzeczywistej

2.1. a) 4 b) 1 c)  $-0,7$  d)  $3 - \sqrt{2}$  e)  $\sqrt{5} - 2$  f) 0

2.2. a) 3 b)  $4\pi - 7$  c)  $1,7 - 2\sqrt{2}$  d)  $\sqrt{2}$  e) 0 f)  $2\sqrt{3} - 2$

2.3. a)  $-3$  b)  $2 - \sqrt{2}$  c)  $-1,2$  d)  $-\pi^2$

2.4. a)  $-11$  b)  $-11$  c) 17 d)  $345 - 140\sqrt{5}$

2.5. a) 8 b) 1 c)  $-6$  d)  $2\frac{1}{4}$

2.6. a)  $-56$  b)  $-3$

2.7. a) 5 b)  $-1$

2.8. a) 110 b) 50

2.9. a)  $a-2$  b)  $-3-a$  c)  $3a-2$  d)  $8a-4$

2.10. a)  $2a^2-2a$  b)  $-5a-1$  c)  $a+3$  d)  $1-a$

2.11. a)  $f(x) = \begin{cases} 2x, & \text{jeśli } x < 0 \\ 0, & \text{jeśli } x \geq 0 \end{cases}$  b)  $f(x) = \begin{cases} -2x-6, & \text{jeśli } x < -3 \\ 2x+6, & \text{jeśli } x \geq -3 \end{cases}$

c)  $f(x) = \begin{cases} 3x, & \text{jeśli } x < 1 \\ -3x+6, & \text{jeśli } x \geq 1 \end{cases}$  d)  $f(x) = \begin{cases} 1+\frac{1}{3}x, & \text{jeśli } x < 3 \\ 3-\frac{1}{3}x, & \text{jeśli } x \geq 3 \end{cases}$

2.12. a)  $f(x) = \begin{cases} -x^2, & \text{jeśli } x < 0 \\ x^2, & \text{jeśli } x \geq 0 \end{cases}$  b)  $f(x) = \begin{cases} -1, & \text{jeśli } x < 0 \\ 3, & \text{jeśli } x > 0 \end{cases}$

c)  $f(x) = \begin{cases} 0,5x+1, & \text{jeśli } x < 2 \\ 1,5x-1, & \text{jeśli } x \geq 2 \end{cases}$  d)  $f(x) = \begin{cases} 2x+4, & \text{jeśli } x < -4 \\ -4, & \text{jeśli } x \geq -4 \end{cases}$

2.13. a) 1 b) 6 c) -7 d) 4

2.17. a) -90 b) -23 c) 11 d) 20

**Odległość między liczbami na osi liczbowej.****Geometryczna interpretacja wartości bezwzględnej na osi liczbowej**

2.18. a)  $c=1, d=3$  b)  $c=1\frac{1}{2}, d=3\frac{1}{2}$  c)  $c=-3,45; d=4,95$

d)  $c=45\frac{7}{12}, d=42\frac{1}{4}$  e)  $c=-16\sqrt{7}, d=13\sqrt{7}$  f)  $c=-2+\sqrt{5}, d=7-3\sqrt{5}$

2.19. a) -1 i 5 b) -7 i 3 c) -33 i 19

d)  $\sqrt{2}-3$  i  $\sqrt{2}+3$  e)  $-4-\pi$  i  $\pi-2$  f)  $-3+2\sqrt{3}$  i 5

2.20. a)  $\langle -4, 6 \rangle$  b)  $\langle -1, 7 \rangle$  c)  $\langle -\infty, -5 \rangle \cup \langle 1, +\infty \rangle$

d)  $\langle -\infty, -7 \rangle \cup \langle -3, +\infty \rangle$  e)  $\langle -\infty, 5 \rangle \cup \langle 7, +\infty \rangle$  f)  $\langle -9, 1 \rangle$

2.21. a) 24 b)  $31\frac{1}{3}$  c)  $2\sqrt{3}-\pi$  d)  $6\sqrt{2}+3$  e) 8 f)  $3+4\sqrt{3}$

2.22. a)  $|x|=8$  b)  $|y-5|=1$  c)  $|-3-a|=4$  d)  $|z-8|<3$

e)  $|p+2|>7$  f)  $|k+1|\leq 5$  g)  $|7-m|\geq 2$

2.23. a)  $16-8m$  b)  $6m-15$  c)  $m+15$  d)  $m^2+33$

**Proste równania z wartością bezwzględną**

2.24. a) -3, 3 b) 4, -10 c) żadna d) -5

2.25. a)  $x \in \left[-\frac{1}{5}, \frac{1}{5}\right]$  b) równanie sprzeczne c)  $x \in \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$

d) równanie sprzeczne e)  $x=0$  f)  $x \in \{-3, 3\}$

2.26. a)  $x \in \{-1, 5\}$  b)  $x \in \{-5, 3\}$  c)  $x=3$

d)  $x \in \{-3, -1\}$  e)  $x \in \{3, 7\}$  f)  $x \in \{-1, 9\}$

2.27. a)  $x=-9$  b)  $x \in \{-5, 11\}$  c)  $x \in \{-11, -21\}$

d)  $x \in \{18, 24\}$  e)  $x \in \{-8, 6\}$  f) równanie sprzeczne

2.28. a)  $|x-11|=0$  b)  $|x+19|=0$  c) np.  $|x-1|=-1$

d)  $|x-0|=8$  e)  $|x-2|=5$  f)  $|x+2\pi|=5\pi$

2.29. a)  $|x|=\sqrt{6}$  b)  $|x-2|=\sqrt{3}$  c)  $|x+3\sqrt{5}|=0$  d)  $|x-11|=6$

e)  $|x+2,5|=6$  f)  $\left|x-\frac{2}{3}\right|=4$

2.30. a)  $x \in \{-1, 3\}$  b)  $x=4$  c)  $x \in \{-5, 3\}$  d)  $x \in \{-5, 1\}$

e) równanie sprzeczne f)  $x \in \{-6, -4\}$

2.31. a)  $x \in \{-5, 6; 8\}$  b)  $x \in \{2, 8; 4\}$  c)  $x=-2,5$  d) równanie sprzeczne

e)  $x \in \{-1, 3\}$  f)  $x \in \{-13, 7\}$

2.32. a)  $x \in \{0, 4\}$  b)  $x \in \{-4, 2; -0,6\}$  c)  $x \in \{-3, 24; -2, 76\}$

d) równanie sprzeczne e)  $x \in \{-18, 3; 24, 3\}$  f)  $x \in \{-10, 8\}$

2.33. a) równanie sprzeczne b)  $x \in \{-7+5\sqrt{5}, 7-\sqrt{5}\}$  c)  $x \in \{5\sqrt{3}-7, 7-\sqrt{3}\}$

d)  $x \in \{-10\sqrt{2}-1, 1\}$  e)  $x \in \{2\sqrt{2}-3, 3\}$  f)  $x \in \{-6\sqrt{3}-2, 2\sqrt{3}-2\}$

2.34. a)  $x \in \left\{-3, -1\frac{2}{3}\right\}$  b)  $x \in \left\{-4\frac{19}{25}, 5\right\}$  c)  $x \in \left\{-3, 7\frac{1}{2}\right\}$

d)  $x \in \{-6, 7\}$  e)  $x \in \left\{-\frac{3}{4}, 2\right\}$  f)  $x \in \left\{-3\frac{3}{5}, 2\frac{4}{5}\right\}$

2.35. a)  $x \in \{-2, -6\}$  b)  $x \in \{2, 4\}$  c)  $x \in \{-5, 3\}$  d) równanie sprzeczne

e)  $x=3$  f)  $x \in \{-6, 2\}$

2.36. a)  $A = \{1, 3\}, B = \{-5\}, C = \{-5, 3\}$

b)  $(B \cup C) \cap A = \{3\}, (A - C) \cup B = \{-5, 1\}, C - A - B = \emptyset$

**Proste nierówności z wartością bezwzględną**

2.37. a) 3, 6, 7 b) -9, 6 c)  $-2, 3\frac{1}{5}, 5$  d) -2

2.38. a)  $x=0$  b)  $\mathbb{R} - \{-1\}$  c)  $\mathbb{R}$  d)  $\emptyset$

2.40. a)  $x \in \langle -4, 4 \rangle$  b)  $x \in \langle -\infty, -6 \rangle \cup \langle 6, +\infty \rangle$  c)  $x \in \langle -\infty, -9 \rangle \cup \langle 9, +\infty \rangle$

d)  $x \in \langle -2, 2 \rangle$  e)  $x \in \langle -8, 8 \rangle$  f)  $x \in \langle -\infty, -\sqrt{3} \rangle \cup \langle \sqrt{3}, +\infty \rangle$

2.41. a)  $x \in \langle 1, 7 \rangle$  b)  $x \in \langle -3, 1 \rangle$  c)  $x \in \mathbb{R} - \{2\}$  d)  $x \in \langle -3, 5 \rangle$

e)  $x \in \langle 2, 4 \rangle$  f)  $x \in \langle -\infty, -7 \rangle \cup \langle -3, +\infty \rangle$

2.42. a)  $x \in \langle -\infty, -3 \rangle \cup \langle 1, +\infty \rangle$  b)  $x \in \langle -\infty, 0 \rangle \cup \langle 2, +\infty \rangle$  c)  $x \in \langle -2, 2 \rangle$

d)  $x \in \langle 0, 8 \rangle$  e)  $x \in \langle -\infty, -7 \rangle \cup \langle -5, +\infty \rangle$

2.43. a) np.  $|x| < 9$  b) np.  $|x| > \sqrt{3}$  c) np.  $|x-4| < 8$  d) np.  $|x+1| \geq 3$

e) np.  $|x-6| > 1$  f) np.  $|x-5| \leq 5$  g) np.  $|x+2| \leq 7$

h) np.  $|x-2| < \sqrt{3}$  i) np.  $|x-\pi| < 3\pi$

- 2.44. a)  $x \in (-\infty, 4) \cup (6, +\infty)$  b)  $x \in \langle -5, -1 \rangle$  c)  $x \in (-\infty, -7) \cup \langle -1, +\infty \rangle$   
 2.45. a)  $x \in \langle -9, 8 \rangle$  b)  $x \in (-\infty, 1, 2) \cup (4, +\infty)$  c)  $x \in (-\infty, -1, 5) \cup \langle 1, +\infty \rangle$   
 d)  $x \in (-0, 5; 3, 1)$  e)  $x = -\frac{10}{3}$  f)  $x \in (-1, 2; 1, 8)$   
 2.46. a)  $x \in (\sqrt{2}-1, \sqrt{2}+1)$  b)  $x \in (-\infty, -3\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$  c)  $-\sqrt{5}$   
 d) nierówność sprzeczna e)  $x \in (-\infty, \sqrt{2}-2) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$  f)  $x \in (-\sqrt{3}-9, -\sqrt{3}-1)$   
 2.47. a)  $x \in \langle -37\frac{2}{3}, 29 \rangle$  b)  $x \in (-4, 4\frac{1}{3})$  c)  $x \in (-\infty, -1\frac{4}{5}) \cup (3\frac{2}{5}, +\infty)$   
 d)  $x \in (-\infty, 2) \cup (3\frac{2}{3}, +\infty)$  e)  $x \in (-\infty, 3) \cup (4, +\infty)$  f)  $x \in (-\frac{1}{5}, 1)$   
 2.48. a)  $x \in \mathbf{R} - \left\{ \frac{1}{10} \right\}$  b) nierówność sprzeczna c)  $x \in (13, 17)$   
 d)  $x \in \mathbf{R}$  e)  $x = \frac{8}{9}$  f)  $x \in (-\infty, 1-\sqrt{5}) \cup (3+\sqrt{5}, +\infty)$   
 2.49. a)  $-4, -2$  c)  $A \cap B = (-6, -5) \cup \langle -3, 0 \rangle$ ,  $B - A = (-\infty, -6) \cup (0, +\infty)$   
 2.50. a)  $A = (-2, 2)$ ,  $B = \langle -3, 1 \rangle$  b)  $0, 1$  d)  $A' \cap B' = (-\infty, -3) \cup (2, +\infty)$   
 2.51. a)  $0, 1, 2$  b)  $3, 4, 5$  c)  $-2, -1, 0, 1, 2$  d)  $0$   
 2.52. a)  $x \in (3, 5)$  b)  $x \in \langle -3, -1\frac{2}{3} \rangle \cup \langle -\frac{1}{3}, 1 \rangle$

## Test sprawdzający do rozdziału 2.

Nr zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Odpowiedź	D	C	A	D	B	D	B	A	D	B

## Zadania powtórzeniowe do rozdziału 2.

11. a)  $a = 3\frac{1}{3}$ ; wartość wyrażenia: 2 b)  $b = 55$ ; wartość wyrażenia:  $-335$   
 12. 1  
 14. a)  $1 - x$  b)  $-3a - 3b$   
 15. a)  $x \in \{-1, 9\}$  b) równanie sprzeczne c)  $x = -3$   
 16. a)  $x \in \{-10, -4\}$  b)  $x \in \{-13, 5\}$   
 17. a)  $x \in (-\infty, -5) \cup (11, +\infty)$  b)  $x \in (-18, -8)$   
 18. a)  $x \in \{-8, -2\}$  b)  $x \in \langle -7, 3 \rangle$   
 19. a)  $x \in (-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$  b)  $x = -5$  c)  $x \in \mathbf{R} - \{-1\}$  d)  $x \in \mathbf{R}$   
 20. a)  $x \in (-\infty, 2) \cup (4, 6)$  b)  $x \in \langle -10, -5 \rangle \cup \langle -3, 2 \rangle$   
 21.  $A \cup B = \mathbf{R}$ ,  $A \cap B = \langle -7, -1 \rangle$ ,  $A - B = (-1, 3)$ ,  $B - A = (-\infty, -7) \cup (3, +\infty)$   
 24. a)  $x = 7$  b)  $x \in \langle -3, 1 \rangle$

## 3. Funkcja kwadratowa

## Przypomnienie wiadomości o funkcji kwadratowej z klasy 1.

- 3.1. a)  $f(x) = 2x^2 - 3x - 3$ ;  $a = 2, b = -3, c = -3$  b)  $f(x) = -2x^2 - 16x - 27$ ;  $a = -2, b = -16, c = -27$  c)  $f(x) = -6x^2 + 3x$ ;  $a = -6, b = 3, c = 0$  d)  $f(x) = 4x^2$ ;  $a = 4, b = 0, c = 0$   
 3.2. a)  $y = \frac{2}{3}x^2$  b)  $y = -x^2$  c)  $y = 2\sqrt{5}x^2$   
 3.3. a)  $b = 2, c = -15$  b)  $b = -5, c = 0$   
 3.4. a)  $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + 4$  b)  $f(x) = -3x^2 + 9$   
 3.5. a)  $y = \frac{1}{3}(x+5)^2$  b)  $y = -2(x-3)^2$  c)  $y = \frac{2}{5}x^2 + 4$  d)  $y = -x^2 - 2$   
 3.6. a)  $y = -\frac{1}{4}(x-2)^2 - 3$  b)  $y = -\frac{1}{4}(x+1)^2 - 5$  c)  $y = -\frac{1}{4}(x+3)^2 + 4$   
 d)  $y = -\frac{1}{4}(x-5)^2 + 2$   
 3.7. a)  $W(-3, 0), (0, -9)$  b)  $W(1, 1), (0, 3)$  c)  $W(0, -4), (0, -4)$   
 d)  $W(-3, -2), (0, 2\frac{1}{2})$  e)  $W(1, 0), (0, \frac{1}{4})$  f)  $W(2, -1), (0, -2)$   
 3.8. a)  $ZW = (-\infty, 3)$ ; funkcja jest rosnąca w przedziale  $(-\infty, 0)$ , malejąca w przedziale  $(0, +\infty)$ ;  $x = 0$  b)  $ZW = \langle -5, +\infty \rangle$ ; funkcja jest malejąca w przedziale  $(-\infty, 0)$ , rosnąca w przedziale  $(0, +\infty)$ ;  $x = 0$  c)  $ZW = \langle 0, +\infty \rangle$ ; funkcja jest malejąca w przedziale  $(-\infty, -4)$ , rosnąca w przedziale  $\langle -4, +\infty \rangle$ ;  $x = -4$  d)  $ZW = (-\infty, 7)$ ; funkcja jest rosnąca w przedziale  $(-\infty, 1)$ , malejąca w przedziale  $(1, +\infty)$ ;  $x = 1$  e)  $ZW = \langle -3, +\infty \rangle$ ; funkcja jest malejąca w przedziale  $(-\infty, -5)$ , rosnąca w przedziale  $\langle -5, +\infty \rangle$ ;  $x = -5$  f)  $ZW = (-\infty, -4)$ ; funkcja jest rosnąca w przedziale  $(-\infty, 2)$ , malejąca w przedziale  $(2, +\infty)$ ;  $x = 2$   
 3.9. a)  $f(x) = -\frac{1}{3}(x-2)^2$ ,  $f(x) = -\frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{3}x - \frac{4}{3}$   
 b)  $f(x) = \frac{1}{4}(x-3)^2 + 1$ ,  $f(x) = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x + 3\frac{1}{4}$   
 c)  $f(x) = -2(x+1)^2 + 3$ ,  $f(x) = -2x^2 - 4x + 1$   
 d)  $f(x) = \frac{1}{2}\left(x-2\frac{1}{2}\right)^2 - 3\frac{1}{8}$ ,  $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2\frac{1}{2}x$   
 e)  $f(x) = -\frac{1}{3}(x+1)^2 - 1$ ,  $f(x) = -\frac{1}{3}x^2 - \frac{2}{3}x - 1\frac{1}{3}$   
 f)  $f(x) = \frac{1}{5}(x+4)^2$ ,  $f(x) = \frac{1}{5}x^2 + \frac{3}{5}x + 3\frac{1}{5}$   
 3.10.  $-6$  oraz  $0$

3.11.  $f(x) = -\frac{1}{5}(x-3)^2 + 4$

3.12.  $f(x) = 2(x+1)^2 - 2$

3.13.  $f(x) = 5(x+3)^2 + 5$

3.14.  $f(x) = -\frac{3}{4}(x-2)^2 + 4$

**Związek między wzorem funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, a wzorem funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej**

3.16. a)  $f(x) = 4x^2 - 24x + 16$  b)  $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 4x + 2$  c)  $f(x) = -5x^2 + 10x - 4$

3.17. a)  $f(x) = (x-1)^2 - 1$  b)  $f(x) = -2\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + 5\frac{1}{2}$  c)  $f(x) = -(x-1)^2 + 9$

d)  $f(x) = 3(x-4)^2 + 2$  e)  $f(x) = \frac{1}{2}(x+3)^2 - 4$  f)  $f(x) = -\frac{1}{4}(x-4)^2 + 6$

3.18. a)  $\Delta = 0$  b)  $\Delta = 49$  c)  $\Delta = 64$  d)  $\Delta = -3$  e)  $\Delta = 0$  f)  $\Delta = -15$

3.19. a)  $f(x) = 2\left(x + \frac{3}{4}\right)^2 - 1\frac{1}{8}$  b)  $f(x) = x^2 - 4$  c)  $f(x) = -(x-5)^2$

d)  $f(x) = (x-3)^2 - 4$  e)  $f(x) = 4\left(x - \frac{1}{8}\right)^2 + \frac{15}{16}$  f)  $f(x) = \frac{1}{2}(x+2)^2 - 5$

3.20. a)  $b = 0$  b)  $b = 10$  c)  $b = 2$  d)  $b = -5$

3.21. a)  $a = -1, b = 8, c = -13$  b)  $a = 2, b = -2, c = 1,5$  c)  $a = 6, b = 0, c = -5$

d)  $a = -3, b = -6, c = 0$  e)  $a = -4, b = 16, c = -19$  f)  $a = 5, b = -3, c = 0,5$

3.22. a)  $a = -3, (0, -19)$  b)  $a = 2\sqrt{3}, (0, -\sqrt{3})$  c)  $a = \frac{1}{2}, \left(0, 9\frac{1}{2}\right)$

d)  $a = -1, (0, -18)$  e)  $a = \frac{1}{5}, (0, 4)$  f)  $a = 4, (0, -4)$

3.23. a)  $f(x) = (x-3)^2 - 4; (0, 5), A(6, 5)$  b)  $f(x) = -\frac{1}{2}(x+4)^2 + 1; (0, -7), A(-8, -7)$

c)  $f(x) = 2(x-2)^2 + 1; (0, 9), A(4, 9)$  d)  $f(x) = -\frac{1}{3}(x-4)^2 - \frac{2}{3}; (0, -6), A(8, -6)$

e)  $f(x) = -2\left(x + 1\frac{1}{2}\right)^2 + 4\frac{1}{2}; (0, 0), A(-3, 0)$  f)  $f(x) = \frac{1}{4}(x+4)^2 - 3; (0, 1), A(-8, 1)$

3.24. a)  $ZW = (0, +\infty)$  b)  $ZW = (-\infty, 7)$  c)  $ZW = (-\infty, 6)$  d)  $ZW = \left\langle -\frac{1}{4}, +\infty \right\rangle$

3.25. a)  $f$  jest malejąca w przedziale  $(-\infty, 3)$ , rosnąca w przedziale  $(3, +\infty)$

b)  $f$  jest rosnąca w przedziale  $(-\infty, 10)$ , malejąca w przedziale  $(10, +\infty)$

c)  $f$  jest malejąca w przedziale  $(-\infty, 6)$ , rosnąca w przedziale  $(6, +\infty)$ d)  $f$  jest rosnąca w przedziale  $\left(-\infty, -7\frac{1}{2}\right)$ , malejąca w przedziale  $\left(-7\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 

3.26. a) są dwie takie funkcje:  $f(x) = (x+3)^2 - 4$  oraz  $g(x) = (x-3)^2 - 4$  c)  $x = 0$

**Miejsce zerowe funkcji kwadratowej.****Wzór funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej**

3.27. a) 0 b) 2 c) 2 d) 0 e) 1 f) 0

3.28. a)  $-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}$  b) 3 c)  $-3, 3$  d)  $-8, 4$  e)  $f$  nie ma miejsc zerowych f)  $-3, 1$

3.29. a)  $-9, -1$  b)  $-\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3}$  c) 4, 10 d)  $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$  e)  $-4$  f) funkcja  $f$  nie ma miejsc zerowych

3.30. a)  $-2, 7$  b) 0, 4 c)  $-5$  d)  $-\sqrt{2}, 8$  e) 1, 3 f)  $4 + \sqrt{2}$

3.31. a) 0, 2 b)  $-\sqrt{5}, \sqrt{5}$  c)  $-24, 0$  d)  $-5$  e) funkcja nie ma miejsc zerowych f) 1

3.32. a)  $-\frac{1}{3}$  b) 0, 4 c)  $\frac{4}{5}$  d) funkcja nie ma miejsc zerowych e)  $-8$  f) 2

3.33. a) 2 b) 0 c) 1 d) 1 e) 0 f) 2

3.34. a)  $-5, 1$  b)  $-1, \frac{1}{3}$  c)  $-4$  d) funkcja nie ma miejsc zerowych e)  $-8, 2$  f)  $-3, 1$

3.35. a)  $\Delta = 9$ ; m. zerowe: 1, 4 b)  $\Delta = 4$ ; m. zerowe: 0,  $\frac{2}{3}$  c)  $\Delta = -16$ ; funkcja nie ma miejsc zerowych d)  $\Delta = 1$ ; m. zerowe:  $-\frac{1}{3}, -1$  e)  $\Delta = 20$ ; m. zerowe:  $6 - 2\sqrt{5}$ ,

$6 + 2\sqrt{5}$  f)  $\Delta = 76$ ; m. zerowe:  $\frac{5 - \sqrt{19}}{2}, \frac{5 + \sqrt{19}}{2}$

3.36. a)  $f(x) = -\frac{1}{4}x^2 - 2x + 5$  b)  $f(x) = 8x^2 - 96x$  c)  $f(x) = \frac{3}{5}x^2 + 6x + 15$

d)  $f(x) = -5x^2 + 25x + 120$  e)  $f(x) = -2x^2 + 6$  f)  $f(x) = -x^2 + 8x - 16$

3.37. a)  $y = \sqrt{2}(x+4)\left(x - \frac{1}{2}\right)$  b)  $y = -3x(x+2)$  c)  $y = \frac{1}{3}(x-7)^2$

d)  $y = -\frac{1}{3}(x-4)(x-8)$  e)  $y = 7(x+2)^2$  f)  $y = \frac{2}{3}(x-1+\sqrt{2})(x-1-\sqrt{2})$

3.38. a)  $f(x) = \frac{1}{2}(x+10)(x+2)$  b)  $f(x) = \frac{2}{5}x(x-4)$  c) nie istnieje

d)  $f(x) = -4(x-1)(x-9)$  e)  $f(x) = \frac{1}{8}(x-4)^2$  f)  $f(x) = \frac{5}{7}(x-7)(x+3)$

3.39. a)  $W(1, 125)$  b)  $W(0, -32)$  c)  $W(-5, -100)$  d)  $W(6, 3)$

3.40. a)  $f(x) = (x+2)^2 - 9$  b)  $f(x) = 2\sqrt{3}(x+2)^2 - 8\sqrt{3}$  c)  $f(x) = 2(x-\sqrt{6})^2$   
 d)  $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 18$  e)  $f(x) = \frac{3}{5}(x+2)^2 - 5\frac{2}{5}$  f)  $f(x) = -\frac{2}{3}(x-3\frac{1}{2})^2 + \frac{1}{6}$







3.41. a)  $f(x) = (x-3)(x+1)$  b)  $f(x) = -1 \cdot (x+6)x$  c)  $f(x) = 4(x-7)(x-3)$   
 d)  $f(x) = -9(x+4)x$  e) nie istnieje f) nie istnieje

3.42.


Wzór funkcji kwadratowej $f$ w postaci:		
iloczynowej	ogólnej	kanonicznej
a) $f(x) = -\frac{1}{4}(x+4)(x-1)$	$f(x) = -\frac{1}{4}x^2 - \frac{3}{4}x + 1$	$f(x) = -\frac{1}{4}(x+1\frac{1}{2})^2 + 1\frac{9}{16}$
b) $f(x) = \frac{2}{5}(x-5)(x-2)$	$f(x) = \frac{2}{5}x^2 - \frac{14}{5}x + 4$	$f(x) = \frac{2}{5}(x-3\frac{1}{2})^2 - \frac{9}{10}$
c) $f(x) = -\frac{1}{5}x(x-3)$	$f(x) = -\frac{1}{5}x^2 + \frac{3}{5}x$	$f(x) = -\frac{1}{5}(x-1\frac{1}{2})^2 + \frac{9}{20}$
d) $f(x) = \frac{1}{3}(x+3)(x-2)$	$f(x) = \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{3}x - 2$	$f(x) = \frac{1}{3}(x+\frac{1}{2})^2 - 2\frac{1}{12}$

3.44. **wskazówka.** Oblicz  $f(1)$ .3.45.  $\Delta = 4$ **Szczytowanie wykresów funkcji kwadratowych.****Odczytywanie własności funkcji kwadratowej na podstawie wykresu**


3.46.




3.47. a)




b)




c)




d)




e)




f)




3.48.




$$x \in \{-3, -1\}$$



$$x \in \{-1, 3\}$$




$$x \in \{-2, 2\}$$



$$x \in \{-2, 2\}$$


3.49. a)  $x \in \{-5, -2\}$



b)  $x \in (-\infty, -6) \cup (-2, +\infty)$

c)  $x \in (1, 8)$

3.50. a)  $x \in (-\infty, -2) \cup (-1, +\infty)$



b)  $x \in \mathbb{R} - \{-2\}$

c)  $x \in (-\infty, 0)$






3.51. a)  $a > 0, b < 0, c > 0$  b)  $a < 0, b > 0, c < 0$  c)  $a < 0, b < 0, c < 0$

d)  $a > 0, b > 0, c > 0$

3.52. a)  $(-\infty, 1), (3, +\infty)$  b)  $0, 2, 6$  c)  $f(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (0, 2) \cup (6, +\infty)$

3.53. b)  $ZW = (-\infty, 2)$  c)  $-6$  d)  $x \in (-3, -1)$

3.54.



b)  $ZW = \langle -5, +\infty \rangle$  c) funkcja  $f$  jest malejąca w przedziałach:  $(-\infty, -4), (-2, 2)$   
rosnąca w przedziałach:  $\langle -4, -2 \rangle, (2, +\infty)$  d)  $f(-2\pi) \cdot f(\sqrt{2}+1) < 0$

Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej na podstawie jej własności

3.56.  $b = 1, c = -1$

3.57.  $b = -1, c = -18$

3.58.  $b = 4, c = 5$

- 3.59.  $(b = -4, c = -8)$  lub  $(b = 4, c = -8)$   
 3.60.  $b = 12, c = 8$   
 3.61.  $f(x) = -0,25x^2 - 2,5x - 4$   
 3.62.  $f(x) = -2x^2 + 2x + 12$   
 3.63.  $f(x) = -3x^2 - 12x - 8$   
 3.64.  $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x + 2\frac{1}{2}$   
 3.65.  $f(x) = -\frac{1}{5}x^2 + 2x - 5$   
 3.66.  $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 8x + 30$   
 3.67.  $f(x) = -2x^2 + 24x + 90$   
 3.68.  $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 13x - 60$   
 3.69.  $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2x + 2$   
 3.70.  $f(x) = -2(x-4)(x+10)$   
 3.71.  $f(x) = \frac{1}{3}(x-6)(x+3)$   
 3.72.  $f(x) = -\frac{2}{3}x^2 + 4x + 18$   
 3.73.  $a = \frac{1}{2}, b = -3$   
 3.74.  $a = -4, b = 24$   
 3.75.  $a = -2, b = 10, c = -12$

**Najmniejsza oraz największa wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym**

	a)	b)	c)	d)
wartość najmniejsza	1	-6	-2	-9
wartość największa	5	-2	0	-5

	a)	b)	c)	d)
wartość najmniejsza	2	2	0	-4
wartość największa	6	4	2	0

	a)	b)	c)	d)	e)	f)
wartość najmniejsza	-1	$4\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{3}$	$-24\sqrt{3}$	$-6\frac{1}{4}$	$10\frac{4}{5}$
wartość największa	2	5	$1\frac{2}{3}$	$-9\sqrt{3}$	$-5\frac{3}{4}$	$11\frac{9}{20}$

- 3.79. a) największa wartość: 108, dla argumentu  $-2$  c) w przedziale  $(-4, -3)$  najmniejsza wartość: 96, największa wartość: 105  
 3.80. a) funkcja przyjmuje wartość największą, dla argumentu 2 b) w przedziale  $(5, 7)$  wartość najmniejsza: 0, wartość największa: 3.  
 3.81.  $f(x) = \frac{3}{4}x^2 - 4\frac{1}{2}x + 8\frac{3}{4}$   
 3.82.  $f(x) = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x - 2$   
 3.83.  $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 - 3x + 1\frac{1}{2}$   
 3.84.  $f(x) = 2x^2 + 4x - 6$   
 3.85.  $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 6x - 18$   
 3.86.  $f(x) = \frac{1}{4}x^2 - \frac{5}{2}x + 4$   
 3.87.  $f(x) = -\frac{3}{4}x^2 - 3x + 1$   
 3.88.  $f(x) = -2x^2 - 4x + 2$   
 3.89.  $f(x) = \frac{1}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{4}{3}$

**Badanie funkcji kwadratowej – zadania optymalizacyjne**

- 3.90. 4 m  
 3.91. o  $10^{00}$ .  
 3.92. a) 44 m b) 11 m/s  
 3.93. 5 m  
 3.94.  $100 = 50 + 50$   
 3.95.  $30 = 15 - (-15)$   
 3.96.  $18 = 9 + 9$   
 3.97. 16 uczniów.  
 3.98. a)  $P(x) = -x^2 + 3x + 40$ ;  $D_p = (0, 8)$  b)  $x = 1,5$  cm;  $P = 42,25$  cm<sup>2</sup>  
 3.99. a)  $P(x) = -8x^2 + 100x$ ;  $D_p = (0, 10)$  b)  $x = 6,25$  cm;  $P = 312,5$  cm<sup>2</sup>  
 3.100. 15 cm  
 3.101. wymiary placu: 21 m × 21 m;  $P = 4,41$  a  
 3.102. 3 m × 6 m;  $P = 18$  m<sup>2</sup>  
 3.103. 17,5 cm × 16,5 cm  
 3.104. 1 m × 0,75 m  
 3.105. 1,5 m × 2 m  
 3.106. a)  $P(x) = 2x^2 - 8x + 16$ ;  $D_p = (0, 4)$  b)  $K, L, M, N$  – środki boków kwadratu  
 3.107. 1700 zł  
 3.108. wysokość czynszu: 1320 zł; miesięczny zysk: 217 800 zł

3.109. a) 55 b) 52

3.110.  $\frac{6}{7}m, \frac{8}{7}m$

**Równania kwadratowe**

3.111. a)  $x = -2$  b)  $x \in \left\{0, 1\frac{3}{4}\right\}$  c) równanie sprzeczne d)  $x = 1\frac{1}{2}$

e)  $x \in \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$  f)  $x \in \{-3, 7\}$

3.112. a)  $x \in \left\{-\frac{5}{9}, \frac{5}{9}\right\}$  b)  $x \in \left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$  c)  $x \in \{-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}\}$  d)  $x \in \{-2, 8\}$

e)  $x \in \{-4, 2\}$  f) równanie sprzeczne

3.113. a)  $x \in \left\{-4, 1\frac{1}{2}\right\}$  b)  $x \in \left\{-1\frac{2}{3}, 4\right\}$  c)  $x = \frac{2}{3}$  d) równanie sprzeczne

e)  $x \in \left\{0, \frac{4}{49}\right\}$  f)  $x = 1\frac{1}{4}$

3.114. a)  $x \in \left\{-2, \frac{1}{3}\right\}$  b)  $x \in \left\{1, 1\frac{1}{2}\right\}$  c) równanie sprzeczne d)  $x \in \left\{-\frac{2}{3}, 0\right\}$

e)  $x \in \left\{-2, \frac{1}{5}\right\}$  f)  $x = -\frac{1}{2}$

3.115. a)  $x \in \{-3, 5\}$  b)  $x \in \left\{-1\frac{2}{5}, 0\right\}$  c)  $x \in \{-3, 1\}$  d)  $x \in \{-11, 9\}$

e)  $x \in \{-5, -1\}$  f)  $x \in \{-2, 1\}$

3.116. a)  $x \in \{1, -5\}$  b)  $x \in \{-1, 0\}$  c)  $x \in \{-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}\}$  d)  $x \in \left\{-\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right\}$

e)  $x \in \left\{-5\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right\}$  f)  $x \in \left\{-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right\}$

3.117. a)  $x \in \{-1, 1\}$  b) równanie sprzeczne c)  $x \in \left\{\frac{1}{2}, \frac{1}{12}\right\}$  d)  $x \in \left\{-3, 1\frac{1}{3}\right\}$

e)  $x \in \left\{\frac{1}{3}, 1\right\}$  f)  $x = 5$

3.118. a)  $x \in \left\{-7, \frac{3}{4}\right\}$  b)  $x \in \left\{-5, \frac{1}{2}\right\}$  c) równanie sprzeczne d)  $x \in \left\{-4, \frac{1}{3}\right\}$

e)  $x \in \{-5, 0\}$  f)  $x = -1$

3.119. a)  $x \in \left\{5, -1\frac{2}{3}\right\}$  b) równanie sprzeczne c)  $x \in \left\{\frac{-2-\sqrt{6}}{2}, \frac{-2+\sqrt{6}}{2}\right\}$

d)  $x \in \left\{\frac{3}{5}, 4\right\}$  e)  $x \in \left\{\frac{1}{3}, 1\right\}$  f)  $x \in \left\{-1\frac{1}{3}, 1\right\}$

3.120. a)  $x \in \left\{\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right\}$  b)  $x \in \left\{-4\frac{1}{2}, 7\right\}$  c)  $x \in \left\{\frac{1}{5}, 1\right\}$  d)  $x \in \left\{-6\frac{1}{2}, 0\right\}$

e)  $x \in \left\{\frac{-3-\sqrt{21}}{2}, \frac{-3+\sqrt{21}}{2}\right\}$  f)  $x \in \left\{-2, 1\frac{1}{2}\right\}$

3.121. a) równanie sprzeczne b)  $x \in \left\{\frac{2}{3}, 1\right\}$  c)  $x \in \left\{2\frac{1}{2}, \frac{3}{10}\right\}$  d)  $x \in \{-12, 0\}$

e)  $x = -\frac{1}{3}$  f) równanie sprzeczne

3.122. a)  $x \in \{0, 1\}$  b)  $x \in \left\{-1, \frac{2}{3}\right\}$  c)  $x \in \{-6-\sqrt{5}, -6+\sqrt{5}\}$  d)  $x = 3$

3.123. a)  $a = -1$  lub  $a = 1$  b)  $a = -3$  lub  $a = 1$

3.124. a)  $x \in \{-3, 2\}$  b)  $x \in \{1, 4\}$  c)  $x \in \{0, 2\}$  d)  $x \in \{-4, -1\}$

**Równania prowadzące do równań kwadratowych**

3.125. a)  $x \in \{-4, 0, 4\}$  b)  $x \in \{-\sqrt{5}, \sqrt{5}\}$  c)  $x \in \{-1, 1\}$  d) równanie sprzeczne

e)  $x \in \left\{-3, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 3\right\}$  f)  $x \in \{-2, 2\}$

3.126. a)  $x \in \{-2, -1, 1, 2\}$  b)  $x \in \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$  c)  $x \in \{-4, -3, 3, 4\}$

d)  $x \in \{-5, 0, 5\}$  e) równanie sprzeczne f)  $x \in \left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$

3.127. a)  $x \in \left\{-\sqrt{3}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \sqrt{3}\right\}$  b)  $x \in \left\{-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$  c)  $x \in \left\{-\frac{\sqrt{5}}{5}, \frac{\sqrt{5}}{5}\right\}$

d)  $x = 0$  e)  $x \in \{-\sqrt{5}, -\sqrt{3}, \sqrt{3}, \sqrt{5}\}$  f)  $x \in \{-2, -1, 1, 2\}$

3.128. a)  $x \in \{-1, 1\}$  b)  $x \in \left\{-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$  c) równanie sprzeczne d)  $x \in \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

e)  $x \in \{-1, 1\}$  f)  $x \in \{-2, 0, 2\}$

3.129. a)  $x \in \{-\sqrt{13}, -2, 2, \sqrt{13}\}$  b)  $x \in \{-1, 1\}$  c)  $x \in \{-3, 1\}$  d) równanie sprzeczne e)  $x \in \{-4, 0, 1, 5\}$  f)  $x \in \{-2, -1\}$

**Nierówności kwadratowe**

3.130. a)  $x \in \mathbf{R}$  b)  $x = 0$  c)  $x \in \left(0, \frac{2}{3}\right)$  d)  $x \in (-\infty, -5) \cup (5, +\infty)$  e) nierówność sprzeczna f)  $x \in (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$

3.131. a)  $x \in (-4, 2)$  b)  $x \in \mathbf{R} - \left\{\frac{1}{3}\right\}$  c)  $x \in (-\infty, 0) \cup \left(\frac{1}{6}, +\infty\right)$  d)  $x \in \mathbf{R}$  e)  $x \in \mathbf{R}$  f)  $x \in (-2, 5)$

- 3.132. a)  $x \in (-\infty, 1) \cup (5, +\infty)$  b)  $x \in \langle -2, 0 \rangle$  c)  $x \in (-\infty, -1) \cup \left( \frac{1}{2}, +\infty \right)$   
 d)  $x \in \mathbf{R}$  e) nierówność sprzeczna f)  $x = \frac{1}{2}$
- 3.133. a)  $x \in \mathbf{R}$  b)  $x \in \langle 0, 5 \rangle$  c)  $x = 3\frac{1}{2}$  d)  $x \in (-2, 1)$  e)  $x \in \mathbf{R}$  f) nierówność sprzeczna
- 3.134. a)  $x \in (-\infty, 1 - \sqrt{3}) \cup (1 + \sqrt{3}, +\infty)$  b)  $x \in \left( -\infty, -1\frac{1}{2} \right) \cup \left( 2\frac{1}{2}, +\infty \right)$  c)  $x = \frac{3}{5}$   
 d) nierówność sprzeczna e)  $x \in \mathbf{R} - \left\{ \frac{2}{3} \right\}$  f)  $x \in \langle -1, 2 \rangle$
- 3.135. a) nierówność sprzeczna b)  $x \in \mathbf{R}$  c)  $x \in (-\infty, -3) \cup (2, +\infty)$  d)  $x = 2,5$   
 e)  $x \in (0, 2)$  f)  $x \in \mathbf{R} - \left\{ \frac{2}{5} \right\}$
- 3.136. a)  $x \in (-\infty, 3) \cup \left( 3\frac{1}{2}, +\infty \right)$  b)  $x \in \left( 0, \frac{1}{4} \right)$  c)  $x \in \left( -\infty, -\frac{1}{2} \right) \cup \left( \frac{1}{8}, +\infty \right)$   
 d)  $x \in \left\langle -3, \frac{9}{19} \right\rangle$  e)  $x = -5$  f) nierówność sprzeczna
- 3.137. a)  $x = 3$  b) nierówność sprzeczna c)  $x \in \mathbf{R}$  d)  $x \in \langle 0, 10 \rangle$  e)  $x \in \langle -2, 3 \rangle$   
 f) nierówność sprzeczna
- 3.138. a)  $x \in (-1, 4)$  b)  $x \in \left( -\infty, \frac{1}{3} \right) \cup (5, +\infty)$  c)  $x \in \left\langle -\frac{2}{3}, 4 \right\rangle$  d)  $x = -3$  e)  $x \in \mathbf{R}$   
 f) nierówność sprzeczna
- 3.139. a)  $x \in (-\infty, 2) \cup (11, +\infty)$  b)  $x \in \left( -3\frac{1}{2}, 1 \right)$  c)  $x \in (-\infty, -29) \cup (1, +\infty)$   
 d)  $x \in \mathbf{R} - \{2\}$
- 3.140. a)  $x \in \langle 1, 4 \rangle$  b)  $x \in (-\infty, -1) \cup (2, +\infty)$  c)  $x \in (-\infty, -4) \cup \langle 0, +\infty \rangle$  d)  $x \in \mathbf{R}$   
 e)  $x \in \langle -4, 1 \rangle$  f)  $x \in \mathbf{R} - \{3\}$
- 3.142.  $a = -8$
- 3.143.  $a = -2\frac{2}{5}$
- 3.144.  $a = -1\frac{4}{5}$
- 3.145.  $A = (-\infty, 1) \cup (5, +\infty)$ ;  $B = (-\infty, -4) \cup (1, +\infty)$ ;  $A \cap B = (-\infty, -4) \cup (5, +\infty)$ ;  
 $A \cup B = \mathbf{R}$ ;  $B - A = (1, 5)$
- 3.146.  $A = \langle 0, 4 \rangle$ ;  $B = \{-2, -1, 0, 1\}$ ;  $A \cup B = \{-2, -1\} \cup \langle 0, 4 \rangle$ ;  $A \cap B = \{0, 1\}$
- 3.147. a)  $D = \mathbf{R}$  b)  $D = \langle 0, 2 \rangle$  c)  $D = (-\infty, -4) \cup (1, +\infty)$  d)  $D = \left\{ \frac{1}{2} \right\}$   
 e)  $D = (-3, 1)$  f)  $D = \mathbf{R} - \left\{ \frac{4}{5} \right\}$

- 3.148. a)  $m \in (-\infty, -1) \cup (5, +\infty)$  b)  $m \in (-\infty, -2) \cup (3, +\infty)$  c)  $m \in (-1, 1) \cup (2, 4)$   
 d)  $m \in \langle -4, -3 \rangle \cup \langle -2, -1 \rangle$
- 3.149. a)  $m \in \langle -4, 4 \rangle$  b)  $m = -6$  c)  $m \in (-3, 5)$  d)  $m \in \left( -\infty, -\frac{2}{3} \right) \cup (2, +\infty)$

### Zadania prowadzące do równań i nierówności kwadratowych

- 3.150. 16 i 12 lub -16 i -12
- 3.151. -12, -10, -8 lub 8, 10, 12
- 3.152. -9, -7, -5 lub 5, 7, 9
- 3.153. 354
- 3.154. 23 lub 32
- 3.155. 141.
- 3.156. 18
- 3.157. 6
- 3.158. 5 klas
- 3.159. 30 m
- 3.160.  $0,54 \text{ m}^2$ ,  $0,96 \text{ m}^2$
- 3.161. 2,5 cm
- 3.162. 0,6 km i 0,8 km
- 3.163.  $p = 30$
- 3.164. 32 cm i 32 cm lub  $41\frac{1}{7}$  cm i  $22\frac{6}{7}$  cm
- 3.165. w I beczce: 120 litrów w cenie 20 zł za liter, w II beczce: 80 litrów w cenie 30 zł za liter
- 3.166. tak, 25 lat
- 3.167. 5 i 1 lub 6 i 2
- 3.168. a)  $P(a) = \frac{5}{4}a^2 + a$ ,  $a \in (0, +\infty)$  b)  $a = 1,2$  c)  $a \in (4, 6)$
- 3.169. 63, 54, 45, 36, 27
- 3.170. sześć
- 3.171. 1 m
- 3.172. 3 cm, 4 cm
- 3.173.  $4\frac{8}{13}$

### Test sprawdzający do rozdziału 3.

Nr zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Odpowiedź	D	A	C	C	B	A	A	D	A	A	B	B

## Zadania powtórzeniowe do rozdziału 3.

13. a)  $x = -10$  b)  $x \in \left\{-\frac{3}{5}, 2\right\}$  c)  $x \in \left\{-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right\}$  d)  $x \in \{-1, 0, 3, 4\}$
14. a)  $x \in \left\langle \frac{1}{2}, 1 \right\rangle$  b)  $x = \frac{3\sqrt{2}}{2}$  c)  $x \in \left(-\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$  d)  $x \in \mathbb{R}$
15. najmniejsza wartość: 3; największa wartość: 21
16. a)  $f(x) = -0,5(x-1)^2 + 4\frac{1}{2}$  b) -2, 4 c)  $x \in \{-2, 2\}$
17. a)  $a = c = -3$  b)  $(8, +\infty)$  c)  $x \in \left(-1, -\frac{1}{3}\right)$
18. a) postać iloczynowa:  $f(x) = \frac{1}{2}(x+3)(x-1)$ ; postać kanoniczna:  $f(x) = \frac{1}{2}(x+1)^2 + 2$   
b)  $f$  rosnąca w przedziale  $(-1, +\infty)$ ;  $f$  malejąca w przedziale  $(-\infty, -1)$  c) 0, 2
19. a)  $x = -4$  b)  $a = -\frac{1}{4}, b = -2, c = -3$  c)  $g(x) = -\frac{1}{4}x^2 - 3\frac{1}{2}x - 7\frac{1}{4}$
20. ojciec ma 64 lata, córka 36 lat.
21. 125.
22. co najmniej 11 osób
23.  $2\sqrt{34}$
24. a)  $Z(x) = 86 \cdot x - K(x)$ , skąd  $Z(x) = -4x^2 + 88x - 84$ , gdzie  $x \in \{1, 2, \dots, 18\}$ ; co najmniej 2 koszulki b) 11 koszulek; dzienny zysk wyniesie wówczas 400 zł
25.  $\frac{50}{49}m, \frac{48}{49}m$

## 4. Geometria płaska – okręgi i koła

## Powtórzenie wiadomości z geometrii z klasy 1.

- 4.1.  $36^\circ, 144^\circ$
- 4.2. a)  $245^\circ$  b)  $220^\circ$
- 4.3.  $|\sphericalangle ACB| = 94^\circ$
- 4.4.  $\beta = 143^\circ$
- 4.5. a)  $35^\circ, 67^\circ, 78^\circ$  b)  $52^\circ, 75^\circ, 53^\circ$
- 4.6.  $51^\circ$
- 4.8. b) *wskazówka*: Poprowadź prostą  $AB$  i oblicz miarę kąta przyległego do kąta  $CBA$ .
- 4.9. a)  $x = 2,4$  b)  $x = 9$  c)  $x = 4,5$  d)  $x = 4,5$  e)  $x = 12$  f)  $x = 10\frac{5}{7}$

- 4.10. a)  $2\frac{2}{3}$  cm b) 8,4 dm c) 7 dm d) 9 cm
- 4.11. a) tak b) tak c) nie d) nie
- 4.12. a)  $a \in (2, 6)$  b)  $a \in (3, +\infty)$  c)  $a \in \left(\frac{1}{3}, 6\right)$
- 4.13.  $c \in \{7, 11\}$
- 4.14. a) 9 b) 9
- 4.15. 6 cm, 9 cm, 12 cm
- 4.16. 7 cm, 14 cm, 21 cm,  $|AB| = 28$  cm
- 4.17.  $28^\circ, 28^\circ, 124^\circ$
- 4.19. a)  $8 + 4\sqrt{3}$  b)  $12 + 6\sqrt{3}$
- 4.20. a)  $2\sqrt{2}$  cm,  $2\sqrt{2}$  cm, 4 cm b)  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  cm,  $\frac{3}{\sqrt{2}}$  cm
- 4.21. b) 18,9 cm
- 4.22. b) 37,6 cm
- 4.23. a) 9 cm, 12 cm, 15 cm b) 7,5 cm
- 4.24. a) rozwartokątny b) 8 cm,  $9\frac{15}{17}$  cm, 16,8 cm
- 4.25. a) 12 cm b)  $\frac{3\sqrt{97}}{2}$  cm c) 7,5 cm
- 4.26. a)  $\sqrt{3}, 2\sqrt{3}$  b)  $0,5\sqrt{2}, \sqrt{2}$
- 4.27. a) 3 cm, 4 cm; *wskazówka*: Zauważ, że trójkąt jest prostokątny. Poprowadź ze środka przeciwprostokątnej odcinki prostopadłe do przyprostokątnych, wyznacz ich długość i skorzystaj z wniosku z twierdzenia Talesa. b) 5 cm,  $2\sqrt{13}$  cm,  $\sqrt{73}$  cm
- 4.28. 15 cm,  $\frac{3\sqrt{89}}{2}$  cm,  $\frac{3\sqrt{89}}{2}$  cm
- 4.29. *wskazówka*: Poprowadź przez punkt  $D$  prostą, równoległą do półprostej  $CE$ .
- 4.30. *wskazówka*: Wykaż, że  $|\sphericalangle ADC| = 90^\circ$ . Następnie uzasadnij, że  $\triangle ADC \cong \triangle ADB$ .
- 4.31. *wskazówka*: Wykaż, że  $\triangle PDC \cong \triangle ADB$ .
- 4.32. 10 cm
- 4.33. o 20%
- 4.34. b)  $\frac{5}{3}$
- 4.35. 60 cm
- 4.36. (2,5 cm, 7,5 cm) oraz (2 cm, 6 cm)
- 4.37. a) 6 cm; 3,6 cm; 3,6 cm b) 7,2 cm

- 4.38. 40 cm  
 4.39. 7,5 cm, 10 cm  
 4.40. b) nie

**Okrąg. Położenie prostej i okręgu**

- 4.41. a) 3 cięciwy, 6 łuków b) 6 cięciw, 12 łuków  
 4.42. 3,5 cm  
 4.43. 7 cm  
 4.44. 30 cm  
 4.45.  $26\pi$  cm  
 4.46. a)  $10\pi$  cm b) 6 cm  
 4.47. a) 17% b) 64% c) 50% d) 12% e) 100% f) 28%  
 4.48. a) prosta  $k$  jest rozłączna z okręgiem  $o$  b) prosta  $k$  jest sieczną okręgu  $o$  c) prosta  $k$  jest sieczną okręgu  $o$  d) prosta  $k$  jest styczna do okręgu  $o$   
 4.50. 34 cm  
 4.51.  $|FC| = 12$  cm  
 4.52. a)  $135^\circ$  b)  $120^\circ$  c)  $80^\circ$  d)  $39^\circ$   
 4.53. 2 cm  
 4.55. 20 cm; **wskazówka:** Skorzystaj dwukrotnie z twierdzenia Talesa.  
 4.56. a)  $a \in \langle 3, +\infty \rangle$ ; jeśli  $a \in \langle 3, 7 \rangle$ , to prosta jest sieczną okręgu; jeśli  $a = 7$ , to prosta jest prostą styczną do okręgu; jeśli  $a \in \langle 7, +\infty \rangle$ , to prosta jest rozłączna z okręgiem  
 b)  $a \in \langle 0, 8 \rangle$ ; jeśli  $a \in \langle 0, 4 \rangle$ , to  $k$  jest rozłączna z okręgiem, jeśli  $a = 4$ , to prosta jest prostą styczną do okręgu, jeśli  $a \in \langle 4, 8 \rangle$ , to prosta jest sieczną okręgu  
 c)  $a \in \langle -6, 0 \rangle$ ; jeśli  $a \in \langle -6, -3 \rangle$ , to prosta jest sieczną okręgu, jeśli  $a = -3$ , to prosta jest styczna do okręgu; jeśli  $a \in \langle -3, 0 \rangle$ , to prosta jest rozłączna z okręgiem  
 d)  $a \in \langle 1, +\infty \rangle$ ; prosta jest rozłączna z okręgiem

**Wzajemne położenie dwóch okręgów**

- 4.57. a) okręgi styczne wewnętrznie b) okręgi styczne zewnętrznie c) okręgi się przecinają d) okręgi styczne wewnętrznie e) okręgi rozłączne wewnętrznie f) okręgi rozłączne zewnętrznie  
 4.58. a) 5 cm, 7 cm b) 3 cm, 9 cm  
 4.59. a) 3 cm, 6 cm b) 7 cm, 10 cm  
 4.60. 6 cm, 9 cm  
 4.61. trójkąt równoboczny o boku  $r$   
 4.62. 12,5 cm  
 4.63. **wskazówka:**  $R - r = 9$  oraz  $15^2 = R^2 - r^2 = (R - r)(R + r) = 9 \cdot (R + r)$ , teraz wystarczy rozwiązać układ równań ( $R - r = 9 \wedge R + r = 25$ )  
 4.64. a)  $k \in \langle 0, +\infty \rangle$ ; jeśli  $k \in \langle 0, 1 \rangle$ , to okręgi rozłączne wewnętrznie; jeśli  $k = 1$ , to okręgi styczne wewnętrznie; jeśli  $k \in \langle 1, 5 \rangle$ , to okręgi się przecinają; jeśli  $k = 5$ , to okręgi styczne zewnętrznie; jeśli  $k \in \langle 5, +\infty \rangle$ , to okręgi rozłączne zewnętrznie

- b)  $k \in \langle 1, +\infty \rangle$ ; jeśli  $k \in \langle 1, 3 \rangle$ , to okręgi rozłączne zewnętrznie; jeśli  $k = 3$ , to okręgi styczne zewnętrznie; jeśli  $k \in \langle 3, +\infty \rangle$ , to okręgi się przecinają c)  $k \in \langle 0, +\infty \rangle$ ; jeśli  $k \in \langle 0, \frac{1}{2} \rangle$ , to okręgi rozłączne zewnętrznie; jeśli  $k = \frac{1}{2}$ , to okręgi styczne zewnętrznie; jeśli  $k \in \langle \frac{1}{2}, 3\frac{1}{2} \rangle$ , to okręgi się przecinają; jeśli  $k = 3\frac{1}{2}$ , to okręgi styczne wewnętrznie; jeśli  $k \in \langle 3\frac{1}{2}, +\infty \rangle$ , to okręgi rozłączne wewnętrznie  
 d)  $k \in \langle -1, 5 \rangle$ ; jeśli  $k \in \langle 1, 3 \rangle$ , to okręgi styczne wewnętrznie; jeśli  $k \in \langle -1, 1 \rangle \cup \langle 3, 5 \rangle$ , to okręgi rozłączne wewnętrznie; jeśli  $k \in \langle 1, 3 \rangle$ , to okręgi się przecinają  
 4.65. a)  $m \in \{8, 14\}$  b)  $m \in \langle 8, 14 \rangle$   
 4.66.  $a \in \langle 4, 4\frac{2}{3} \rangle$

**Koła i kąty**

- 4.67. a)  $\alpha = 107^\circ$  b)  $\alpha = 61^\circ$  c)  $\alpha = 160^\circ$  d)  $\alpha = 76^\circ$  e)  $\alpha = 47^\circ$  f)  $\alpha = 34^\circ$   
 4.68. a)  $\alpha = 65^\circ$  b)  $\alpha = 105^\circ$  c)  $\alpha = 69^\circ$  d)  $\alpha = 77^\circ$   
 4.69. a)  $60^\circ, 65^\circ, 55^\circ$  b)  $35^\circ, 15^\circ, 130^\circ$  c)  $40^\circ, 70^\circ, 70^\circ$   
 4.70. a)  $40^\circ$  b)  $100^\circ$  c)  $55^\circ$   
 4.71. a)  $90^\circ$  b)  $120^\circ$  c)  $225^\circ$  d)  $108^\circ$  e) ok.  $57^\circ$  f) ok.  $286^\circ$   
 4.72. a)  $6\pi$  b)  $12\pi$  c)  $3\pi$  d)  $\frac{14\pi}{3}$  e)  $19,5\pi$   
 4.73. a)  $20^\circ$  b)  $80^\circ$  c)  $120^\circ$  d)  $140^\circ$   
 4.74.  $\frac{2}{3}$   
 4.75.  $\widehat{BC} : \widehat{AC} : \widehat{AB} = 2 : 3 : 7$   
 4.76.  $50^\circ, 60^\circ, 70^\circ$   
 4.80. **wskazówka:** Zauważ, że  $|\angle ABC| = |\angle ADC|$ . Następnie zapisz kąt  $ACD$  jako sumę kątów  $ACB, BCD$  i skorzystaj z twierdzenia o dwóch prostych równoległych przeciętych trzecią prostą.  
 4.81. **wskazówka:** Oblicz  $|\angle ABO|$  i skorzystaj z twierdzenia odwrotnego do twierdzenia o dwóch prostych równoległych przeciętych trzecią prostą.  
**Twierdzenie o stycznej i siecznej**  
 4.82. 3 cm  
 4.83. 12 cm  
 4.84. 7 cm  
 4.85.  $|CP| = 16$  cm

- 4.86.  $|CD| = 10$  cm  
 4.87. a)  $r = 7$  b)  $|PE| = 16\sqrt{3}$   
 4.89. **wskazówka** Niech  $|PA| = 3x$ , oraz  $|PB| = y$ ; wówczas  $|PC| = 5x$ . Wyraż  $y$  w zależności od  $x$ .  
 4.90.  $|AB| = |AC| = 6\sqrt{5}$  cm,  $|BC| = 12$  cm; **wskazówka** Niech  $|CE| = |EB| = x$ ; wówczas  $x \cdot x = 12 \cdot 3$ .  
 4.91. a)  $r = 3$  b)  $|CE| = 4$ ,  $|EB| = 6$ ; **wskazówka** Poprowadź promień  $OE$  i oblicz  $CE$ . Następnie zauważ, że  $\triangle DBC \sim \triangle EOC$ .

### Symetralne boków trójkąta. Okrąg opisany na trójkącie

- 4.92. 3,15 cm  
 4.93. a) 9 cm b)  $(31 + \sqrt{97})$  cm c) 12 cm d)  $\frac{36\sqrt{97}}{97}$  cm  
 4.94. 24 cm  
 4.95. 5 : 4  
 4.96. 168 cm  
 4.97. 4 cm, 4 cm,  $4\sqrt{3}$  cm  
 4.98. a) **wskazówka** Niech środek  $S$  okręgu opisanego na trójkącie  $ABC$  należy do wysokości  $CD$ . Ponieważ przez punkt  $S$  można poprowadzić tylko jedną prostą prostopadłą do boku  $AB$ , więc wysokość  $CD$  zawiera się w symetralnej boku  $AB$ . Zatem symetralna boku  $AB$  przechodzi przez punkt  $C$ . Następnie wykaż, że  $\triangle ADC \cong \triangle BDC$ .  
 b) **wskazówka** Niech  $|AB| = 2a$ ,  $|CD| = 3x$ . Wówczas  $|CS| = |SB| = 2x$ . Zastosuj twierdzenie Pitagorasa kolejno do trójkątów  $DBS$  i  $DBC$ .  
 4.90. a) środek okręgu jest środkiem najdłuższego boku b) na zewnątrz trójkąta c) na zewnątrz trójkąta d) wewnątrz trójkąta  
 4.100.  $2\sqrt{3}$  cm  
 4.101.  $6\sqrt{3}$  cm  
 4.102. a)  $\sqrt{2}$  cm b) 12,5 cm c) 30,5 cm  
 4.103. 4 cm  
 4.104. 84,5 cm  
 4.105. a)  $4\frac{1}{6}$  cm b)  $8\frac{1}{3}$  cm,  $6\frac{2}{3}$  cm, 5 cm  
 4.106.  $8\sqrt{5}$ ,  $4\sqrt{5}$ , 20  
 4.107.  $|AB| : |BC| : |AC| = 2 : \sqrt{3} : 1$  b)  $|AB| : |BC| : |AC| = 1 : \sqrt{2} : 1$   
 4.108. b) 6 cm  
 4.109. 12 cm,  $9\frac{3}{8}$  cm

- 4.110.  $8\frac{1}{3}$  cm  
 4.111. a)  $13\frac{1}{48}$  cm b)  $169\frac{3}{22}$  cm  
 4.112.  $|AB| = 8$   
 4.113. 24 cm, 15 cm, 15 cm; **wskazówka** Najpierw skorzystaj z twierdzenia Pitagorasa do wyznaczenia długości ramienia. Następnie skorzystaj z podobieństwa odpowiednich trójkątów do obliczenia wysokości trójkąta poprowadzonej na podstawę.  
**Dwusieczne kątów trójkąta. Okrąg wpisany w trójkąt**  
 4.114.  $(40^\circ, 40^\circ, 100^\circ)$  lub  $(80^\circ, 80^\circ, 20^\circ)$   
 4.115.  $63^\circ, 9^\circ$   
 4.116. I.  $10^\circ, 40^\circ, 130^\circ$  II.  $50^\circ, 50^\circ, 80^\circ$  III.  $50^\circ, 60^\circ, 70^\circ$  IV.  $30^\circ, 40^\circ, 110^\circ$  V.  $30^\circ, 70^\circ, 80^\circ$  VI.  $10^\circ, 60^\circ, 110^\circ$   
 4.117.  $50^\circ, 50^\circ, 80^\circ$  lub  $80^\circ, 80^\circ, 20^\circ$   
 4.118.  $55^\circ, 65^\circ, 60^\circ$   
 4.119.  $80^\circ, 60^\circ, 40^\circ$   
 4.120. 24 cm  
 4.121. 6 cm, 10 cm  
 4.122. a)  $\frac{5\sqrt{3}}{3}$  cm b) 2,5 cm  
 4.123.  $24\sqrt{3}$  cm  
 4.124. a)  $r = 3\sqrt{2} - 3$  b)  $r = 1$   
 4.125. 1 cm, 2 cm; 1 cm, 3 cm; 2 cm, 3 cm  
 4.126. a) 2 cm b) 3 cm c) 2 cm d)  $(\sqrt{5} - 1)$  cm  
 4.127. a)  $2\sqrt{2} - 2$  b)  $\sqrt{2} + 1$   
 4.129. 2 cm; **wskazówka** Skorzystaj z własności opisanej w poprzednim zadaniu.  
 4.130.  $R = 12,5$  cm,  $r = 3$  cm  
 4.131. a) 1,5 cm b) 2,4 cm  
 4.132. a)  $1\frac{1}{3}$  cm b) 5,25 cm  
 4.133.  $|AB| = 48$  cm,  $|AC| = |BC| = 30$  cm.  
 4.134. 10 cm; **wskazówka** Niech  $O$  oznacza środek okręgu,  $D$  – punkt styczności okręgu z podstawą  $AB$ ,  $E$  – punkt styczności z ramieniem  $BC$ . Zauważ, że trójkąt  $DBC$  jest podobny do trójkąta  $OEC$  w skali 2. Jeśli  $|OC| = x$ , to  $|BC| = 2x$ .  
 4.135.  $2\frac{2}{3}$  cm,  $3\frac{1}{3}$  cm  
 4.136. 9 cm, 3 cm

4.137.  $6\frac{2}{3}$  cm lub 15 cm

4.138. a)  $|AB| = 6$  b)  $|AE| = 4\frac{5}{7}$ ,  $|BE| = 1\frac{2}{7}$

4.139. a) 6 cm, 4 cm b)  $5\frac{5}{11}$  cm,  $4\frac{6}{11}$  cm

4.140. a)  $8\frac{4}{7}$  cm,  $6\frac{3}{7}$  cm b) 9 cm, 6 cm

4.141. a)  $|CD| = 2\sqrt{3}$  b)  $R = 3$  c)  $r = \frac{3\sqrt{3}-3}{2}$

4.142. a)  $\frac{60\sqrt{2}}{7}$  b)  $\frac{20\sqrt{10}}{3}$  *wskazówka*: Zauważ, że trójkąt jest prostokątny.

4.143. a) 4,2 cm, 5,6 cm b)  $2,4\sqrt{2}$  cm

4.144. a)  $|AD| = \frac{48\sqrt{5}}{11}$  b)  $|CE| = 8$

Test sprawdzający do rozdziału 4.

Nr zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Odpowiedź	B	D	C	B	A	D	D	B	D	C	A	B	D	C	C

Zadania powtórzeniowe do rozdziału 4.

16. 6 cm

17. a)  $\alpha = 39^\circ$  b)  $\alpha = 50^\circ$

18.  $\left(\frac{540}{7}\right)^\circ \approx 77^\circ$

19. b)  $|\angle A| = 39^\circ$ ,  $|\angle B| = 25^\circ$ ,  $|\angle C| = 116^\circ$

21. a)  $r = 3$  cm,  $R = 7$  cm b)  $|AB| = 4,5$  cm

22. okręgi istnieją, jeśli  $m \in \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$  a) okręgi są styczne zewnętrznie, jeśli  $m = 3$ ;

promienie okręgów: 5 i 9, okręgi są styczne wewnętrznie, jeśli  $m = 13$ ; promienie okręgów: 25 i 39 b)  $m \in \{3, 13\}$ 

23. 18 cm

25. 1 : 3

26. a)  $|DE| = 3,75$  cm b)  $|CF| = 3\sqrt{5}$  cm

27. a) 12 cm, 8 cm; *wskazówka* Wykaż, że trójkąt ABC jest prostokątny.

b)  $11\frac{3}{7}$  cm,  $8\frac{4}{7}$  cm

28. a) 10 b)  $R = 7\frac{1}{24}$  c)  $r = 3\frac{1}{3}$

29. a) 30 cm, 40 cm, 50 cm b) 10 cm

30. a)  $31\frac{7}{8}$ ,  $36\frac{1}{8}$  b)  $R = 18\frac{1}{16}$  c)  $r = 6\frac{3}{8}$

## 5. Trygonometria

Trygonometria kąta ostrego – powtórzenie wiadomości z klasy 1.

5.1. a) 33,5 cm b) 38,5 cm c) 27 cm d) 45,5 cm e) 23,5 cm f) 27,5 cm

5.2. a) 3 b)  $\frac{\sqrt{10}}{10}$

5.3. a)  $\frac{1}{4}$  b)  $-2\sqrt{3}$  c)  $-30 + 5\sqrt{6}$

5.4. a)  $\sqrt{3}$  cm b)  $\sqrt{2}$  cm c) 1 cm

5.5. a)  $60^\circ$  b)  $45^\circ$  c)  $30^\circ$  d)  $45^\circ$

5.6. a)  $|\angle A| = 45^\circ$ ,  $|\angle B| = 30^\circ$ ,  $|\angle C| = 105^\circ$  b)  $|\angle A| = 60^\circ$ ,  $|\angle B| = 30^\circ$ ,  $|\angle C| = 90^\circ$

5.8. a)  $\cos \alpha = \frac{24}{25}$ ,  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{7}{24}$ ,  $\operatorname{ctg} \alpha = 3\frac{3}{7}$  b)  $\sin \alpha = \frac{11}{61}$ ,  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{11}{60}$ ,  $\operatorname{ctg} \alpha = 5\frac{5}{11}$

c)  $\sin \alpha = \frac{12}{13}$ ,  $\cos \alpha = \frac{5}{13}$ ,  $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{5}{12}$  d)  $\sin \alpha = \frac{3\sqrt{10}}{10}$ ,  $\cos \alpha = \frac{\sqrt{10}}{10}$ ,  $\operatorname{tg} \alpha = 3$

5.9. *wskazówka* Wykaż, że  $\alpha = 60^\circ$ ,  $\beta = 30^\circ$ .

Sinus, cosinus, tangens i cotangens dowolnego kąta płaskiego

5.13. a)  $\sin \alpha = \frac{5}{13}$ ,  $\cos \alpha = \frac{12}{13}$ ,  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{5}{12}$ ,  $\operatorname{ctg} \alpha = 2\frac{2}{5}$

b)  $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$ ,  $\operatorname{tg} \alpha = -\sqrt{3}$ ,  $\operatorname{ctg} \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

c)  $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{6}}{3}$ ,  $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ ,  $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{2}$ ,  $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$

d)  $\sin \alpha = -\frac{8}{17}$ ,  $\cos \alpha = \frac{15}{17}$ ,  $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{8}{15}$ ,  $\operatorname{ctg} \alpha = -1\frac{7}{8}$

e)  $\sin \alpha = -1$ ,  $\cos \alpha = 0$ ,  $\operatorname{tg} \alpha$  – nie istnieje,  $\operatorname{ctg} \alpha = 0$

f)  $\sin \alpha = 0$ ,  $\cos \alpha = -1$ ,  $\operatorname{tg} \alpha = 0$ ,  $\operatorname{ctg} \alpha$  – nie istnieje

5.14. a)  $y = -4$  b)  $x = -3$  c)  $x = 7,5$  d)  $y = -1$

5.15. a)  $P(3\sqrt{2}, 3\sqrt{2})$  b)  $P(-6, 3\sqrt{5})$  c)  $P(-6, -8)$  d)  $P(3, -\sqrt{3})$

- 5.16. a)  $P(-2, -4)$  b)  $P(-1, 3)$  c)  $P(12, -9)$  d)  $P(\sqrt{5}, 2\sqrt{5})$
- 5.17. a)  $\alpha = 90^\circ$  b)  $\alpha = 0^\circ$  lub  $\alpha = 180^\circ$  c)  $\alpha = 90^\circ$  lub  $\alpha = 270^\circ$
- 5.18. a)  $\sin 210^\circ = -\frac{1}{2}$ ,  $\cos 210^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $\operatorname{tg} 210^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ,  $\operatorname{ctg} 210^\circ = \sqrt{3}$
- b)  $\sin 240^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $\cos 240^\circ = -\frac{1}{2}$ ,  $\operatorname{tg} 240^\circ = \sqrt{3}$ ,  $\operatorname{ctg} 240^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$
- c)  $\sin 135^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ,  $\cos 135^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ ,  $\operatorname{tg} 135^\circ = -1$ ,  $\operatorname{ctg} 135^\circ = -1$
- d)  $\sin 330^\circ = -\frac{1}{2}$ ,  $\cos 330^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $\operatorname{tg} 330^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ ,  $\operatorname{ctg} 330^\circ = -\sqrt{3}$
- 5.19. a) III ćw. b) IV ćw. c) I ćw. lub III ćw. d) II ćw. e) IV ćw. f) IV ćw.
- 5.20. a) wartość ujemną b) wartość dodatnią c) wartość ujemną d) wartość dodatnią
- 5.21. a)  $P(-3, -2)$  b)  $P\left(-\frac{3\sqrt{10}}{2}, \frac{\sqrt{10}}{2}\right)$  c)  $P\left(1, -\frac{2}{5}\right)$  d)  $P\left(1\frac{2}{3}, 1\frac{1}{3}\right)$
- 5.22. a) **wskazówka:** Skorzystaj z definicji funkcji trygonometrycznych i ustal, że końcowe ramię kąta  $\alpha$  zawiera się w prostej  $y = x$ .

**Podstawowe tożsamości trygonometryczne**

- 5.25. a)  $\cos \alpha = -0,6$ ,  $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{4}{3}$ ,  $\operatorname{ctg} \alpha = -\frac{3}{4}$  b)  $\sin \alpha = \frac{\sqrt{15}}{4}$ ,  $\operatorname{tg} \alpha = -\sqrt{15}$ ,  $\operatorname{ctg} \alpha = -\frac{\sqrt{15}}{15}$
- c)  $\sin \alpha = \frac{\sqrt{10}}{10}$ ,  $\cos \alpha = -\frac{3\sqrt{10}}{10}$ ,  $\operatorname{ctg} \alpha = -3$
- d)  $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{10}$ ,  $\cos \alpha = -\frac{7\sqrt{2}}{10}$ ,  $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{1}{7}$
- 5.26. a)  $\sin \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$ ,  $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ ,  $\operatorname{ctg} \alpha = 2$  b)  $\sin \alpha = \frac{7}{25}$ ,  $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{7}{24}$ ,  $\operatorname{ctg} \alpha = -3\frac{3}{7}$
- c)  $\left(\cos \alpha = \frac{2}{3}, \operatorname{tg} \alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}, \operatorname{ctg} \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}\right)$  lub  $\left(\cos \alpha = -\frac{2}{3}, \operatorname{tg} \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{2}, \operatorname{ctg} \alpha = -\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)$
- d)  $\sin \alpha = \frac{60}{61}$ ,  $\cos \alpha = -\frac{11}{61}$ ,  $\operatorname{tg} \alpha = -5\frac{5}{11}$
- 5.27. a)  $\cos \alpha = -\frac{12}{13}$ ,  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{5}{12}$ ,  $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{12}{5}$  b)  $\cos \alpha = -\frac{8}{17}$ ,  $\sin \alpha = -\frac{15}{17}$ ,  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{15}{8}$
- c)  $\sin \alpha = -\frac{12}{13}$ ,  $\cos \alpha = \frac{5}{13}$ ,  $\operatorname{ctg} \alpha = -\frac{5}{12}$  d)  $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{3}$ ,  $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{2}$ ,  $\operatorname{ctg} \alpha = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$
- 5.28. a)  $\left(\sin \alpha = \frac{12}{13}, \operatorname{tg} \alpha = \frac{12}{5}, \operatorname{ctg} \alpha = \frac{5}{12}\right)$  lub  $\left(\sin \alpha = -\frac{12}{13}, \operatorname{tg} \alpha = -\frac{12}{5}, \operatorname{ctg} \alpha = -\frac{5}{12}\right)$

- b)  $\left(\cos \alpha = -\frac{11}{61}, \operatorname{tg} \alpha = \frac{60}{11}, \operatorname{ctg} \alpha = \frac{11}{60}\right)$  lub  $\left(\cos \alpha = \frac{11}{61}, \operatorname{tg} \alpha = -\frac{60}{11}, \operatorname{ctg} \alpha = -\frac{11}{60}\right)$
- c)  $\left(\sin \alpha = \frac{\sqrt{10}}{10}, \cos \alpha = \frac{3\sqrt{10}}{10}, \operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{3}\right)$  lub  $\left(\sin \alpha = -\frac{\sqrt{10}}{10}, \cos \alpha = -\frac{3\sqrt{10}}{10}, \operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{3}\right)$
- d)  $\left(\cos \alpha = \frac{45}{53}, \sin \alpha = \frac{28}{53}, \operatorname{tg} \alpha = \frac{28}{45}\right)$  lub  $\left(\cos \alpha = -\frac{45}{53}, \sin \alpha = -\frac{28}{53}, \operatorname{tg} \alpha = -\frac{28}{45}\right)$
- 5.29. a)  $\frac{15}{16}$  b) 6
- 5.30. a)  $-1,09$  b)  $0,5 - \sqrt{3}$  c)  $-11\frac{1}{2}$  d)  $-1\frac{16}{21}$
- 5.31. a)  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$  b)  $\operatorname{ctg} \alpha = -\frac{\sqrt{10}}{5}$  c)  $\operatorname{tg} \alpha = 1$  d)  $\operatorname{ctg} \alpha = -2$
- 5.34. a)  $-\frac{60}{169}$  b)  $\frac{17}{13}$  c)  $\sin \alpha = \frac{12}{13}$ ,  $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$
- 5.35. a)  $-\frac{1}{4}$  b)  $\frac{3}{2}$  c)  $\frac{7}{8}$
- 5.36. a) 14 b) 194 c) 12
- 5.39. a) nie b) tak, do IV ćw. c) tak, do II ćw. d) nie
- 5.40. a) nie b) tak c) tak d) nie
- 5.41. a) nie b) tak c) tak d) tak
- Wybrane wzory redukcyjne**
- 5.42. a)  $-1\frac{3}{4}$  b)  $-2\frac{1}{2}$  c)  $\frac{7-4\sqrt{3}}{12}$  d)  $2\frac{1}{2}$
- 5.43.  $a = -2$ ,  $b = \frac{11+4\sqrt{6}}{12}$ ,  $c = -\frac{1}{4}$ ,  $d = \frac{1}{2}$ ; liczby wymierne to: a, c, d
- 5.44. a)  $x > y$  b)  $x = y$  c)  $x < y$  d)  $x < y$
- 5.45. a) 3 b) 1 c) 0 d) 2 e) 3
- 5.46. a) 1 b) 2 c) -2 d)  $1\frac{1}{4}$  e) -2
- 5.47. a) -1 b) 0 c) 1 d) 2
- 5.48. a)  $\alpha + \beta = 120^\circ$ ;  $\sin(\alpha + \beta) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $\cos(\alpha + \beta) = \frac{-1}{2}$ ,  $\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = -\sqrt{3}$ ,
- $\operatorname{ctg}(\alpha + \beta) = -\frac{\sqrt{3}}{3}$  c) **wskazówka:**  $\gamma = 150^\circ$ , więc  $\alpha + \beta = 30^\circ$  d) **wskazówka:**  $\gamma = 135^\circ$
- 5.49. a)  $210^\circ$  b)  $180^\circ$  c)  $135^\circ$  d)  $330^\circ$  e)  $315^\circ$  f)  $120^\circ$

Test sprawdzający do rozdziału 5.

Nr zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Odpowiedź	A	C	D	D	A	D	B	B	A	B

Zadania powtórzeniowe do rozdziału 5.

11.  $\sin \alpha = \frac{8}{17}$ ,  $\cos \alpha = -\frac{15}{17}$ ,  $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{8}{15}$ ,  $\operatorname{ctg} \alpha = -\frac{7}{8}$
15.  $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ,  $b = \frac{1}{2}$ , zatem  $a > b$
16. a)  $\alpha = 300^\circ$  b)  $\alpha = 150^\circ$
17. a)  $4\frac{1}{4}$  b)  $16\frac{1}{16}$
18. a)  $\frac{\sqrt{14}}{3}$ ; *wskazówka*: Oblicz  $(\sin \alpha - \cos \alpha)^2$  i uzasadnij, że  $\sin \alpha - \cos \alpha > 0$ . b)  $\frac{137}{162}$
19. a) -1 b)  $-\sqrt{3}$
21. *wskazówka* Wykaż, że  $\operatorname{tg} \alpha = 1$ .

## 6. Geometria analityczna

Odcinek w układzie współrzędnych

- 6.1. a) 11 b) 9 c) 17 d)  $6\sqrt{2}$  e)  $\sqrt{10} + \sqrt{2}$  f)  $3\frac{1}{3}$
- 6.2. a) (-1, 2) b) (0, 3) c) (-3, 4) d)  $(\sqrt{2}, 2)$
- 6.3. a) C(9, -3), D(8, 3) b) A(-4, -3), D(-6, 6)
- 6.4. a) D(-6, -2), P(-2, 2) b) C(6, 8), P $(\frac{1}{2}, 3)$
- 6.5. a)  $|AC| = 2\sqrt{17}$ ,  $|DB| = 8\sqrt{5}$  b)  $|DB| = 10$ ,  $|AC| = 10\sqrt{2}$
- 6.6. a)  $|AB| = |DC| = 5$ ,  $|AD| = |BC| = \sqrt{65}$  b)  $|AB| = |DC| = 8$ ,  $|AD| = |BC| = 2\sqrt{17}$
- 6.7. a)  $\sqrt{113}$  b)  $\sqrt{26}$  c)  $\sqrt{53}$
- 6.8. a)  $S_1(-3, -4)$ ,  $S_2(-1, -1)$ ,  $S_3(1, 2)$   
b)  $S_1(-2, -1)$ ,  $S_2(-6, 1)$   
c)  $S_1(0, 5)$ ,  $S_2(1, 7)$ ,  $S_3(2, 9)$ ,  $S_4(3, 11)$ ,  $S_5(4, 13)$
- 6.9. a) S(3, 2) b) S(-2, -1) c) S(1, 3) d) S(1, -4)
- 6.10. D(-1, 0), E(5, 5), F(-1, 4)

- 6.13. *wskazówka*: Wykaż, że wszystkie boki czworokąta mają jednakową długość.
- 6.14. *wskazówka*: Wykaż, że odpowiednie wektory są równe.
- 6.15. *wskazówka*: Wykaż, że odpowiednie wektory są równoległe.

Równanie kierunkowe prostej

- 6.16. a) 2,5 b) 1 c) 18 d) -16
- 6.17. a)  $y = -3x + 21$  b)  $y = 2x + 32$  c)  $y = \frac{1}{3}x - 8\frac{2}{3}$  d)  $y = -\frac{3}{4}x - 18$
- 6.18. a)  $y = -3x + 28$  b)  $y = 10x - 15$  c)  $y = -\frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$  d)  $y = \frac{1}{5}x - \frac{4}{5}$
- 6.19. a)  $45^\circ$  b)  $60^\circ$  c)  $120^\circ$  d)  $135^\circ$  e)  $150^\circ$  f)  $30^\circ$
- 6.20. a) ok.  $50^\circ$  b) ok.  $112^\circ$  c) ok.  $108^\circ$  d) ok.  $79^\circ$
- 6.21. a) k:  $y = -x$  b) k:  $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + 6$  c) k:  $y = -\sqrt{3}x + 4\sqrt{3}$   
d) k:  $y = x - 7$  e) k:  $y = \sqrt{3}x + 11$  f) k:  $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x + 3\sqrt{2}$
- 6.22. a) pr. AD:  $y = -0,5x + 1$ , pr. BE:  $y = -\frac{7}{2}x + 9$ , pr. CF:  $y = \frac{1}{4}x - 1$  b)  $(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3})$
- 6.23. a)  $a = -0,5$  b)  $a = -1$  c)  $a = 2$  d)  $a = 10$
- 6.24. a) k:  $y = -2x + 3$
- 6.25. a)  $y = -5$  b)  $y = \frac{3}{4}x + 9$  c)  $y = -2x + 3$  d)  $y = 0,125x + 18$
- 6.26. a)  $a = -\frac{1}{3}$  b)  $a = 13$  c)  $a = 1\frac{1}{4}$  d)  $a = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$
- 6.27. a) k:  $y = -\frac{1}{2}x + 3$  b) (2, 2)
- 6.28. a)  $y = 1,5x + 7$  b)  $y = x - 3\sqrt{3}$  c)  $y = -0,25x + 9,5$  d)  $y = -1\frac{1}{3}x + 4$
- 6.29. a) pr. AB:  $y = \frac{x}{8} - \frac{3}{2}$ , pr. BC:  $y = -\frac{1}{2}x + 1$ , pr. AC:  $y = 2x + 6$
- 6.30. a)  $y = 4x - 2$  b)  $y = -x - 1$  c)  $y = \frac{1}{2}x - 2$  d)  $y = -\frac{3}{2}x + 5$
- 6.31. *wskazówka*: Wykaż, że środek odcinka AB należy do prostej k oraz  $k \perp AB$ .
- 6.32. *wskazówka*: Wykaż, że punkt C należy do prostej k oraz  $k \perp AB$ .
- 6.33. *wskazówka*: Wyznacz współczynniki kierunkowe prostych AB, BC, DC, AC.
- 6.34. *wskazówka*: Wyznacz współczynniki kierunkowe prostych AB, BC, DC, AC.

- 6.35. **wskazówka** Wystarczy pokazać, że: I. odpowiednie boki są do siebie prostopadłe i mają taką samą długość; albo II. przekątne czworokąta są do siebie prostopadłe, a punkt przecięcia się przekątnych leży w jednakowej odległości od wszystkich wierzchołków czworokąta.


### Równanie ogólne prostej

- 6.36. a) np.  $x - 6 = 0$  b) np.  $x + 4y - 5 = 0$  c) np.  $x + 6y - 7 = 0$   
 6.37. a)  $2x + y - 8 = 0$  b)  $y + 4 = 0$  c)  $x - y + 5 = 0$  d)  $3x + y = 0$   
 6.38. a)  $-5x + 3y + 12 = 0$  b)  $x - \sqrt{5} = 0$  c)  $-2x + 3y - 2 = 0$  d)  $-2x + y + 5 = 0$   
 6.39. a)  $135^\circ$  b)  $60^\circ$  c)  $120^\circ$  d)  $30^\circ$  e)  $90^\circ$  f)  $0^\circ$   
 6.40. a) tak b) nie c) nie d) tak  
 6.41. a)  $m: 3x - 2y + 5 = 0$  b)  $m: 4x + 9y - 45 = 0$  c)  $m: x + 4 = 0$  d)  $m: y - \sqrt{2} = 0$   
 6.42. a) tak b) tak c) nie d) tak  
 6.43. a)  $m: x + 5y - 9 = 0$  b)  $m: x + \sqrt{7} = 0$  c)  $m: y - 8 = 0$  d)  $m: 2x + 3y + 6 = 0$   
 6.44. a)  $A = -\frac{5}{7}, C = 5$  b)  $B = -1\frac{1}{3}, C = -5$  c)  $B = 4, C = 0$  d)  $A = -2, C = -6$   
 6.45. a)  $5x - 2y + 1 = 0$  b)  $y - 2 = 0$  c)  $x + y - 1 = 0$  d)  $x + 3 = 0$


### Równanie okręgu

- 6.46. a)  $x^2 + y^2 = 9$  b)  $x^2 + (y + 2)^2 = 5$  c)  $(x - 4)^2 + y^2 = 6,25$   
 d)  $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 2$  e)  $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = \frac{1}{9}$  f)  $(x + \sqrt{3})^2 + (y + \sqrt{2})^2 = 16$   
 6.47. a)  $S(0, 0), r = 1$  b)  $S(1, 0), r = 1,5$  c)  $S(-1, 2), r = 5$  d)  $S(-3, -1), r = 9$   
 6.48. a)  $S(1, 2), r = 3$  b)  $S(-3, -5), r = 1$  c)  $S(4, 0), r = 3$   
 d)  $S(0, \sqrt{3}), r = 3$  e)  $S(1, 3), r = 1$  f)  $S(0, -2), r = 3$   
 6.49. a)  $S\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right), r = 2$  b)  $S(0, \sqrt{2}), r = 2\sqrt{2}$   
 c)  $S\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right), r = 1$  d)  $S(1,5; -0,5), r = 2$   
 6.50. Nie; tylko punkt  $(3, -1)$  spełnia to równanie.  
 6.51. a) tylko punkty  $A, B$  b) tylko punkty  $A, C$   
 6.52. a)  $x^2 + y^2 = 25$  b)  $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$   
 c)  $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 100$  d)  $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 72$


6.53.




b)



c)



d)



- 6.54. a)  $(x + 3)^2 + (y - 4)^2 = 100$  b)  $(x - 3)^2 + y^2 = 25$   
 c)  $x^2 + (y - 4)^2 = 25$  d)  $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 100$   
 6.55. a)  $(x - 3)^2 + (y + 3)^2 = 25$  b)  $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 5$   
 c)  $(x - 4)^2 + (y - 1)^2 = 100$  d)  $(x + 2)^2 + (y - 4)^2 = 169$   
 6.56.  $S\left(\frac{a}{2}, -b\right), r = |a - b|$

### Wyznaczanie w układzie współrzędnych punktów wspólnych prostych, okręgów i parabol

- 6.57. a)  $(2, 1), (5, 4)$  b)  $(2, 4), (-1, -2)$  c)  $(-4, 3)$  d)  $(2, 3), (4, 8)$   
 6.58. a)  $(3, 1)$  b)  $(3, 3), (7, -1)$  c)  $(-7, 3), (-4, -2)$  d) układ sprzeczny  
 6.59. a)  $(-5, 2), (-4, -1)$  b)  $(1, 1), (4, 0)$  c)  $(2, -1), \left(3\frac{3}{5}, 2\frac{1}{5}\right)$  d)  $(-6, -2)$

- 6.60. a)  $(3, 0)$ ,  $\left(-2\frac{2}{5}, -1\frac{4}{5}\right)$ ; prosta jest sieczną okręgu  
 b)  $(-5, 1)$ ; prosta jest styczna do okręgu  
 c)  $(-4, -4)$ ,  $(-6, -2)$ ; prosta jest sieczną okręgu  
 d) prosta jest rozłączna z okręgiem
- 6.61. a)  $(-2, 2)$ ,  $(1, -1)$  b) nie istnieją punkty wspólne c)  $(-3, 2)$ ,  $\left(2, 4\frac{1}{2}\right)$  d)  $(4, -3)$
- 6.62. a) o:  $(x+3)^2 + y^2 = 10$ , k:  $x - 3y = -13$ ,  $(-4, 3)$   
 b) o:  $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 13$ , k:  $y = x - 1$ ,  $\left(\frac{4-\sqrt{22}}{2}, \frac{2-\sqrt{22}}{2}\right)$ ,  $\left(\frac{4+\sqrt{22}}{2}, \frac{2+\sqrt{22}}{2}\right)$   
 c) p:  $y = 2x^2 - 16x + 29$ , k:  $x + y - 2 = 0$ ,  $(3, -1)$ ,  $\left(4\frac{1}{2}, -2\frac{1}{2}\right)$   
 d) p:  $y = -\frac{1}{2}x^2 - 4x - 5$ , k:  $2x + y + 3 = 0$ ,  $(-2, 1)$

### Zastosowanie układów równań do rozwiązywania zadań z geometrii analitycznej

- 6.63.  $C(-2, 1)$ ; **wskazówka**: Punkt C jest punktem wspólnym prostej k i symetralnej odcinka AB.
- 6.64. a)  $y = 4 - x$ ,  $y = 2x - 5$  b)  $(3, 1)$  c)  $\sqrt{10}$
- 6.65. b)  $(-5, 0)$ ,  $(3, -4)$ ,  $(1, 2)$
- 6.66.  $\left(-\frac{3}{5}, \frac{7}{5}\right)$
- 6.67. a)  $A(4, -4)$ ,  $B(1, 5)$  b)  $|AB| = 3\sqrt{10}$
- 6.68.  $A(-4, -3)$ ,  $B(2, 3)$ , o:  $(x+1)^2 + y^2 = 8$
- 6.69. a)  $D(-2, 1)$  b)  $|CD| = 3\sqrt{5}$
- 6.70. a)  $y = 3$ ,  $y = 2x + 1$  b)  $(1, 3)$
- 6.71. a) **wskazówka**: Wykaż, że okrąg i prosta mają tylko jeden punkt wspólny.  
 b) **wskazówka**: Zauważ, że szukane punkty prostej należą również do okręgu o promieniu 5, współśrodkowego z okręgiem o.
- 6.72. a)  $A(-2, 1)$ ,  $B(3, 6)$  b)  $C(-3, 6)$ ,  $D(1, -2)$
- 6.73. b) k:  $y = \sqrt{3}x + 6$  c)  $B\left(-\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}\right)$  d)  $C\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}\right)$
- 6.74.  $(4, 0)$ ,  $\left(\frac{12+4\sqrt{3}}{3}, 1\frac{1}{3}\right)$ ,  $\left(\frac{12-4\sqrt{3}}{3}, 1\frac{1}{3}\right)$

### Test sprawdzający do rozdziału 6.

Nr zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Odpowiedź	B	B	C	A	D	B	A	D	B	C

Nr zadania	11	12	13	14	15
Odpowiedź	A	C	D	A	B

### Zadania powtórzeniowe do rozdziału 6.

16.  $C(4, -3)$
20. a)  $2x - 3y + 40 = 0$  b)  $5x + y + 4 = 0$
21. a)  $y = \frac{1}{\sqrt{3}}x - 2$  b)  $y = -\sqrt{3}x - \sqrt{2}$  c)  $y = -x + 8$
22. a)  $2x + y - 4 = 0$  b)  $x + 3 = 0$
23.  $y = -3x + 9$
24. a)  $a \in \{-4, 4\}$ , jeśli  $a = -4$ , to k:  $y = 2x + 2$ , m:  $y = 2x - 3$ ;  
 jeśli  $a = 4$ , to k:  $y = -2x + 2$ , m:  $y = -2x + 3$   
 b)  $a = 0$ ; wówczas k:  $y = 2$ , m:  $2x - 3 = 0$ ; Nie istnieje postać kierunkowa prostej m.
25.  $\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{5}{2}\right)^2 = 9$ ;  $s\left(\frac{-3}{2}, \frac{5}{2}\right)$ ,  $r = 3$
26. **wskazówka**: I sposób: Zapisz równanie okręgu o danym środku i promieniu. Następnie sprawdź, że punkty A, B, C należą do tego okręgu. II sposób: Wyznacz punkt wspólny symetralnych dwóch dowolnych boków; następnie oblicz promień okręgu.
27.  $C(1, 5)$
28.  $A(-6, 1)$ ,  $B(-1, 2)$ ; **wskazówka**: Punkty A i B należą do okręgu o środku w punkcie C i promieniu  $\sqrt{13}$ .
29.  $C(0, 2)$  lub  $C(0, 4)$
30. a)  $A(-6, 9)$ ,  $B(-1, 4)$
31. a)  $(4, -1)$  b)  $(1, -2)$ ,  $(5, 6)$

## 7. Geometria płaska – rozwiązywanie trójkątów, pole trójkąta, pole koła

### Twierdzenie sinusów

- 7.1. a)  $\sqrt{3}$  b) 4 c) 2 d) 13
- 7.2. a)  $|AB| = 8\sqrt{3}$  cm b)  $|AC| \approx 10,6$  cm
- 7.3. a)  $|AC| \approx 5,9$  cm b)  $|AB| \approx 5,3$  cm
- 7.4. a)  $b = 32$  cm b)  $c \approx 13,9$  cm

- 7.5. a) 6 cm b) 9 cm c)  $10\frac{5}{6}$  cm d) 8,5 cm  
 7.6. a)  $R = 5$  cm b)  $a = 24$  cm c)  $c \approx 5$  cm d)  $b \approx 14,14$  cm  
 7.7. ( $|\angle B| = 60^\circ$ ,  $|\angle C| = 90^\circ$ ) lub ( $|\angle B| = 120^\circ$ ,  $|\angle C| = 30^\circ$ )  
 7.8. ( $|\angle B| = 105^\circ$ ,  $|\angle C| = 45^\circ$ ) lub ( $|\angle B| = 15^\circ$ ,  $|\angle C| = 135^\circ$ )  
 7.9. a)  $120^\circ, 30^\circ, 30^\circ$  b)  $6 + 4\sqrt{3}$   
 7.10. a)  $120^\circ$ ; **wskazówka:** I sposób: Niech  $BD$  – wysokość w trójkącie  $ABC$ ,  $\gamma = |\angle BCA|$ . Wyraź długości boków  $BD$  i  $DC$  w zależności od  $BC$  i  $\gamma$ . Zastosuj twierdzenie Pitagorasa do trójkąta  $DAB$  i oblicz  $\cos \gamma$ . II sposób: Można wykorzystać twierdzenie cosinusów. b)  $R = \sqrt{6}$

**Twierdzenie cosinusów**

- 7.12. a)  $3\sqrt{13}$  b)  $2\sqrt{5}$   
 7.13.  $\cos \alpha = \frac{53}{80}$ ,  $\cos \beta = \frac{25}{32}$ ,  $\cos \gamma = -\frac{1}{20}$ ; trójkąt rozwartokątny  
 7.14. a) trójkąt ostrokątny;  $\alpha \approx 86^\circ$  b) trójkąt rozwartokątny;  $\gamma \approx 110^\circ$  c) trójkąt prostokątny;  $\beta = 90^\circ$   
 7.15.  $60^\circ$   
 7.16.  $120^\circ$   
 7.17. a)  $\sqrt{10}$  cm,  $\sqrt{58}$  cm b)  $\sqrt{34 + 15\sqrt{3}}$  cm,  $\sqrt{34 - 15\sqrt{3}}$  cm  
 7.18.  $|AC| = 3$  cm lub  $|AC| = 5$  cm  
 7.19. a)  $|BC| = 4$  cm b)  $|BC| = 2\sqrt{6}$  cm  
 7.20. Jeśli  $|\angle ACB| < 90^\circ$ , to obwód jest równy 16 cm. Jeśli  $|\angle ACB| > 90^\circ$ , to obwód jest równy  $2(5 + \sqrt{17})$  cm.  
 7.21. 9  
 7.22.  $6,5\sqrt{2}$  cm  
 7.23.  $|CD| = 7$  cm,  $|BE| = 2\sqrt{19}$  cm  
 7.24. a)  $|CD| = \frac{3\sqrt{46}}{2}$  cm b)  $R = \frac{12\sqrt{322}}{35}$  cm  
 7.25.  $|CD| = 7$  cm; **wskazówka:** Niech punkt  $D$  będzie środkiem odcinka  $CE$ . Oblicz długość przekątnej  $CE$  w równoległoboku  $AEBE$ .

**Zastosowanie twierdzenia sinusów i twierdzenia cosinusów do rozwiązywania zadań**

- 7.26. ( $|AC| = |BC| \approx 16,17$ ,  $|\angle A| = |\angle B| \approx 72^\circ$ ,  $|\angle C| \approx 36^\circ$ ) lub ( $|AC| = |BC| \approx 5,25$ ,  $|\angle A| = |\angle B| \approx 18^\circ$ ,  $|\angle C| \approx 144^\circ$ )  
 7.27. a)  $|AB| \approx 96$ ,  $|\angle B| \approx 48^\circ$ ,  $|\angle C| \approx 83^\circ$   
 b) ( $|AB| \approx 91,34$ ,  $|\angle B| \approx 51^\circ$ ,  $|\angle C| \approx 80^\circ$ ) lub ( $|AB| \approx 3,24$ ,  $|\angle B| \approx 129^\circ$ ,  $|\angle C| \approx 2^\circ$ )  
 7.28. a)  $|AB| \approx 89\sqrt{3}$ ,  $|\angle A| = 90^\circ$ ,  $|\angle C| = 60^\circ$

- b) ( $|AB| \approx 177,57$ ,  $|\angle A| \approx 64^\circ$ ,  $|\angle C| \approx 86^\circ$ ) lub ( $|AB| \approx 99,54$ ,  $|\angle A| \approx 116^\circ$ ,  $|\angle C| \approx 34^\circ$ )  
 7.30. a) ( $\alpha = 60^\circ$ ,  $\gamma = 75^\circ$ ,  $c = \sqrt{3} + 1$ ) lub ( $\alpha = 120^\circ$ ,  $\gamma = 15^\circ$ ,  $c = \sqrt{3} - 1$ ) b)  $\beta = 30^\circ$ ,  $\gamma = 105^\circ$ ,  $c = \sqrt{3} + 1$  c)  $\gamma = 30^\circ$ ,  $\beta = 90^\circ$ ,  $a = 5\sqrt{3}$ ,  $b = 10$  d)  $\alpha = 120^\circ$ ,  $\gamma = 15^\circ$ ,  $b = 3\sqrt{2}$ ,  $c = \frac{3\sqrt{6} - 3\sqrt{2}}{2}$   
 7.31. 41; **wskazówka:** Wykaż, że  $|\angle ADC| = 60^\circ$ . Następnie zastosuj twierdzenie cosinusów do wyznaczenia długości boków trójkąta  $ABC$  i trójkąta  $ACD$ .  
 7.32.  $|AD| = |EB| = \sqrt{3} - 1$ ,  $|DE| = 4 - 2\sqrt{3}$ ; **wskazówka:** Oznacz  $|AD| = x$ ,  $|DC| = y$ . Skorzystaj z twierdzenia sinusów w trójkącie  $ADC$  i wykaż, że  $y = x\sqrt{2}$ . Następnie skorzystaj z twierdzenia cosinusów do kąta  $DAC$ .  
 7.34. **wskazówka:** Oznacz:  $a = 4x$ ,  $b = 5x$ ,  $c = 6x$ ,  $x > 0$ . Następnie oblicz  $\cos \beta$  i  $\cos \gamma$ , korzystając z twierdzenia cosinusów.  
 7.35. **wskazówka:** Zastosuj twierdzenie cosinusów do trójkąta  $ADC$  i do trójkąta  $DBC$ .

**Pole figury płaskiej**

- 7.36. a) 20,5 b) 15,5 c) 32 d) 20  
 7.37. a)  $s - w + 4t$  b)  $\frac{3}{2}w + \frac{1}{2}s + t$  c)  $2s + \frac{1}{2}w$  d)  $\frac{5}{6}w$

**Pole trójkąta, cz. 1**

- 7.38. 3 cm  
 7.39. a) 12 cm b)  $48\sqrt{3}$  cm<sup>2</sup>  
 7.40.  $14\frac{14}{29}$  cm  
 7.41. 156 cm<sup>2</sup>  
 7.42. 6,5 cm, 42 cm, 42,5 cm  
 7.43. 120 cm<sup>2</sup>  
 7.44. 294 cm<sup>2</sup>  
 7.45.  $14\frac{2}{17}$  cm  
 7.46. a)  $|AB| = 20$ ,  $|AC| = |BC| = 5\sqrt{5}$ ; **wskazówka:** Poprowadź wysokość  $CD$  i oznacz  $|AB| = 4x$ ; wówczas  $|BC| = \sqrt{5}x$  oraz  $|CD| = x$ . b)  $h_a = 4\sqrt{5}$   
 7.47. a) **wskazówka:** Wykaż, że  $a : b : c = 3 : 4 : 5$ , korzystając ze wzoru na pole trójkąta. b) 2,4  
 7.48.  $7\sqrt{3}$  cm<sup>2</sup>  
 7.49. 84 cm<sup>2</sup>  
 7.50. a) 35 cm<sup>2</sup> b)  $35\sqrt{3}$  cm<sup>2</sup> c)  $35\sqrt{2}$  cm<sup>2</sup>  
 7.51.  $30^\circ$  lub  $150^\circ$   
 7.52. a)  $150^\circ$  b)  $6\sqrt{10 + 3\sqrt{3}}$  cm  
 7.53. a) 7 cm b)  $\frac{20\sqrt{3}}{7}$  cm

7.54. a) 5 cm, 5 cm,  $3\sqrt{10}$  cm b)  $\frac{1}{\sqrt{10}}$

7.55. 8 cm, 10 cm

7.60. a)  $30 \text{ cm}^2$  b)  $40 \text{ cm}^2$

7.61.  $16 \text{ cm}^2$

7.62. a) 5 : 2 oraz 5 : 3 b) 18

7.64.  $34\frac{2}{3}$

7.65.  $|AB| = 8 \text{ cm}$

7.67.  $84\sqrt{2} \text{ cm}^2$

7.68. a)  $\frac{24\sqrt{2}}{7}$  b)  $\frac{20\sqrt{3}}{9}$

7.69. a)  $3 - \sqrt{3}$ ; *wskazówka*: Oznacz  $|CD| = x$ . Zapisz sumę pól trójkątów  $ADC$  i  $CDB$  na dwa sposoby. b)  $P_{ADC} = 3\sqrt{3} - 3$ ,  $P_{CDB} = 9 - 3\sqrt{3}$

7.70. a)  $3\sqrt{3}$  b) *wskazówka*: I sposób: Zauważ, że  $P_{ADC} = P_{CDB}$ . II sposób: Utwórz równoległobok  $AEB C$  i skorzystaj z twierdzenia cosinusów.

**Pole trójkąta, cz. 2**

7.71.  $r = 9 \text{ cm}$

7.72. 42 cm

7.73. a)  $4,5(1 + \sqrt{3}) \text{ cm}^2$  b)  $r = \frac{3(1 + \sqrt{3})}{3 + \sqrt{2} + \sqrt{3}} \text{ cm} \approx 1,3 \text{ cm}$

7.74. a) 32 cm b)  $r = 3 \text{ cm}$

7.75. a) 14 cm, 25 cm, 25 cm b) kąt  $\alpha$  jest ostry (dlaczego?);  $\sin \alpha = \frac{336}{625}$ , więc

$$\frac{1}{2} < \sin \alpha < \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ stąd } 30^\circ < \alpha < 45^\circ$$

7.76. 11,2 cm

7.77. a) 17 cm b)  $R = 9\frac{19}{30}$  cm

7.78. a)  $192 \text{ cm}^2$ ; *wskazówka*: Oznacz długość ramienia przez  $5x$ ; wówczas podstawa ma długość  $2 \cdot 4x$ , stąd  $8x = 32$ . b)  $R = 16\frac{2}{3}$  cm

7.79. a) 24 cm b)  $r = 4 \text{ cm}$

7.80. a) 34 cm b)  $r = 7 \text{ cm}$

7.81. a)  $\frac{84}{85}$  b) 28 cm; *wskazówka*: Oblicz cosinus kąta między ramionami i skorzystaj

z twierdzenia cosinusów. c)  $R = 14\frac{1}{6}$  cm

7.82. a)  $60^\circ$  b) 7 c)  $R = \frac{7\sqrt{3}}{3}$  d)  $r = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

7.83.  $25(2 + \sqrt{3})$ ; *wskazówka*: Oblicz najpierw długość najdłuższego boku, korzystając z twierdzenia sinusów. Następnie skorzystaj z twierdzenia cosinusów do wyznaczenia kwadratu długości ramienia.

7.84.  $\frac{75\sqrt{3}}{4}$

7.85. a) 84  $\text{cm}^2$  b)  $r = 3,5 \text{ cm}$  c)  $R = 10\frac{5}{8}$  cm

7.86. a) 33,6 cm; 15 cm;  $21\frac{7}{13}$  cm b)  $\frac{5}{13}$  c)  $R = 32,5 \text{ cm}$

7.87. a)  $32\sqrt{2} \text{ cm}^2$  b)  $r = 2\sqrt{2}$  cm; *wskazówka*: Skorzystaj z twierdzenia o odcinkach stycznych.

7.88. a)  $P_1 = 14,4 \text{ cm}^2$ ,  $P_2 = 9,6 \text{ cm}^2$  *wskazówka*: Oblicz długości odcinków, na jakie prosta podzieliła przeciwprostokątną. b)  $r_1 : r_2 = 3 : 2$

**Pola trójkątów podobnych**

7.89.  $6 \text{ cm}^2$

7.90. 11 cm

7.91. a) 25 : 64 b) 1 : 4 c) 4 : 25 d) 1 : 9

7.92. a) 4 : 25 : 36 b) 4 : 21 : 11

7.93. 1 : 3 : 5

7.94.  $|A_1B_1| = 14 \text{ cm}$ ,  $|AB| = 21 \text{ cm}$

7.95. 1 : 3 : 4

7.96. 24; *wskazówka*: Poprowadź wysokość  $CD$  i oblicz pola trójkątów  $ADC$  oraz  $DBC$ .

7.97. a)  $12 \text{ cm}^2$  b)  $288 \text{ cm}^2$

7.98.  $11\frac{23}{27} \text{ cm}^2$

7.99.  $21\frac{1}{3} \text{ cm}^2$

7.100.  $|DB| = 5 \text{ cm}$ ,  $|BE| = 4 \text{ cm}$ ,  $|DE| = 3 \text{ cm}$

7.101. 36%

7.102. 5 : 4

7.103.  $300 \text{ cm}^2$

7.104.  $6 \text{ cm}^2$

7.105. a) 25 cm b)  $P_{AEC} = 250 \text{ cm}^2$ ,  $P_{EDB} = 40 \text{ cm}^2$  c)  $30^\circ$

**Pole koła, pole wycinka koła**

7.106. a)  $\frac{5}{8}$  b)  $\frac{3}{4}$

7.108. a)  $4,5\pi \text{ cm}^2$  b)  $60\pi \text{ cm}^2$  c)  $3,75\pi \text{ cm}^2$

- 7.109. a) 8 cm b) 5 cm c) 30 cm  
 7.110. a)  $\pi - 2$  b)  $3\pi - 2,25\sqrt{3}$  c)  $15\pi - 9$   
 7.111. 36 cm  
 7.112.  $\frac{2-\sqrt{3}}{2}$   
 7.113.  $9\pi \text{ cm}^2$   
 7.114. a)  $(3+2\sqrt{2})\pi \text{ cm}^2$  b)  $(7+4\sqrt{3})\pi \text{ cm}^2$   
 7.115.  $6\pi \text{ cm}^2$ ; **wskazówka:** Wykaż, że  $\frac{\alpha}{2} = 30^\circ$ .  
 7.116.  $2(3\sqrt{3}+2\pi) \text{ cm}^2$   
 7.117.  $\frac{(4-3\sqrt{3})r^2}{6}$ ; **wskazówka:** Niech  $O_1$  i  $O_2$  będą środkami kół;  $A$  – jednym z punktów przecięcia się okręgów. Zauważ, że trójkąt  $O_1O_2A$  jest równoboczny.  
 7.118.  $\frac{5\pi-3\sqrt{3}}{\pi+3\sqrt{3}}$   
 7.119. 45

### Zastosowanie pojęcia pola w dowodzeniu twierdzeń

- 7.120. **wskazówka:** Przedstaw pole trójkąta  $ABC$  na dwa sposoby:  $P = \frac{|AB| \cdot |AC|}{2}$  oraz  $P = P_{ABM} + P_{CAM}$ .  
 7.121. **wskazówka:** Rozpatrz dwa przypadki: krótszy bok zawiera się w boku długości  $b$  albo w boku długości  $a$ . Przedstaw pole trójkąta jako sumę pól odpowiednich trójkątów.  $\frac{ab}{2a+b} < \frac{ab}{a+2b}$ , więc  $\frac{ab}{2a+b} \cdot \frac{2ab}{2a+b} < \frac{ab}{a+2b} \cdot \frac{2ab}{a+2b}$   
 7.122. **wskazówka:** Przedstaw pole trójkąta  $ABC$  jako sumę pól trójkątów  $AMC$  i  $MBC$ .  
 7.123. **wskazówka:** Wykorzystaj zależności:  $a = \frac{2P}{h_a}$ ,  $b = \frac{2P}{h_b}$ ,  $c = \frac{2P}{h_c}$   
 7.124. **wskazówka:** Wykorzystaj własność: środkowa w trójkącie dzieli trójkąt na dwa trójkąty o równych polach. Następnie skorzystaj ze wzoru na pole trójkąta: w punkcie a) do trójkątów  $ABC$  i  $ADC$ , w punkcie b) do trójkątów  $ADC$  i  $DBC$ .  
 7.126. **wskazówka:** Przedstaw iloraz pól trójkątów  $ADC$  i  $DBC$  na dwa sposoby.

### Test sprawdzający do rozdziału 7.

Nr zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Odpowiedź	B	C	C	A	B	D	C	B	C	D	C	B	D	A	A

### Zadania powtórzeniowe do rozdziału 7.

16.  $\alpha = 45^\circ$ ,  $\beta = 120^\circ$ ,  $\gamma = 15^\circ$   
 17. a)  $(\alpha = 60^\circ, \gamma = 75^\circ, c = \sqrt{3}+1)$  lub  $(\alpha = 120^\circ, \gamma = 15^\circ, c = \sqrt{3}-1)$  b)  $\beta = 30^\circ$ ,  $\gamma = 105^\circ$ ,  $c = \sqrt{3}+1$  c)  $\gamma = 30^\circ$ ,  $\beta = 90^\circ$ ,  $a = 5\sqrt{3}$ ,  $b = 10$  d)  $\alpha = 120^\circ$ ,  $\gamma = 15^\circ$ ,  $b = 3\sqrt{2}$ ,  $c = \frac{3\sqrt{6}-3\sqrt{2}}{2}$   
 18. 10, 10,  $10\sqrt{2-\sqrt{2}}$   
 19. a)  $30^\circ, 30^\circ$  b) 8 cm c)  $8\sqrt{7}$  cm  
 20. 12 cm  
 21.  $r = 6$  cm  
 22. a)  $126 \text{ cm}^2$  b)  $\frac{63}{65}$  c)  $r = 4\frac{2}{3}$  cm d)  $R = 10\frac{5}{6}$  cm  
 23. a) 7 b)  $h = \frac{20\sqrt{3}}{7}$  c)  $d = \frac{40\sqrt{3}}{13}$  d)  $s = \frac{\sqrt{129}}{2}$   
 24. a) 17 cm b)  $r = 6$  cm  
 25. a)  $c = 9$  cm b)  $\sin\alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}$ ,  $\sin\beta = \frac{8\sqrt{5}}{21}$ ,  $\sin\gamma = \frac{3\sqrt{5}}{7}$   
 28.  $10\sqrt{5-2\sqrt{3}}$   
 29.  $12\sqrt{3} \text{ cm}^2$   
 30.  $60 \text{ cm}^2$   
 31.  $\frac{25}{64}$   
 32. 4 cm; **wskazówka:** Wykaż, korzystając z własności kątów wpisanych w koło, że trójkąt  $EBD$  jest podobny do trójkąta  $ACE$ . Skala tego podobieństwa jest równa 3, więc  $|EB| = 3 \cdot |CE|$ .  
 33. a)  $r = 8$  cm b)  $225^\circ$   
 34. a)  $|DB| = 4,5$  cm b)  $\frac{9}{16}(4-3\sqrt{3}) \text{ cm}^2$

## 8. Wielomiany

### Wielomiany jednej zmiennej rzeczywistej

- 8.1. Wielomiany są w przykładach: a, b, e, g, h, i.  
 8.2. a) 8 b) 17 c) 48 d) 21  
 8.3. a) 3 b) 6 c) 5 d) 3  
 8.4. a)  $F(x) = 10 - x^2 + 8x^4$ ; st.  $F(x) = 4$ ;  $a_0 = 10$ ,  $a_1 = 0$ ,  $a_2 = -1$ ,  $a_3 = 0$ ,  $a_4 = 8$   
 d)  $W(x) = x^2$ , st.  $W(x) = 2$ ;  $a_0 = 0$ ,  $a_1 = 0$ ,  $a_2 = 1$

- 8.5. a)  $F(x) = -5x^4 + 5x^2 - 4x - 3$ ; st.  $F(x) = 4$ ;  $a_4 = -5$ ,  $a_3 = 0$ ,  $a_2 = 5$ ,  $a_1 = -4$ ,  $a_0 = -3$   
 b)  $G(x) = 8$ ; st.  $G(x) = 0$ ;  $a_0 = 8$
- 8.7. a)  $W(-3) = 56$ ,  $W(-1) = -2$ ,  $W(4) = -7$ ,  $W(5) = -32$   
 b)  $W(\sqrt{2} + 1) = 3\sqrt{2} + 5$ ,  $W(\sqrt{3} - \sqrt{2}) = 2\sqrt{6} + 9\sqrt{3} - 11\sqrt{2} - 4$
- 8.8. a) np.  $W(x) = 3x^5 + x^2 + 8$  b) np.  $W(x) = x^4 + \sqrt{2}x^3$
- 8.9. a) 0 b) -1 c) 1 d) -32
- 8.10.  $a = 2$
- 8.11.  $a = 4$ ,  $b = 1$
- 8.12.  $a = -3$ ,  $b = -5$
- 8.13.  $b = 4$
- 8.14.  $a = 0$
- 8.15.  $a = 7$ ,  $b = -3$
- 8.16.  $a = -2$  lub  $a = 1\frac{1}{2}$
- 8.17.  $(a = 4 \text{ i } b = 12)$  lub  $(a = -3 \text{ i } b = 12)$

**Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów**

- 8.18. a)  $-x^5 + 2x^3 + x^2 - 2$  b)  $12x^5 + x^4 - 4x^3 - x + 1$  c)  $-4x^2 + 2x + 3$  d)  $-2x^3$
- 8.19. a)  $-x^6 + 6$  b)  $8x^3 + 0,1x$  c)  $-2x^6 + \sqrt{2}x^5 + 2\sqrt{2}x^3 + 4x + 1$   
 d)  $(\sqrt{2} - 1)x^4 + (1 - 3\sqrt{3})x^3 + (4 - \sqrt{3})x^2 + 1 + \sqrt{2}$
- 8.20. a)  $3x^6 + x^4 - 2x^2 - 2x + 1$  b)  $-4x - 14$  c)  $-3x^2 + 2x + 6$  d)  $4x^7 - 6x^3$
- 8.21. d)  $F(x) = -3x^4 + 7x^3 - 2x^2 - 3x + 1$  e)  $F(x) = -3x^5 - 5x^4 + 14x^3 + 5x^2 - 3x$   
 f)  $F(x) = -6x^5 + 8x^4 + 13x^3 - 14x^2 - 6x + 3$
- 8.22. a)  $2x^4 - 4x^3 + 10x^2 + 3x - 14$  b)  $6x^3 + 2x^2 - x + 2$   
 c)  $x^4 - 5x^3 + 4x^2 + 2x - 8$  d)  $x^4 - 5x^3 - 4x - 8$
- 8.23. a)  $3x^5 + 4x^3 - 3x^2 - 4x + 2$  b)  $4x^5 - 3x^4 + 9x^3 - 10x^2 + 5x - 1$   
 c)  $36x^6 - 27x^5 - 39x^4 + 36x^3 + 4x^2 - 12x + 4$   
 d)  $3x^8 + 10x^6 - 6x^5 + 4x^4 - 8x^3 - 5x^2 + 8x - 2$
- 8.24. a)  $x^{12} - x^{11} - x^9 + x^8$  b)  $x^{16} + x^{15} - x^4 - x^3$   
 c)  $x^{12} - x^{11} + x^{10} - x^9 - x^5 - x^3$  d)  $x^9 - x^8 - x^7 + x^4 - x^3 - x^2$
- 8.25. a)  $9x^4 - 16x^2$  b)  $25x^6 - 60x^4 + 36x^2$  c)  $9x^{14} + 12x^8 + 4x^2$  d)  $81x^{14} - x^6$
- 8.26. a)  $-4x^3 - 4x$  b)  $-12x^3 - 8x$  c)  $10x^4 + 2x^3 + 7x^2 + 1$  d)  $5x^4 - 4x^3 + 25x^2$
- 8.27. a)  $x^7 - x^5 + 3x^4 + x^3 - 5x^2 - 6x + 1$  b)  $3x^7 + 6x^5 - x^4 - 3x^3 - 12x^2 + 17x + 5$   
 c)  $x^5 + 12x^4 + 24x^3 + 6x + 2$  d)  $9x^3 + 6x^2 + 2x - 5$
- 8.28. a) st.  $W(x) = 13$ ;  $a_0 = -125$ ,  $a_{13} = -24$  b) st.  $W(x) = 10$ ;  $a_0 = 8$ ,  $a_{10} = 12$   
 c) st.  $W(x) = 6$ ;  $a_0 = -5$ ,  $a_6 = 18$  d) st.  $W(x) = 20$ ,  $a_0 = 0$ ,  $a_{20} = -18$

**Równość wielomianów**

- 8.29. Wielomiany są równe w punktach: a) b) d).
- 8.30. a)  $a = -2$  b) nie istnieje c) nie istnieje d)  $a = -2$
- 8.31. a)  $a = 3$  b)  $a = 2$  c)  $a = -3$  d)  $a = 1$
- 8.32. a)  $a = 1$ ,  $b = 3$  b) nie istnieją; *wskazówka*  $(2ax - b)^3 = (2ax - b)^2(2ax - b)$   
 c)  $a = 2$ ,  $b = 3$  d)  $a = -1$ ,  $b = 2$
- 8.33. a)  $a = -5$ ,  $b = -5$  b)  $a = -3$ ,  $b = 1$
- 8.34. a)  $a = 2$ ,  $b = -3$  b)  $a = -1$ ,  $b = 3$
- 8.35. a)  $b = 2$ ,  $c = 4$  b)  $b = 5$ ,  $c = 1$

**Wzory skróconego mnożenia stopnia 3. Wzór na  $a^n - b^n$** 

- 8.36. a)  $y^3 + 3y^2z + 3yz^2 + z^3$  b)  $8 + 12a + 6a^2 + a^3$  c)  $1 + 9x + 27x^2 + 27x^3$   
 d)  $4 + 3\sqrt[3]{9} + 3\sqrt[3]{3}$  e)  $125 - 75b + 15b^2 - b^3$  f)  $x^3 - 12x^2 + 48x - 64$   
 g)  $8x^3 - 36x^2 + 54x - 27$  h)  $-1 - 3\sqrt[3]{2} + 3\sqrt[3]{4}$
- 8.37. a)  $10 - 6\sqrt{3}$  b)  $44 + 18\sqrt{6}$  c)  $62\sqrt{2} - 55$  d)  $200\sqrt{2} + 102\sqrt{6}$   
 e)  $10 + 12\sqrt[3]{2} + 6\sqrt[3]{4}$  f)  $-12 - 9\sqrt[3]{3} - 9\sqrt[3]{9}$  g)  $12 - 24\sqrt[3]{2} + 12\sqrt[3]{4}$   
 h)  $205 + 30\sqrt[3]{5} + 60\sqrt[3]{25}$
- 8.38. a)  $x^3 + a^3$  b)  $27 + x^3$  c)  $y^3 + 64$  d)  $8 - y^3$  e)  $x^3 - 125$  f)  $2\sqrt{2} - z^3$
- 8.39. a) 3 b) 17 c) 5 d) -7
- 8.40. a)  $3x^2 - 9x + 7$  b)  $3x^3 + 18x + 6$  c)  $3x^2 - 3x + 2$  d)  $2x^3 - 9x^2 - 27x - 51$   
 e)  $2x^3 + 12x^2 + 48x$  f)  $2x^3$
- 8.41. a)  $x^3 + 9x - 25$  b)  $-6x^2 - 39x^2 + 38x - 25$  c)  $7x^3 - 9x^2 + 15x - 2$   
 d)  $-4x^2$  e)  $x^6 + 7x^2$  f)  $26x^3 - 39x^2 + 33x - 20$
- 8.42. a)  $x \in \left\{-2\frac{5}{7}, 2\right\}$  b)  $x \in \left\{-1, -\frac{5}{8}\right\}$  c)  $x \in \left\{-1, 5\frac{1}{9}\right\}$  d)  $x \in \{-19, -1\}$
- 8.43. a)  $x \in (-\infty, -5) \cup (5, +\infty)$  b)  $x \in (-\infty, -1) \cup (2, +\infty)$   
 c)  $x \in \langle -1, 4 \rangle$  d)  $x \in \langle -2, 8 \rangle$
- 8.44. a)  $(x - 1)^3$  b)  $(x + 6)^3$  c)  $(3 - y)^3$  d)  $(2x + 3y)^3$  e)  $(1 + 2x)^3$  f)  $(1 - 5y)^3$
- 8.45. a)  $(y + 2)(y^2 - 2y + 4)$  b)  $(1 - x)(1 + x + x^2)$  c)  $(3z - 1)(9z^2 + 3z + 1)$   
 d)  $(2k - 5)(4k^2 + 10k + 25)$  e)  $(4 + 3y)(16 - 12y + 9y^2)$   
 f)  $(5a + 6)(25a^2 - 30a + 36)$  g)  $(\sqrt{5} + x)(5 - \sqrt{5}x + x^2)$  h)  $(y - \sqrt{2})(y^2 + \sqrt{2}y + 2)$
- 8.46. a)  $\frac{2\sqrt[3]{9}}{3}$  b)  $\frac{\sqrt[3]{4}}{6}$  c)  $\frac{2\sqrt[3]{25}}{5}$  d)  $\frac{4 + 2\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}}{2}$  e)  $\frac{9 - 3\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{25}}{16}$   
 f)  $\sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{3}$  g)  $\frac{4 - \sqrt[3]{2}}{31}$  h)  $\frac{9 - 9\sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{9}}{12}$

## Podzielność wielomianów

- 8.67. **wskazówka** Skorzystaj z poznanych wzorów skróconego mnożenia.  
 8.68. **wskazówka** Przedstaw trójmiany kwadratowe w postaci iloczynowej.  
 8.70. a)  $(x+1)(x-3)$   
 8.71. np.  $6x(4-x)(x+2)$ ,  $x^2(x+2)$ ,  $x^2(4-x)$   
 8.73. **wskazówka** Zapisz trójmian kwadratowy  $P(x)$  w postaci iloczynowej.  
 8.74. **wskazówka** Zapisz trójmian kwadratowy  $P(x)$  w postaci iloczynowej.  
 8.76. **wskazówka**  $P(x) = (x+2)^3$   
 8.77. a)  $P(x) = -3x + 4$  b)  $P(x) = 3x + 4$  c)  $P(x) = -x + 1$   
 8.78.  $a = -7$ ,  $b = 2$   
 8.79.  $a = 5$ ,  $b = 2$   
 8.80.  $a = 10$ ,  $b = 3$   
 8.81.  $P(x) = 3x - 2$   
 8.82.  $P(x) = 2x - 3$   
 8.83.  $P(x) = 4x^2 - 20x + 21$   
 8.84.  $Q(x) = x^2 - 6x + 36$   
 8.85.  $Q(x) = 6x^2 - 7x - 3$   
 8.86. a)  $Q(x) = x^3 + 1$  b)  $Q(x) = x^2 - x + 1$

## Dzielenie wielomianu przez dwumian liniowy. Schemat Hornera

- 8.87. a)  $x^2 - 2x + 4$  b)  $x^2 - 4x + 7$  c)  $x^2 - x + 1$  d)  $x^3 + 6x^2 - 6x - 1$   
 8.88. a)  $100x^2 - 80x + 15$  b)  $38x^2 - 12x - 2$  c)  $16x^3 + 4x^2 - 8x + 4$  d)  $2x^4 - 4$   
 8.89. a)  $x^3 - 6x^2 + 3x + 2$  b)  $3x^3 + 2x - 1$  c)  $x^3 + 8x + 4$  d)  $x^3 + 4$   
 8.90. a)  $3x - 8$ ,  $r = 17$  b)  $-2x^2 - 2x + 2$ ,  $r = -1$  c)  $4x^3 - 4x^2 + 7x - 13$ ,  $r = 16$   
 d)  $-3x^2 - 7x^2 - 21x - 63$ ,  $r = -185$  e)  $x^4 - 3x^3 + 13x^2 - 41x + 123$ ,  $r = -368$   
 f)  $x^5 + 2x^4 + x^3 + 2x^2 + 6x + 12$ ,  $r = 25$   
 8.91. a)  $x^2 + 3x + 4$  b)  $x^2 + x + 1$  c)  $3x^2 + 2x + 3$  d)  $2x^2 + x + 5$   
 8.92. a)  $3x^3 + 2x + 1$  b)  $2x^3 + 4x^2 + 6$  c)  $3x^3 + 6x + 9$  d)  $5x^3 + 10x^2 + 5$   
 8.93. a)  $x^2 + x - 2$  b)  $2x^2 - 4x + 9$  c)  $-x^2 + x + 3$   
 d)  $5x^2 + 10x + 13$  e)  $2x^3 + 2x^2 + 2x - 3$  f)  $-3x^3 + 3x^2 - x + 1$   
 8.94. a)  $3$ ,  $r = -7$  b)  $-4$ ,  $r = -27$  c)  $x^2 - 2x + 4$ ,  $r = -9$  d)  $3x^3 + 6x^2 + 12x + 22$ ,  $r = 52$   
 e)  $5x^4 + 5x^3 + 7x^2 + 7x + 7$ ,  $r = 14$  f)  $-2x^4 + 6x^3 - 14x^2 + 42x - 126$ ,  $r = 384$   
 8.95. a)  $2x^5 + 2x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 5x + 5$ ,  $r = -10$  b)  $-3x^3 - 6x^2 - 12x - 22$ ,  $r = -28$   
 c)  $x^4 - x^3 + x^2 - x + 1$ ,  $r = 0$  d)  $x^5 - x^4 + x^3 - x^2 + x - 1$ ,  $r = 0$   
 e)  $x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ ,  $r = 2$  f)  $x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ ,  $r = 0$   
 8.96. a)  $-9$  b)  $7$  c)  $10$  d)  $-17$   
 8.97. a)  $r = -18$   
 8.98.  $m = -1$  lub  $m = 4$   
 8.99.  $m = -3$  lub  $m = -2$   
 8.100.  $a \in (-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$   
 8.101.  $a \in \left(-1, 1 - \frac{1}{2}\right)$

## Pierwiastek wielomianu. Twierdzenie Bézouta

- 8.102. a) tak b) tak c) nie d) tak  
 8.103. a) 3 b)  $-\sqrt{3}, \sqrt{3}$   
 8.104. a) st.  $W(x) = 6$ ; pierwiastki:  $2, 2\frac{1}{2}$  b) st.  $W(x) = 6$ ; pierwiastki:  $-5, -2, -\frac{2}{9}, \frac{2}{9}, 3$   
 c) st.  $W(x) = 7$ ; pierwiastki:  $0, \frac{1}{3}$  d) st.  $W(x) = 6$ ; pierwiastki:  $-3, 3$   
 8.105. b) np.  $W(x) = x^2(x^2 - 5)(x^2 - 3)$  d) np.  $W(x) = (x+2)^2(x^4 + 3)$   
 8.106. a) tak b) tak c) nie d) tak  
 8.107. a)  $k = -2$  b)  $k = 1$  c)  $k = -\frac{2}{3}$  lub  $k = \frac{1}{2}$  d)  $k = -2$  lub  $k = \frac{1}{3}$   
 8.108. a)  $-6, -1, \frac{1}{3}$  b)  $4$  c)  $-3, 1, 3\frac{1}{2}$  d)  $-1, -\frac{1}{4}, 2$  e)  $-2, 3$  f)  $1$   
 8.109. a)  $5$  b)  $-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}$  c)  $-1, \frac{1}{2}$  d) nie istnieją inne pierwiastki  
 8.110. a)  $-1, 1$  b) nie istnieją inne pierwiastki c)  $-3, 1, 3$  d)  $-4, 4$   
 8.111. a)  $a = -2$ ; pozostałe pierwiastki:  $-2, -1$  b)  $a = 3$ ; pozostałe pierwiastki:  $\frac{2}{3}, 3$   
 8.112. a)  $a = -7$ ; pierwiastki:  $-2, -\frac{1}{4}, 1$  b)  $a = 3$ ; pierwiastki:  $-3, -2, \frac{1}{2}$   
 8.113. a)  $a = 2$ ,  $b = 1$ ;  $x_3 = -1$  b)  $a = 1$ ,  $b = -4$ ;  $x_3 = -2$   
 8.114. a)  $a = 0$ ,  $b = 7$ ; pierwiastki:  $-3, 1, 2$  b)  $a = 8$ ,  $b = 4$ ; pierwiastki:  $-4, \frac{1}{3}, 1$
- Pierwiastki wymierne wielomianu**
- 8.117. a)  $-3, -2, 1$  b)  $2$  c)  $-1, 1$  d)  $-2, -1$  e)  $-3, -2, 1, 3$  f)  $-4, 1$   
 8.119. **wskazówka**: Wskaż trzy liczby całkowite, które są pierwiastkami wielomianu  $W(x)$  i pozwalają się na własność: Wielomian stopnia 3. może mieć co najwyżej trzy pierwiastki.  
 8.120. a)  $-2, 2$ ; **wskazówka**: Wyznacz pierwiastki wielomianu  $Q(x) = 4 \cdot W(x)$ . b)  $-3, 1, 2$   
 c)  $-4$  d)  $-4, -2, 1, 3$   
 8.121. a)  $2$  b)  $-2, -1, \frac{1}{3}$  c)  $-3, 4$  d)  $-4, 2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}$   
 e)  $2$  f)  $1$  g)  $-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 2$  h)  $-\sqrt{3}, 1, \sqrt{3}$   
 8.122. pierwiastki całkowite wielomianu  $W(x)$ :  $2, -1$   
 8.123. **wskazówka**: Liczba 3 to jedyna liczba pierwsza nieparzysta, która jest dzielnikiem liczby  $-12$ .  
 8.124. a)  $a = -5$ ,  $b = 7$   
 8.125.  $a = 5$ ; pierwiastki:  $-1, 1, 5$ ; **wskazówka**: Pierwiastki całkowite wielomianu  $W(x)$  znajdują się wśród liczb:  $-1, 1, 5, -5$ . Sprawdź, że tylko liczby  $-1, 1, 5$  spełniają warunki zadania.

## Rozkładanie wielomianów na czynniki

- 8.126. a)  $(5x-1)(5x+1)(25x^2+1)$  b)  $(x-1)^2(x+1)^2$  c)  $-(5x^2+2)(5x^2+2)$   
 d)  $(3x-2)(3x+2)(9x^2+4)$  e)  $-3(x+5)(x-1)$  f)  $(x-6)(5x+4)$
- 8.127. a)  $-1(x-1)(x-1)(x-1)$ , czyli  $-(x-1)^3$  b)  $(2x+3)^3$   
 c)  $(1+2x)(1-2x+4x^2)$  d)  $(6x-5)(36x^2+30x+25)$   
 e)  $-(x+5)(7x^2-20x+25)$  f)  $(x-1)(19x^2+7x+1)$
- 8.128. a)  $x^2(2x-1)^2$  b)  $(x^2+2)(7x-3)$  c)  $(3x^2+1)(x-4)$   
 d)  $(5x-1)(\sqrt{7-x})(\sqrt{7+x})$  e)  $x(2x-5)(x-3)$  f)  $(x-4)(x+3)^2$
- 8.129. a)  $5(x-1)^2(x-0,4)$  b)  $2(x-2)(x+2)(x-0,5)$  c)  $-1(4x-1)(x-1)^2$   
 d)  $-(x+5)(x+1)(x-2)$  e)  $-x(x+1)^2$  f)  $(x-3)(x^2+2x-3)$
- 8.130. a)  $(x+y)(a+b)$  b)  $(a+b)(x-y)$  c)  $(x-y)(c-a)$   
 d)  $(x-y)(x+a)$  e)  $(2x+y)(y-1)$  f)  $(3a-b)(c+1)$
- 8.131. a)  $(x+3)(x-2)(x+2)$  b)  $(7x+2)(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})$  c)  $(x-2)(3x^2+4)$   
 d)  $(x-1)(x^2+1)$  e)  $(x+1)(2x-1)(2x+1)$  f)  $(x+2)(1-3x)(1+3x)$
- 8.132. a)  $(9x-4)(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})$  b)  $(5x-4)(x-1)(x+1)$   
 c)  $4(x+1)(2x-1)(2x+1)$  d)  $9(x-1)(x+1)(2x+1)$   
 e)  $(3x-7)(x-3)(x+3)$  f)  $(2x+3)(5x^2+4)$
- 8.133. a)  $(3x+4)(2-x)(2+x)$  b)  $(2x-3)(2x+3)(5x+3)$   
 c)  $(1-2x)(2x^2+3)$  d)  $(3x+8)(1-\sqrt{2x})(1+\sqrt{2x})$   
 e)  $x(x-1)(x+1)(2x+3)$  f)  $x(x-\sqrt{5})(x+\sqrt{5})(3x-1)$
- 8.134. a)  $(x+2)(x-1)(x^2+x+1)$  b)  $(x+3)(2x+1)(4x^2-2x+1)$   
 c)  $(x-1)(x-3)(x^2+3x+9)$  d)  $(x-1)(5x-2)(25x^2+10x+4)$   
 e)  $(x+1)(2x-1)(4x^2+2x+1)$  f)  $(3x+2)(x-2)(x^2+2x+4)$
- 8.135. a)  $(x+2)(x-2)$  b)  $(x-3)(x-1)$  c)  $(x-7)(5x^2+2)$   
 d)  $(3x-4)(x^2-3x+4)$  e)  $(2x+3)(7-4x)$  f)  $(2+x)(4x+9)$
- 8.136. a)  $(x-1)(x+1)(x^2+2)$  b)  $(x+5)^2(3x+14)$  c)  $(x+4)^2(x-1)(x+1)$   
 d)  $(x-2)(x+2)(2-x)$  e)  $(x-2)(2x^2-x+5)$  f)  $(3x+1)(11x^2+3x+6)$
- 8.137. a)  $(x+2)(2x-1)(x-1)$  b)  $(x-1)(x^2+x+4)$  c)  $(x+1)(x+2)(3x-1)$   
 d)  $(x-1)^2(x-5)$  e)  $(2x-3)(x+2)(x-1)$  f)  $(x+1)(x+3)(3x-1)$
- 8.138. a)  $(x-1)(x+2)(x+3)$  b)  $2x^2(x-1)^2(x+1)^2$  c)  $(2-4x)(16x^2+20x+13)$   
 d)  $(x+3)^2(x-2)$  e)  $x(5x-2)(x+1)^2$  f)  $(3\sqrt{2}x-1)(x-3)(x+3)$
- 8.139. a)  $(x+3)(x+5)^2$  b)  $4(2x-3)(x-2)^2$  c)  $8(4x-5)(x-2)(2x-1)$   
 d)  $2(x-2)^2(x-4)$  e)  $(x-3)(37x^2+9x+3)$  f)  $(2x+3)(2x+1)(2x+5)$
- 8.140. a)  $(x-1)(x+1)(2x^2+1)$  b)  $(x+3)(x+1)(1-x)(x-3)$   
 c)  $(x+1)(x-2)(x^2-x+1)(x^2+2x+4)$  d)  $x^2(x-6)$   
 e)  $(1-x)(x+1)(x-2)(x+2)$  f)  $x(x-1)(x+2)(x+3)$

## Równania wielomianowe

- 8.141. a)  $x=2$  b)  $x=-4$  c)  $x=-1$  d)  $x \in \left\{-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right\}$   
 e)  $x \in \{-2, 2\}$  f) równanie sprzeczne
- 8.142. a)  $x \in \left\{-5, 1\frac{1}{2}, 4\right\}$  b)  $x \in \{2-\sqrt{3}, 2, 2+\sqrt{3}\}$  c)  $x \in \left\{-3-\sqrt{7}, -3+\sqrt{7}, 0, \frac{1}{2}\right\}$   
 d)  $x \in \left\{-1\frac{2}{3}, -1\frac{1}{5}, 1\frac{2}{3}\right\}$  e) równanie sprzeczne f)  $x \in \{-4, -3, -\sqrt{2}, \sqrt{2}, 4\}$
- 8.143. a)  $x \in \{-2, -\sqrt{3}, \sqrt{3}, 2\}$  b)  $x \in \{-\sqrt{5}, 0, \sqrt{5}, 3\}$  c)  $x \in \{-3, 3, 4\}$   
 d)  $x \in \left\{0, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right\}$  e)  $x \in \{0, 1\}$  f)  $x \in \{-2, -\frac{1}{3}\}$
- 8.144. a)  $x \in \{-1, 1\}$  b)  $x \in \left\{-2, \frac{1}{2}, 2\right\}$  c)  $x=2$   
 d)  $x \in \{-1, 1, 5\}$  e)  $x \in \left\{-4, \frac{1}{2}, 4\right\}$  f)  $x \in \left\{-\sqrt{2}, -\frac{1}{3}, \sqrt{2}\right\}$
- 8.145. a)  $x \in \{0, 3\}$  b)  $x \in \left\{-1, \frac{2}{3}, 1\right\}$  c)  $x \in \left\{-1, \frac{1}{3}, 3\right\}$   
 d)  $x \in \{-4, -\sqrt{5}, 0, \sqrt{5}\}$  e)  $x \in \{-2, 1, 2\}$  f)  $x \in \{-\sqrt{2}, -1, 0, \sqrt{2}\}$
- 8.146. a)  $x \in \{-2, 2\}$  b) równanie sprzeczne c)  $x \in \{-1, 2\}$   
 d)  $x \in \{-2\sqrt{2}, -1, 1, 2\sqrt{2}\}$  e)  $x \in \left\{\frac{-1}{\sqrt{10}}, \frac{1}{2}\right\}$  f)  $x \in \left\{\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right\}$
- 8.147. a)  $x \in \left\{-1, \frac{1}{2}\right\}$  b)  $x \in \left\{\frac{-3-\sqrt{7}}{2}, \frac{-3+\sqrt{7}}{2}, 3\right\}$   
 c)  $x \in \{-3, -1, 4\}$ ; *wskazówka*:  $-13x = -x - 12x$   
 d)  $x = -3$ ; *wskazówka*:  $-5x = -9x + 4x$   
 e)  $x \in \left\{-\frac{1}{2}, 1\right\}$  f)  $x \in \{-1-\sqrt{2}, -1+\sqrt{2}, 2\}$
- 8.148. a)  $x \in \{-6, -4, -2\}$  b)  $x \in \{1, 3, 5\}$  c)  $x \in \left\{-1, \frac{3}{2}, 3\right\}$   
 d)  $x \in \{-1, 2, 3\}$  e)  $x \in \{-2, 6\}$  f)  $x \in \left\{-\frac{2}{3}, \frac{1}{2}, 5\right\}$ ; *wskazówka* Skorzystaj z twierdzenia o całkowitych pierwiastkach wielomianu.
- 8.149. a)  $x \in \{-3, -1, 1, 3\}$  b)  $x \in \{-\sqrt[3]{4}, 2\}$  c)  $x=2$   
 d) równanie sprzeczne e)  $x=-1$  f)  $x = \frac{1}{4}$

8.150. a)  $x \in \{-5, 0, 5\}$  b)  $x \in \left\{-\sqrt{6}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \sqrt{6}\right\}$  c)  $x \in \{-1, 3\}$

d)  $x = -1$  e)  $x \in \left\{\frac{3-3\sqrt{5}}{4}, -1, \frac{3+3\sqrt{5}}{4}\right\}$  f)  $x \in \{-5, 1, 4\}$

8.151. a)  $x \in \left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{5\sqrt{3}}{6}\right\}$  b)  $x \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$  c)  $x \in \{-6, -2, 2\}$

d)  $x \in \left\{-3-2\sqrt{3}, -3+2\sqrt{3}, \frac{1}{2}\right\}$  e)  $x \in \left\{-1, 1, \frac{1}{2}, 3\right\}$  f)  $x \in \left\{-2, -1, \frac{2}{3}, 2\right\}$

8.152. a)  $x \in \left\{-1, -\frac{4}{5}, 1\right\}$  b)  $x \in \left\{-2, -1, -\frac{1}{2}\right\}$  c)  $x \in \{-4, -1, 0, 1, 4\}$

d)  $x \in \left\{-2, \frac{1}{3}, -1, 3\right\}$  e)  $x \in \{-1, 1\}$  f)  $x \in \{-2, \sqrt[3]{5}\}$

8.153. a)  $x \in \left\{-2, 1, 2, \frac{1}{2}\right\}$  b)  $x \in \left\{\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, 1\right\}$  c)  $x \in \{-4, 0, 5\}$

d)  $x \in \left\{-1, \frac{1}{4}, 4\right\}$  e)  $x \in \left\{1, \frac{2}{5}, 2\right\}$  f)  $x \in \left\{-1, \frac{1}{3}, 2, \frac{1}{2}\right\}$

**Zadania prowadzące do równań wielomianowych**

8.154. a)  $a = -2$  b)  $W(x) = (x-1)(x-3)(x-5)$

8.155. a)  $a = -1$  lub  $a = 1$  b)  $-2i - 6$  – pierwiastki jednokrotne;  $0$  – pierwiastek dwukrotny

8.156. **wskazówka** Suma współczynników jest równa 0 wtedy, gdy  $a = 3$ . Rozwiąż równanie  $W(x) = 0$  w przypadku, gdy  $a = 3$ .

8.157. a)  $a = 1$  b)  $Q(x) = x^2 + x + 4$

8.158.  $a = 1$  lub  $a = \sqrt{2}$  lub  $a = -\sqrt{2}$

8.159.  $(-6i - 3)$  lub  $(3i + 6)$

8.160.  $-5, -2, -3$

8.161. 28 uczniów

8.162. 241

8.163. 2 cm, 4 cm, 1 cm

8.164. 10 cm, 10 cm, 4 cm

8.165. 5 cm  $\times$  5 cm lub 10 cm  $\times$  10 cm

8.166. 7 m, 5 m, 4 m

8.167. 4, 6, 8

8.168. 3, 5, 7

**Test sprawdzający do rozdziału 8.**

Nr zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Odpowiedź	B	D	C	B	D	D	C	C	D	A

Nr zadania	11	12	13	14	15
Odpowiedź	B	C	A	D	B

**Zadania powtórzeniowe do rozdziału 8.**

16.  $F(x) = 6x^2 + 4x - 31$ ; wielomian  $F(x)$  ma dwa pierwiastki.

17. Istnieją:  $a = -2$ ,  $b = -1$

18. a)  $\frac{4\sqrt[3]{25} + 2\sqrt[3]{5} + 1}{39}$  b)  $\frac{\sqrt[3]{2} + 3}{29}$

19. a)  $W(x) = (1-x)(x-5)(x+5)(1+x+x^2)$ ; pierwiastki:  $-5, 1, 5$

b)  $x(x-1)(x-5)(x+6)$ ; pierwiastki:  $-6, 0, 1, 5$

20. a)  $a = 2$  b)  $-4, -1, 2$

21.  $a \in \{-2, -1, 1\}$

22. a)  $a = 4$ ,  $b = 1$  b) pierwiastki całkowite:  $-2, 3$

23. a)  $x = 3\frac{1}{2}$  b)  $x \in \left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$  c)  $x \in \{-3, \sqrt[3]{2}\}$  d)  $x \in \left\{\frac{1}{3}, 1, 2\right\}$

24. 425; **wskazówka**: Przedstaw wyrażenie w postaci  $(x+3)(3x^2-1)$  i w miejsce  $x$  podstaw  $2k+1$ , gdzie  $k \in \mathbb{Z}$ .

25. a)  $W(x) = (1-x)(x-4)(x+2)$  b)  $W(x) = -x^3 + 3x^2 + 6x - 8$

30. **wskazówka**: Zapisz kolejne liczby naturalne w postaci:  $4n+1, 4n+2, 4n+3$ , gdzie  $n \in \mathbb{N}$ . Następnie doprowadź do najprostszej postaci wyrażenie:  $(4n+1)^3 + (4n+2)^3 + (4n+3)^3$ .

31. **wskazówka**: Zbadaj różnicę  $\frac{1+4a^3}{4} - a^4$ .

32. **wskazówka**: Doprowadź wyrażenie do postaci:  $-7a^4 - 6a^2 - 1$ .

33. **wskazówka**: Wykaż, że  $(x+3)^3 - (x-1)^3 = 12x^2 + 24x + 28$ ; następnie uzasadnij, że najmniejsza wartość funkcji kwadratowej  $f(x) = 12x^2 + 24x + 28$  jest równa 16.

## Wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych

$\alpha$	$\sin \alpha$	$\operatorname{tg} \alpha$	$\operatorname{ctg} \alpha$	$\cos \alpha$	
1°	0,017	0,017	57,290	1,000	89°
2°	0,035	0,035	28,636	0,999	88°
3°	0,052	0,052	19,081	0,999	87°
4°	0,070	0,070	14,301	0,998	86°
5°	0,087	0,087	11,430	0,996	85°
6°	0,105	0,105	9,514	0,995	84°
7°	0,122	0,123	8,144	0,993	83°
8°	0,139	0,141	7,115	0,990	82°
9°	0,156	0,158	6,314	0,988	81°
10°	0,174	0,176	5,671	0,985	80°
11°	0,191	0,194	5,145	0,982	79°
12°	0,208	0,213	4,705	0,978	78°
13°	0,225	0,231	4,331	0,974	77°
14°	0,242	0,249	4,011	0,970	76°
15°	0,259	0,268	3,732	0,966	75°
16°	0,276	0,287	3,487	0,961	74°
17°	0,292	0,306	3,271	0,956	73°
18°	0,309	0,325	3,078	0,951	72°
19°	0,326	0,344	2,904	0,946	71°
20°	0,342	0,364	2,747	0,940	70°
21°	0,358	0,384	2,605	0,934	69°
22°	0,375	0,404	2,475	0,927	68°
23°	0,391	0,424	2,356	0,921	67°
24°	0,407	0,445	2,246	0,914	66°
25°	0,423	0,466	2,145	0,906	65°
26°	0,438	0,488	2,050	0,899	64°
27°	0,454	0,510	1,963	0,891	63°
28°	0,469	0,532	1,881	0,883	62°
29°	0,485	0,554	1,804	0,875	61°
30°	0,500	0,577	1,732	0,866	60°
31°	0,515	0,601	1,664	0,857	59°
32°	0,530	0,625	1,600	0,848	58°
33°	0,545	0,649	1,540	0,839	57°
34°	0,559	0,675	1,483	0,829	56°
35°	0,574	0,700	1,428	0,819	55°
36°	0,588	0,727	1,376	0,809	54°
37°	0,602	0,754	1,327	0,799	53°
38°	0,616	0,781	1,280	0,788	52°
39°	0,629	0,810	1,235	0,777	51°
40°	0,643	0,839	1,192	0,766	50°
41°	0,656	0,869	1,150	0,755	49°
42°	0,669	0,900	1,111	0,743	48°
43°	0,682	0,933	1,072	0,731	47°
44°	0,695	0,966	1,036	0,719	46°
45°	0,707	1,000	1,000	0,707	45°
	$\cos \alpha$	$\operatorname{ctg} \alpha$	$\operatorname{tg} \alpha$	$\sin \alpha$	$\alpha$